

Taschenrechner

Arithmetische

Handbuch

Methoden der praktischen Arithmetik

herausgegeben von

Paul Günther, M. Dr.

Lehrer

an der Universität zu Bonn
des Reiches Universitäts- und
Landesbibliothek


Bonn 1873

Verlag von F. Cohen

Taschenbuch
der
Arzneyformeln

nach den
Methoden der berühmtesten Ärzte;
herausgegeben

von
Karl Sundelin, *M. Dr.*



Als Supplement zu d. Heilmittellehre
desselben Verfassers.

Berlin 1828
Verlag von Th. Chr. Fr. Enslin.

Taschenbuch
der
ärztlichen
Rezeptirkunst
und der
Arzneyformeln,
nach den
Methoden der berühmtesten Ärzte;
herausgegeben

von
Karl Sundelin, M. Dr.



Als Supplement zu d. Heilmittellehre
desselben Verfassers.

Zweytes Bändchen: Arzneyformeln.

Berlin 1828.

Verlag von Th. Chr. Fr. Enslin.

Taschenbuch

der

Rezeptirkunst

und der

Arzneymittel

nach dem

Verfahren der berühmtesten Ärzte;

herausgegeben

von
Johann Samuel, M. D.

Leipzig

Verlag des Verlegers
H. W. Schmidt

Verlag des Verlegers

Berlin 1822

Verlag des Verlegers

Pulverformeln.

Zum innerlichen Gebrauch.

Schwächende und temperirende
Mittel.

Rec. *Kali nitrici depurati*, ʒj — ʒij.
Gummi mimosae,
Sacchari albi. singul. ʒß.

*Misce, fiat pulv. Divide in sex partes
aequales. Signa.* Zweystündlich ein
Pulver zu nehmen. (Berends.)

Rec. *Kali sulphurici*,
Tartari depurati, singul. ʒij.
Magnesia carbonicae, ʒj.
Sacchari albi, ʒiij.

M. f. pulv. Detur in scatula. S. Drey-
stündlich einen Theelöffel voll.

Rec. Kali nitrici depurati,
Kali sulphurici,
Concharum praeparatarum, singu-
lor. ʒ iij.

M. f. pulv. S. Zu halben und ganzen
 Theelöffeln zwey- oder dreystündlich.
 (Unzer.)

Rec. Magnesiae carbonicae, ʒ ij.

Tartari depurati, ʒ j.

M. f. pulv. S. Theelöffelweise, zwey-,
 dreystündlich.

Rec. Acidi tartarici, ʒ iß.

Gummi mimosae, ʒ ij.

Sacchari albi, ʒ j.

M. f. pulv. S. Dreystündlich einen Thee-
 löffel voll in Wasser.

Rec. Acidi tartarici, ʒ ij.

Elaeosacchari flavedinis citri, ʒ iij.

Sacchari albi, ʒ iij.

M. f. pulvis. S. Limonadenpulver, im
 Trinkwasser bis zur angenehmen Säure.
 (Berends.)

Auflösende und Digestivmittel.

Rec. Natri acetici, ʒ ij — ʒ ß.

Magnesiae carbonicae, ʒ j.

Sacchari albi, ʒ vj.

M. f. pulv. S. Täglich drey- bis vier-
 mal einen Theelöffel voll.

Rec. Magnesiae carbonicae, ʒ ij.

Elaeosacchari foeniculi, ʒ iij.

M. f. pulv. S. Dreystündlich einen Theelöffel voll.

Rec. Natri carbonici sicci, 3iß.
Elaeosacchari flavedinis citri, 3ij.
Sacchari albi, 3vj.

M. f. pulv. S. Dreystündlich einen Theelöffel voll.
 (Berends.)

Rec. Natri carbonici sicci, 3ij.
Tartari depurati, 3vj.
Sacchari albi, 3iij.

M. f. pulv. S. Theelöffelweise in Wasser.
 (Vogler.)

Rec. Natri carbonici aciduli, gr. viij.
Acidi tartari, gr. v.
Sacchari albi, gr. x.

M. f. pulv.; dent. tal. dos. vj. Signa.
 Stündlich oder zweystündlich ein Pulver unter dem Aufbrausen zu nehmen.
 (Berends.)

Rec. Magnesiae carbonici,
Acidi tartarici, singul. 3j.
Sacchari albi, 3j.

M. f. pulv.; divide in sex partes aequales; s. Zwey- oder dreystündlich ein Pulver mit Wasser zu nehmen.
 (Hufeland's Brausepulver.)

Rec. Saponis medicati, 3j.
Magnesiae carbonicae, 3iß.
Radiciis rhei optimi, 3ß.
Elaeosacchari foeniculi, 3iij.

M. f. pulv. Detur in vitro. S. Drey-
mal täglich einen Theelöffel voll.
(Berends.)

Rec. Kali tartarici, ℥iij.
Radiciis rhei, ℥j.
Sulphuris praecipitati, ℥ij.
Corticum aurantiorum,
Magnesia carbonicae, singul. ℥i℔.
Elaeosacchari foeniculi, ℥iij.

M. f. pulv. S. Drey- bis dreymal täglich einen
Theelöffel voll.

(Klein's *Solamen hypochondriac.*)

Rec. Magnesia carbonicae,
Tartari depurati,
Radiciis rhei,
Florum chamomillae,
Elaeosacchari foeniculi,
Sulphuris depurati, singul. ℥ij.

M. f. pulv. S. Zwey- bis dreymal täg-
lich einen Theelöffel voll.

(Selle's *pulvis ecphracticus.*)

Rec. Magnesia carbonicae, ℥iij.
Corticum aurantiorum, ℥℔.
Seminis foeniculi,
Sacchari albi, singulor. ℥j.

M. f. pulv. S. Drey- bis dreymal täglich einen
Theelöffel voll.

(Hufeland's milchvermehrendes Pulv.)

Rec. Ammonii muriatici depurati,
Pulveris radiciis glycyrrhizae, sin-
gul. ℥iij.

M. f. pulv. Divide in ix part. aequal.
Dentur in charta cerata. S. Drey-
 stündlich ein Pulver mit Haferschleim.
 (Büttner's Pulver gegen chronische
 Schleimflüsse, gegen Verdickungen der
 Schleimhäute, besonders in den Harn-
 werkzeugen.)

Rec. Ammonii muriatici depurati, ʒij.
Camphorae, gr. vj.
Florum arnicae, ʒß.
Sacchari albi, ʒvj.

M. f. pulv. Detur in vitro. S. Drey-
 bis viermal täglich einen Theelöffel voll
 zu nehmen. (Von Berends als *expe-*
ctorans u. *emmenagogum* empfohlen.)

Rec. Sulphuris depurati, ʒij.
Tartari depurati, ʒvj.
Sacchari albi, ʒij.

M. f. pulv. S. Dreymal täglich einen
 Theelöffel voll.

Rec. Sulphuris depurati, ʒij.
Seminis foeniculi,
Sacchari albi, singulor. ʒiij.

M. f. pulv. S. Viermal täglich einen
 Theelöffel voll.

Rec. Sulphuris praecipitati, ʒj — ʒiß.
Magnesia carbonicae, ʒij.
Elaeosacchari menthae crispae, ʒiij.

M. f. pulv. S. Dreymal täglich einen
 halben bis ganzen Theelöffel voll.

(Berends.)

Rec. Magnesiae sulphuratae, ʒj.

Acidi tartarici, ʒij.

Sacchari albi, ʒiv.

M. f. pulv. Divid. in xij part. aequal.

Dentur in charta cerata. S. Alle 3 Stunden ein Pulver unter dem Aufbrausen zu nehmen. (Diese Hydrothionbrausepulver werden gegen übermäßige Merkurialsalivation gerühmt.)

Alterirend-auflösende Mittel.

Rec. Hydrargyri puri, ʒij.

Sacchari albi, ʒß.

Terantur exactissime usque ad mercurii perfectam extinctionem. Divide in xvij part. aequal. S. Ein halbes Pulver zwey- bis dreymal täglich.

(Lagneau.)

Rec. Hydrargyri muriatici mitis, gr. vj — xxiv.

Sacchari albi, ʒj.

M. f. pulv.; divid. in xij part. aequal.

S. Zwey- oder dreystündlich; auch Morgens und Abends ein Pulver.

Rec. Hydrargyri muriatici mitis, Sulphuris stibiati aurantiaci, singul. gr. vj.

Sacchari albi, ʒß.

Conterantur sedulo per tres circiter horas. Divid. in sex part. aequal.

S. Drey- bis vierstündlich ein Pulver.

(Plummer.)

Rec. Hydrargyri oxydati rubri,
grana duo (gr. ij).

Stibii sulphurati nigri, ℥ viij.

Sacchari albi, ℥ ij.

Conterantur exactissime. Divid. in sedecim (xvi) part. aequal. S. Morgens und Abends ein Pulver. (Bey der jedesmaligen Wiederholung werden der ganzen Formel zwey Gran rothes Quecksilberoxyd hinzugesetzt, bis die ganze Formel zehn Gran desselben enthält. Alsdann wird die Gabe wiederum in derselben Art vermindert. Von Berg gegen hartnäckige eingewurzelte Syphilis.)

Rec. Hydrargyri sulphurati nigri, ʒß
— ʒiß.

Magnesiae carbonicae,

Sacchari albi, singul. ℥ v.

M. f. pulv.; divid. in x part. aequal.

S. Dreymal täglich ein Pulver.

Rec. Hydrargyri stibiato - sulphurati,
ʒiß.

Lapidum cancrorum praeparatorum,
ʒ ij.

Elaeosacchari foeniculi, ʒvj.

M. f. pulv. S. Zwey- bis dreymal täglich einen Theelöffel voll.

Rec. Hydrargyri stibiato - sulphurati,
gr. xxiv.

Natri carbonici sicci, gr. xvij.

Corticis ligni sassafras,

Sacchari albi, singulor. ʒj.

M. f. pulv.; divid. in vj part. aequal.
S. Zweymal täglich ein Pulver. (Ich habe dieses Mittel oft in chronischen Hautkrankheiten mit Nutzen gebraucht.)

Rec. Stibii sulphurati nigri,
Magnesia carbonicae, singul. ʒij.
Sulphuris depurati, ʒvj.

M. f. pulv. Divid. in xxx part. aequal.
S. Dreymal täglich ein Pulver.
 (Quarin.)

Rec. Stibii sulphurati nigri, ʒß.
Magnesia carbonicae, ʒj.
Cinnamomi, ʒß.
Sacchari albi, ʒv.

M. f. pulv. S. Ein- bis dreymal täglich einen Theelöffel voll. (Vogler.)

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci,
gr. iij — xij.

Sacchari albi,
Magnesia carbonicae, singul. ʒß.

M. f. pulv. Divid. in vj part. aequal.
S. Zwey- oder dreystündlich ein Pulver zu nehmen.

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci,
Kali sulphurici,
Concharum praeparatarum, sing.
ʒß.

M. f. pulv. Divide in sex part. aequal.
S. In der fieberfreyen Zeit dreystündlich ein Pulver.

(Unzer, gegen das Wechselfieber.)

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci, gr. vj.
Ammonii muriatici depurati,
Pulveris radices glycyrrhizae, sin-
gul. ʒß.

M. f. pulv. Divid. in tres part. aequal.
S. Vierstündlich ein Pulver zu nehmen.
 (Burdach.)

Pulver gegen den Kropf (*struma*).

Anmerkung. Diese Pulver dürfen nicht zu anhaltend angewendet werden; denn die Erfahrung hat gelehrt, daß sich unter solchen Umständen, m. großem Nachtheil, beträchtliche Massen der Schwammkohle in den ersten Wegen anhäufen.

Rec. Carbonis spongiae marinae, ʒß.
Magnesiae carbonicae,
Kali nitrici depurati,
Sacchari albi, singul. ʒij.

M. f. pulv. S. Dreymal täglich einen
Theelöffel voll. (Clarus.)

Rec. Herbae digitalis purpureae, gra-
na quatuor — octo (gr. iv
— viij).

Carbonis spongiae, ʒß.

Elaeosacchari foeniculi, ʒij.

M. f. pulv. Divide in xij part. aequal.
S. Zwey- bis dreymal täglich ein Pulver.
 (Rust.)

Rec. Carbonis spongiae,

Kali tartarici,

Sacchari albi, singul. ʒß.

Ammonii muriatici depurati,
Radicis imperatoriae,
Corticis cinnamomi, singul. ʒij.
Sulphuris stibiati aurantiaci, ʒj.
Piperis longi, ʒj.

M. f. pulv. S. Zweymal täglich einen
 Theelöffel voll. (Hedenus.)

Rec. Carbonis spongiae,
Stibii sulphurati nigri,
Sulphuris depurati,
Herbae conii maculati,
Concharum praeparatarum, sing.
ʒj.

M. f. pulv. S. Früh und Abends einen
 mäßigen Theelöffel voll. (Kortum.)

* * *

Rec. Herbae jaceae s. violae tricoloris,
Sacchari lactis, singul. ʒiij.
Sulphuris praecipitati,
Magnesia carbonicae, singul. ʒß.

M. f. pulv. Signa. Zweystündlich einen
 Theelöffel voll,
 (Jahn, gegen Hautausschläge.)

Erregend-reizend auflösende
 Mittel.

Rec. Resinae guajaci nativae, ʒij.
Tartari depurati, ʒß.
Sacchari albi, ʒvj.

M. f. pulv. S. Drey- bis viermal täglich
 einen Theelöffel. (Berends.)

Rec. Hydrargyri muriatici mitis, gr.ij.

Resinae guajaci nativae, ℥j.

Radici glycyrrhizae, ℥iij.

M. f. pulv. Divid. in iv part. aequal.

S. Dreystündlich ein Pulver.

(Burdach.)

Rec. Resinae guajaci nativae, ℥ij.

Sulphuris depurati,

Tartari depurati, singul. ℥℔.

Olei foeniculi, gtt. vj.

M. f. pulv. S. Dreystündlich einen Theelöffel voll.

(Burdach.)

Rec. Resinae guajaci nativae,

Ferri pulverati, singul. ℥℔.

Concharum praeparatarum, ℥℔.

Sacchari albi, ℥iij.

M. f. pulv. Signa. Zweymal täglich eine Messerspitze oder einen Theelöffel voll.

(Goelis, gegen die Skrofelkrankheit.)

Rec. Radicum senegae, ℥℔.

Kali tartarici, ℥vj.

Magnesiae carbonicae, ℥ij.

M. f. pulv. S. Zweymal täglich einen Theelöffel voll. (Von Schmalz in Pirna gegen pannus oculi empfohlen, aber auch sonst ein treffliches, reizend-auflösendes Mittel.)

Rec. Radicum senegae,

Ammonii muriatici depurati, singul. ℥ij.

Gummi mimosae, ℥iij.

Elaeosacchari foeniculi, ℥℔.

M. f. pulv. Detur in vitro. S. Drey-
mal täglich einen Theelöffel voll. (Diese
Verbindung habe ich oft mit grossem
Nutzen gegen sogenannte Verschleimun-
gen, besonders der Brust; auch als Em-
menagogum angewendet.)

Brechenenerregende Mittel.

*Rec. Radicum ipecacuanhae,
Elaeosacchari foeniculi, sing. ℥ ij.*

M. f. pulv. Divid. in iv part. aequal.
S. Alle 10 — 12 Minuten ein Pulver
bis zur Wirkung. (Erregt leicht und si-
cher Erbrechen.)

*Rec. Radicis ipecacuanhae,
Sacchari albi, singul. gr. xv.
Sulphuris stibiati aurantiaci, gr. v.*

M. f. pulv. Divide in iv part. aequal.
S. Alle Viertelstunden ein Pulver.
(Reil.)

*Rec. Radicum ipecacuanhae, ℥ j.
Tartari stibiati, gr. ij.
Sacchari albi, ℥ ij.*

M. f. pulv. Divid. in iij part. aequal.
S. Alle Viertelstunden ein Pulver bis
zur Wirkung. (Berends.)

*Rec. Radicis ipecacuanhae, ʒß.
Zinci oxydati albi, gr. xij.
Elaeosacchari flavedinis citri, ʒ j.*

M. f. pulv. Divid. in vj part. aequal.
S. Alle zehn Minuten ein Pulver, bis

Erbrechen erfolgt. (Bey sensiblen, zu Krämpfen geneigten Individuen.)

Abführende und purgirende Mittel.

Rec. Natri sulphurici siccati, ʒj.

Tartari depurati, ʒß.

Sacchari albi, ʒvj.

M. f. pulv. S. Einen bis zwey Theelöffel zweystündlich. (Berends.)

Rec. Magnesiae sulphuricae, ʒiß.

— *carbonicae, ʒiij.*

M. f. pulv. S. Wie das Vorige. (Berends.)

Rec. Tartari natronati, ʒj.

Natri carbonici aciduli, ʒij.

Elaeosacchari foeniculi, ʒß.

M. f. pulv. S. Stündlich einen reichlichen Theelöffel voll bis zur Wirkung. (Ein mildes und sicheres Abführmittel.)

Rec. Radicis rhei optimi, ʒß.

Natri sulphurici sicci, ʒij.

Elaeosacchari foeniculi, ʒj.

M. f. pulv. S. Auf einmal zu nehmen, und Kamillenthee nachzutrinken. (Burdach.)

Rec. Tartari natronati, ʒiij.

Foliorum sennae, ʒiß.

Radicum rhei, ʒß.

Elaeosacchari foeniculi, ʒij.

M. f. pulv. S. Zweystündlich einen Theelöffel. (Burdach.)

Rec. Radicis jalappae pulveratae, ℥j.
Natri sulphurici siccati, ℥i℔.
Olei foeniculi, gtt. j.

M. f. pulv. S. Auf einmal zu nehmen
 und Fleischbrühe nachzutrinken.

Rec. Natri phosphorici, ℥j.
Elaeosacchari macidis, ℥ij.

M. f. pulv. S. Auf zweymal in Fleisch-
 brühe. (Ein, dem Geschmacke sehr an-
 genehmes, nicht schwächendes Abführ-
 mittel.)

Rec. Radicis jalappae,
Tartari depurati,
Elaeosacchari flavedinis citri, sin-
gul. ℥j.

M. f. pulv. S. Auf einmal zu nehmen.
 (Burdach.)

Rec. Hydrargyrimuriaticimitis, gr. iij.
Radicis jalappae, ℥j.

M. f. pulv. S. Auf einmal.
 (Consbruch.)

Rec. Tartari depurati, ℥℔.
Corticis peruviani regii, ℥ij.
Radicis rhei, ℥℔.
Elaeosacchari menthae crispae, ℥iij.

M. f. pulv. Detur in vitro. S. Drey-
 mal täglich einen Theelöffel.
 (Berends.)

Rec. Radicis rhei,
 — *calami aromatici, singul.*
℥i℔.

Corticis peruviani regii, ℥iij.

Elaeosacchari flavedinis citri, ℥ij.

M. f. pulv. Det. in vitro. S. Wie das Vorige. (Berend's.)

Anmerk. Wenn abführende Mittel mit erregenden oder tonischen verbunden werden, so wirken sie schon in kleinen Gaben und schwächen nicht.

Rec. Radicis rhei,

Scammonei, singul. ℥j.

Elaeosacchari anisi, ℥ß.

M. f. pulv.; divid. in tres part. aequal.

S. Ein Pulver auf einmal.

(Burdach.)

Rec. Resinae jalappae, gr. iij — vj.

Amygdalarum dulcium, cortice liberatarum,

Sacchari albi, singul. ℥j.

Olei de cedro, gtt. j.

Conterantur exactissime. S. Auf einmal in warmem Wasser. (Nicolai.)

Diuretische Mittel.

Rec. Herbae digitalis purpureae, gr. vj.

Radicis calami aromatici,

Sacchari albi,

Gummi mimosae, singul. ℥ß.

M. f. pulc.; divid. in sex part. aequal.

S. Zwey- bis dreymal täglich ein Pulver.

(Consbruch.)

Rec. Radicum squillae, gr. vj.

— *zingiberis, gr.* xij.

Kali nitrici,

Tartari vitriolati, singul. ʒj.

M. f. pulv.; divid. in sex part, aequal.

S. Zwey- bis dreymal täglich ein Pulver.

Diaphoretische Mittel.

Rec. Radicum ipecacuanhae,

Opii crudi, singulor. gr. iij.

Kali sulphurici,

Sacchari albi, singul. ʒß.

M. f. pulv.; divid. in sex part. aequal.

S. Zwey- oder dreystündlich ein Pulver.

(Dover.)

Rec. Opii crudi, gr. iij.

Camphorae, gr. vj.

Kali nitrici, ʒß.

M. f. pulv.; divide in sex part. aequal.

S. Abends ein Pulver mit Fliederthee.

(v. Gräfe.)

Anthelmintische Mittel.

Rec. Florum tanaceti,

Seminis santonici, singul. ʒj.

Ferri sulphurici crystallini, ʒij.

Olei valerianae, gtt. x.

M. f. pulv. Divid. in x part. aequal.

Dentur in charta cerata S. Mor-
gens und Abends ein Pulver.

(Rosenstein.)

Rec. Seminis santonici, ʒj.

Stanni limati, ʒij.

Sacchari, ʒj.

M. f. pulvis. Divide in quatuor part. aequal. S. Früh und Abends ein Pulver zu nehmen. (Fordyce.)

*Rec. Ferri sulphurici crystallin., gr. xxiv.
Seminis santonici, ʒj.
Radicis jalappae,
Sacchari albi, singul. ʒij.*

M. f. pulv.; div. in xij part. aequ. S. Früh und Abends ein Pulver. (Consbruch.)

Besänftigende und krampfstillende Mittel.

*Rec. Extracti opii aquosi, gr. ij.
Acidi succinici, gr. xxv.
Sacchari albi, ʒj.*

M. f. pulv.; divide in sex part. aequal. Dentur in charta cerata. S. Alle 3 Stunden ein Pulver. (Ungnad.)

*Rec. Extracti hyoscyami,
Zinci oxydati albi, singulor. ʒß.
Magnesiae carbonicae, ʒß.
Sacchari lactis, ʒiijß.*

M. f. pulv. Divid. in decem part. aequal. S. Dreystündlich ein Pulver zu nehmen. (Vogler.)

*Rec. Secalis cornuti, ʒij.
Opium crudi, gr. ij.*

M. f. pulvis; divid. in duodecim part. aequal. S. Zweystündlich ein Pulver, bis kräftige Wehen eintreten. (Atlee.)

Rec. Radicis belladonnae, gr. iij.

— *ipecacuanh., gr. ij.*

Zinci oxydati albi, gr. vj.

Sacchari albi, ʒj.

M. f. pulvis; divid. in vj part. aequal.

S. Zweystündlich ein Pulver zu nehmen.

(Gegen nervöse Epilepsie v. Berend s.)

Rec. Bismuthi nitrici praecipitati,

gr. xxiv.

Extracti lactucae virosae, gr. xvij.

Radicis ipecacuanhae, gr. vj.

Magnesia carbonicae, ʒß.

Elaeosacchari menthae crispae, ʒij.

M. f. pulv. Divid. in duodecim part.

aequales. S. Drey- bis viermal täglich

ein Pulver in Wasser oder Kümmelthee

zu nehmen. (Burdach, gegen Magen-

krampf nervösen Charakters.)

Rec. Radicis valerianae minoris, ʒj.

Zinci oxydati albi, gr. vj.

Cupri sulphurico-ammoniat,

gr. iß — gr. vj.

Sacchari albi, ʒj.

M. f. pulv. Divide in sex part. aequal.

S. Dreystündlich ein Pulver.

Rec. Opii crudi, gr. iij.

Ammonii carbonici sicci, ʒß.

Elaeosacchari menthae crispae, ʒj.

M. f. pulv. Divide in sex part. aequal.

S. Dreystündlich ein Pulver.

(Formey.)

Erregende Mittel.

Rec. Moschi genuini, gr. viij.

Ammonii carbonici pyro-oleosi, ʒß.

Elaeosacchari valerianae, ʒj.

M. f. pulv. Divid. in vj part. aequal.

Dentur in charta cerata. S. Zwey-
stündlich ein Pulver. (Berends.)

Rec. Radicis valerianae minoris, ʒß.

Magnesiae carbonicae,

Ammonii muriatici depurati,

sing. gr. xxiv.

Olei cajeput, gtt. xxxij.

M. f. pulv.; detur in vitro, subere clau-

so. S. Dreymal täglich einen Theelöf-
fel voll. (Nachahmung des Ragolo'-
schen Mittels gegen Epilepsie.)

Rec. Camphorae, gr. xvj.

Sulphuris depurati, ʒß.

Elaeosacchari anisi, ʒij.

M. f. pulv. Divid. in octo part. aequal.

Dentur in charta cerata. S. Drey-
mal täglich ein Pulver.

(S. G. Vogel.)

Rec. Seminis phellandrii aquatici,

Sacchari lactis, singul. ʒij.

M. f. pulv.; divide in vj part. aequal.

S. Dreystündlich ein Pulver zu nehmen.

(Hufeland.)

Rec. Castorei sibirici, gr. xvij.

Natri carbonici depurati, ʒß.

Elaeosacchari menthae crispae, ʒj.

M. f. pulv. Divide in vj part. aequal.
Dentur in charta cerata. S. Drey-
 stündlich ein Pulver. (In asthenischen
 Krämpfen.)

Rec. Ammonii carbonici pyro - oleosi,
 ʒß.

Hydrargyri murialici mitis,
 gr. xij.

Stibii sulphurati rubri,
Opii crudi, singul. gr. iij.
Sacchari, ʒj.

M. f. pulv. Divid. in sex part. aequal.
S. Drey - bis vierstündlich ein Pulver.
 (Kraft, gegen Lungenlähmung.)

Rec. Opii crudi,
Radici ipecacuanhae, sing. gr. vj.
Natri carbonici sicci, ʒj.

M. f. pulv.; divid. in sex part. aequal.
S. Achtstündlich ein Pulver zu nehmen.
 (Thompson gegen Asthma krampfhaft-
 en Charakters.)

Rec. Acidi benzoïci, ʒß.
Camphorae,
Sulphuris stibiati aurantiaci,
singul. gr. vj.
Elaeosacchari foeniculi, ʒj.

M. f. pulv. Divide in sex part. aequal.
S. Zweystündlich ein Pulver. (Berends
 gegen Lungenlähmung.)

Rec. Radicum pyrethri, ʒß — ʒij.
Elaeosacchari menthae, ʒj.

M. f. pulv. Divid. in sex part. aequal.

S. Dreystündlich ein Pulver.

(Burdach.)

Stärkende Mittel.

Rec. Corticis ligni quassiae, ʒj.

Magnesiae carbonicae, ʒiij.

M. f. pulv. Divide in sex part. aequal.

S. Zweymal täglich ein Pulver. (Tode gegen Magenkrampf.)

Rec. Lupulini, ʒj.

Sacchari albi, ʒij.

Tere exactissime, saccharum sensim addendo. Signa. Dreymal täglich eine reichliche Messerspitze voll. (Magenstärkend. Magendie.)

Rec. Radicis rhei,

Magnesiae carbonicae,

Boli armenae, singul. ʒj.

M. f. pulv. Divide in xij part. aequal.

S. Dreymal täglich ein Pulver. (v. Hildenbrand in Pisa, gegen atonische Metrorrhagie.)

Rec. Radicis rhei, ʒj.

Boli armenae,

Magnesiae carbonicae,

Elaeosacchari macidis, sing. ʒij.

M. f. pulv. Det. in vitro. S. Zweymal täglich einen Theelöffel voll. (Rust, gegen habituelle Metrorrhagie.)

Rec. Pulveris radicis columbo, ʒij.

Elaeosacchari macidis, ʒj.

M. f. pulv. Divid. in sex part. aequal.
S. Vierstündlich ein Pulver. (P. Frank,
 gegen atonische Diarrhöe.)

Rec. Radicum valerianae minoris, ʒij.
Foliorum aurantii, ʒß.
Sacchari albi, ʒvj.

M. f. pulv. S. Drey- bis viermal einen
 Theelöffel in Wein. (Berends.)

Rec. Extracti myrrhae aquosi, ʒij.
Sacchari lactis, ʒj.
Natri acetici,

Elaeosacchari foeniculi, sing. ʒij.
M. f. pulv. S. Dreymal täglich einen
 Theelöffel voll. (Diese Verbindung ha-
 be ich oft mit Nutzen bey Atonie der
 Abdominalorgane gebraucht.)

Rec. Corticis peruviani regii, ʒvj.
*Elaeosacchari flavedinis aurantio-
 rum, ʒiij.*

Tincturae opii crocatae, gtt. xxiv.
M. f. pulv. Divid. in duodecim part.
aequal. S. In der Apyrexie zwey-
 stündlich ein Pulver. (Berends, gegen
 einfach nervöse Wechselfieber.)

Rec. Chininii s. cinchonii sulphurici,
gr. xij — xxx.

Natri acetici,
Sacchari albi, singul. ʒj.

M. f. pulv. Divid. in sex part. aequal.
S. In der Apyrexie alle zwey Stunden
 ein Pulver.

Rec. Ferri pulverati, ʒj.
Lapidum cancrorum, ʒß.
Sacchari albi, ʒij.

M. f. pulv. S. Drey- bis viermal täglich einen Theelöffel voll. (Goelis, gegen Rhachitis.)

Rec. Ferri pulverati, ʒj.
Corticis cinnamomi,
Sacchari albi, singul. ʒv.

M. f. pulv. Divid. in x part. aequal.
S. Zwey- bis dreymal täglich ein Pulver.

Adstringirende Mittel.

Rec. Aluminis crudi, ʒj.
Gummi arabici, ʒß.

M. f. pulv. Divid. in iv part. aequal.
S. Dreystündlich ein Pulver. (P. Frank, gegen atonische Blutflüsse.)

Rec. Opüi crudi, gr. iv.
Corticis cinnamomi, ʒj.
Aluminis, ʒj.

M. f. pulv. Divid. in iv part. aequal.
S. Vierstündlich ein Pulver. (Jahn, gegen atonische Metrorrhagien.)

Rec. Kino, ʒß.
Opüi crudi, gr. ij.
Elaeosacchari cinnamomi, ʒj.

M. f. pulvis; divid. in vj part. aequal.
S. Zweystündlich ein Pulver. (Gegen asthenische Blutflüsse habe ich dieses Pulver oft mit Erfolg angewendet.)

Rec. Plumbi acetici, gr. iiij — xij.
Extracti opii aquosi, gr. iß.
Sacchari albi, ʒj.

M. f. pulv. Divid. in sex part. aequal.
S. Zwey- bis dreymal täglich ein Pul-
ver. (Berends.)

Rec. Plumbi acetici, gr. j.
Extracti opii aquosi, gr. ij.
— myrrhae, gr. iv.

Gummi mimosae,
Sacchari lactis, singul. ʒij.

M. f. pulv. Divid. in viij part. aequal
S. Zweystündlich ein Pulver zu nehmen.
(Marcus, gegen Lungenschwindsucht.)

Pulver zum äußerlichen Gebrauch.

Rec. Zinci oxydati albi, ʒj.
Seminis lycopodii, ʒj.

M. f. pulv. S. Zum Einstreuen. (Be-
rends, gegen das Wundseyn der Kin-
der.)

Rec. Boracis, ʒj.
Sacchari albi, ʒij.

M. f. pulv. S. Zweymal täglich in die
Brustwarze einzustreuen, und dann als-
bald das Kind anzulegen. (Kluge, ge-
gen Schwämmchen.)

Rec. Gummi mimosae,
Colophonii, singul. ʒß.

M. f.

M. f. pulv. subtilissimus. S. Streupulver gegen den Vorfall des Mastdarms.
(Klein.)

Rec. Kino, ʒß.

Gummi mimosae, ʒj.

M. f. pulv. S. Zum Einstreuen. (Lentin's styptisches Pulver, in Blutege-
wunden.)

Rec. Extracti, aëre exsiccati belladonnae,

Extracti, aëre exsiccati hyoscyami,

Opii crudi, singul. ʒj.

M. f. pulv. subtilissimus. S. Mit Speichel in die Umgegend des Auges einzureiben, zur Erweiterung der Pupille.
(v. Graefe.)

Rec. Natri muriatici,

Concharum praeparatarum,

singul. q. p.

M. fiat pulvis subtilissim. S. Täglich zwey- bis dreymal ein wenig davon vermittelst eines Pinsels ins Auge zu bringen. (Kranz, gegen leukomatische Verdunkelung der Hornhaut.)

Rec. Hydrargyri puri, ʒj.

Sacchari albi, ʒiij.

Conterantur usque dum hydrargyrum sit extinctum; adde

Pulveris florum liliorum alborum,

— radice valerianae mino-

ris, singul. ʒj.

M. f. pulv. S. Schnupftabak. (Richter, gegen Amaurose.)

Rec. Herbae majoranae,
Flor. lavandulae,
Sacchari albi, singul. ʒj.
Florum convallariae majalis,
Saponis medicati, singul. ʒß.
Olei caryophyllorum,
 — bergamottae, singul. gtt. ij.

M. f. pulv. S. Niesepulver.
 (Hufeland.)

Rec. Corticis peruviani rubri, ʒß.
Radiciis iridis florentinae, ʒij.
Ammonii muriatici, ʒj.
Sanguinis draconis, ʒiß.
Myrrhae, ʒij.

M. f. pulv. S. Zahnpulver.
 (Consbruch.)

Rec. Corticis peruviani,
Sacchari albi, singul. ʒß.
Camphorae, ʒj.

M. f. pulv. S. Einstreupulver in schlaffe Geschwüre.

Rec. Carbonis vegetabilis,
Corticis peruviani, singul. ʒß.
Corticis salicis laureae,
Radiciis calami, singul. ʒij.

M. f. pulv. S. Mit Wein zum Breiumschlag auf brandige Stellen oder Geschwüre.
 (Berends.)

Rec. Cinnabaris factitii, ʒij.
Cinerum solearum, gr. viij.

Sanguinis draconis, gr. xij.

Arsenici albi, grana quadragint. (gr. XL.)

M. f. pulv. subtilissimus. S. Mit Speichel gemischt, anzuwenden. (Frère Côme's Krebsmittel.)

Species, Kräuter.

Erweichende Mittel.

Rec. Radicum althaeae, ʒß.

— *graminis*, ʒiß.

— *glycyrrhizae*, ʒvj.

Concisae misce, fiant species. S. Zwey gehäufte Eßlöffel voll mit anderthalb Quart Wasser eine Viertelstunde lang zu kochen; zum gewöhnlichen Getränk.

(Berends,)

Rec. Seminis lini recentis, ʒß.

Specierum ad infusum pectorale.
ʒij.

Misce, fiant spec. S. Brustthee.

(Berends.)

Auflösende Mittel.

Rec. Taraxaci totius, ʒj,

Herbae trifolii,

Summitatum millefolii, sing. ʒß.

Radicis calami aromatici, ʒij.

Concisae misce; fiant species. Einen gehäuften Eßlöffel voll mit einem halben Quart Wasser auf drey Tassen einzukochen. (Berends.)

Rec. Stipitum dulcamarae, ʒij — ʒiij.

Specierum pectoralium, ʒß.

M. f. species, dentur in quadruplo. S.

Ein Packet mit 6 Tassen Wasser auf 3 Tassen einzukochen, und davon dreymal täglich eine Tasse zu trinken.

(Berends.)

Rec. Stipitum dulcamarae,

Radicis glycyrrhizae, singul. ʒß.

Herbae althaeae, ʒj.

Conc. misce, fiant species. S. Zum Thee. (Gölis, gegen den Keuchhusten.)

Rec. Foliorum sennae,

Seminis foeniculi, singul. ʒiij.

Radicis glycyrrhizae, ʒß.

— *gramines, ʒiij.*

Concisa, contusa misce; f. species. S.

Zwey Loth mit sechszehn Unzen Wasser zu zwölf Unzen Kolatur gekocht, den Tag über zu verbrauchen.

(Burdach.)

Rec. Foliorum sennae, ʒiij.

Herbae trifolii fibrini, ʒß.

— *menthae piperitae, ʒij.*

Flavedinis corticum aurantium,
3iß.

Fiant spec. S. Einen gehäuften Eßlöffel
voll mit drey Tassen Wasser anzubrühn.
(Steinrück in Berlin.)

Rec. Stipitum dulcamarae, 3j — 3ij.
Specierum ad decoctum lignorum,
3j.

Radicis glycyrrhizae, 3ß.

Fiant species, dentur in quadruplo. S.
Ein Packet mit zwey Quart Wasser auf
ein Quart eingekocht, den Tag über zum
gewöhnlichen Getränk zu verbrauchen.
(Burdach.)

Rec. Florum arnicae concisarum, 3ij.
Specierum ad infusum pectorale,
3ij.

Misce. S. Auflösender Brustthee,
(Berends.)

Abführende Mittel.

Rec. Foliorum sennae concisorum, 3j.
Natri sulphurici, 3j.

Misce, detur in triplo. S. Ein Packet
mit drey Tassen Wasser anzubrühn, u.
alle halbe Stunden eine halbe Tasse zu
trinken. (Hufeland.)

Rec. Foliorum sennae, 3iß.
Tartari natronati, 3ij.
Specierum pectoralium,
Herbae menthae piperitae,
singul. 3ij.

Concisa contusa misce; fiant species.
Dentur in triplo. S. Wie das Vorige.
 (Berends.)

Diuretische Mittel.

Rec. Radicum ononidis,
Summitatum genistae, sing. ℥ij.
Baccarum juniperi, ℥j.
Seminis petroselini,
 — *anisi, singul. ℥iij.*

Concisa contusa misce. Fiant species.
Signa. Zwey gehäufte Eßlöffel voll mit
 sechs Tassen Wasser leicht aufgekocht,
 den Tag über zu verbrauchen.

Rec. Summitatum juniperi,
Radici ononidis, singul. ℥ij.
Seminis sinapis,
 — *petroselini, singul. ℥ß.*

Concisa contusa misce. S. Die Hälfte,
 mit einem Schoppen Wasser angebrüht,
 den Tag über zu verbrauchen.

Diaphoretisch - diuretische oder
 sogenannte blutreinigende
 Mittel.

Rec. Turionum pini,
Ligni guajaci,
Baccarum juniperi, singul. ℥j,

Concisa contusa misce. S. Zwey Eß-
 löffel voll mit $1\frac{1}{2}$ Quart Wasser zu einem
 Quart eingekocht, den Tag über zu ver-
 brauchen.
 (Höxter.)

Rec. Ligni juniperi,
Radicis taraxaci,
 — *graminis,*
 — *cichorei, singul. ʒ ij.*
 — *senegae,*
Seminis foeniculi,
 — *petroseliní,*
Baccarum juniperi, singul. ʒ ij.

Concisa contusa misce. S. Zwey Eßlöffel voll mit $1\frac{1}{2}$ Quart Wasser auf ein Quart einzukochen. (Selle's blutreinigender Thee.)

Erregende Mittel.

Rec. Croci, ʒ ij.
Florum aurantii, ʒ j.
 — *chamomillae, ʒ iij.*
Concisa misce; fiant species. S. Einen gehäuften Eßlöffel voll mit drey Tassen Wasser anzubrühen. (Berends. Ein treffliches feines Nervenmittel.)

Rec. Seminis carvi, ʒ iß.
 — *foeniculi, ʒ iij.*
Herbae menthae piperitae, ʒ ij.
Florum chamomillae, ʒ ß.
Concisa contusa misce. S. Wie das Vorige. (Ein gutes Karminativmittel.)
Rec. Seminis phellandrii aquatici, ʒ iij.
Herbae menthae crispae,
Florum chamomillae, singul. ʒ ß.
Foliorum aurantii, ʒ vj.

Conc. cont. misce. S. Einen starken Eßlöffel voll mit drey Tassen Wasser anzubrühen. (Ich habe diesen Thee oft mit grossem Nutzen in hysterischen und hypochondrischen Brust- und Darmkrämpfen angewendet.)

*Rec. Foliorum aurantii,
Radici caryophyllatae,
— valerianae,*

Summitatum millefolii, sing. ʒiij.
Concisa misce. S. Einen, zwey bis drey Eßlöffel mit einem Pfund Wasser anzubrühen, und den Tag über zu verbrauchen. (H u f e l a n d.)

*Rec. Radici valerianae minoris, ʒiij.
Summitatum millefolii, ʒß.
Herbae menthae piperitae,
Seminis foeniculi, singul. ʒij.*

Conc. cont. misce. S. Einen bis zwey Eßlöffel mit drey Tassen Wasser anzubrühen. (B e r e n d s.)

*Rec. Radicum valerianae minoris,
Foliorum aurantii,
Summitatum millefolii, singul. ʒj.
Herbae salviae,
— menthae crispae, sing. ʒiß.
Florum chamomillae.
Seminis foeniculi, singul. ʒij.*

Conc. cont. misce. Signa. Zum Thee.
(K ä m p f's *species nercinae.*)

Stärkende Mittel.

Rec. Herbae trifolii fibrini, ʒß.
Corticum aurantiorum, ʒij.
Foliorum aurantii, ʒj.
Herbae menthae piperitae, ʒiij.
Concisa misce. S. Zum Thee.
 (Berends.)

Rec. Herbae tussilaginis, ʒj.
Radici polygalae amarae, ʒß.
Specierum pectoralium, ʒiß.
Conc. misce. S. Stärkender Brustthee.

Rec. Summitatum chamaedryos,
 — *centaurii,*
 — *fumariae,*
Herbae trifolii febrini,
Strobilorum humuli, singul. ʒß.
Concisa misce. S. Zur Theeabkochung.
 (Aus Richard's Taschenbuch.)

Rec. Corticis peruviani regii, ʒvj.
 — *aurantiorum, ʒiij.*
Radicum gentianae rubrae, ʒß.
 — *calami aromatici, ʒij.*
Corticum cinnamomi, ʒiß.
Conc. misce. S. Mit einem Maafs Wein
kalt zu übergießen, und unter öfterem
Umschütteln drey Tage stehen zu lassen.
Weingläserweise.

Rec. Corticum cinnamomi, ʒiij.
Summitatum millefolii, ʒvj.
Florum chamomillae, ʒß.

Concisa misce. Fiant species. S. Einen reichlichen Eßlöffel mit drey Tassen Wassers anzubröhen, und davon kalt dreymal täglich einen Tassenkopf voll zu trinken. (Diesen Thee habe ich oft mit Nutzen gegen leichtere, atonische Metrorrhagien und gegen ähnliche Leukorrhöen angewendet.)

Morsellen, Zeltchen und Küchelchen.

Temperirende Mittel.

Rec. Sacchari albi, ℥ij.

Aquae, q. s.

Succi citri recens expressi, ℥ij.

Elaeosacchari flavedinis citri, ℥j.

Fiant l. a. rotulae, dentur in scatula.

S. Stückweise zu nehmen.

(Nach Schubarth.)

Absorbirende Mittel.

Rec. Magnesiae ustae, ℥j.

*Pastae fabarum cacao (Chokolade),
℥ij.*

Sacchari albi, ℥v.

Misce. Fiant cum mucilagine tragacanthae morsulae ponderis granor. xxiv. S. Zwey- bis viermal täglich ein Stück zu nehmen. (Chevalier.)

*Rec. Magnesiae carbonicae, ʒj.
Lapidum cancrorum, ʒß.
Cinnamomi acuti, ʒj.
Sacchari, ʒvj.*

Fiant cum mucilagine tragacanthae trochisci ponderis gr. x. S. Drey- bis viermal täglich ein Stück. (J. A. Schmidt.)

Auflösende Mittel.

*Rec. Stibii sulphurati nigri, ʒß.
Elaeosacchari flavedinis citri, ʒj.
Corticis cinnamomi, ʒß.*

Fiant cum mucilagine tragacanthae trochisci numer. XLviij (gr. v stibii cont.). S. Zweymal täglich eins zu nehmen. (Fleisch.)

*Rec. Stibii sulphurati nigri, ʒvj.
Resinae guajaci nativae, ʒiij.
Extracti aconiti, ʒj.*

*Mucilaginis tragacanthae, q. s.
ut fiant rotulae numero xx (für Kinder müssen es 40 Stück werden). S. Viermal täglich ein Stück. (Weikard.)*

*Rec. Carbonis spongiae,
Pastae fabarum cacao, sing. ʒß.
Mucilaginis tragacanthae, q. s.*

ut fiant trochisci numer. xx. S. Drey-
mal täglich ein Stück zu nehmen.

Rec. Emetini, grana sedec. (gr.xvj).
Sacchari albi, ℥ij.

Fiant cum mucilagine tragacanthae tro-
chisci pond. granor. novem (gr.ix).
S. Zwey - bis dreystündlich ein Stück.
(M a g e n d i e.)

Die Gabe des Emetins ist in dieser For-
mel so klein, daß das Mittel nur auflösend,
expektorirend, krampfstillend wirken kann.
M a g e n d i e schreibt aber auch brechener-
regende Trochisken aus Emetin vor, welche
in jedem Falle unzweckmäfsig sind.

Abführende Mittel.

Rec. Olei crotonis, guttulas duas
(gutt. ij).

Sacchari albi,

Gummi arabici, singul. ℥j.

Misce exacte, fiant cum syrupo sim-
plici trochisci numero octo (viij). S.
Zweystündlich ein Stück bis zur Wirkung.
(S e i l e r.)

Anthelminthische Mittel.

Rec. Seminis santonici,

Florum tanaceti, singul. ℥ij.

Hydrargyri sulphurati nigri,

Radici jalappae, singul. ℥i℥.

Corticis cinnamomi, ℥j.

Sacchari albi, in aqua rosarum soluti, et ad consistentiam tabulandi cocti, ℥ iiiß.

Fiant morsuli ponder. ℥ j.

S. Für Erwachsene ein bis zwey Stück täglich. (J. A. Schmidt.)

Stärkende Mittel.

Rec. Extracti chinae frigide parati, ℥ ij.

Sacchari, ad consistentiam rotulandi cocti, ℥ ij.

Olei cinnamomi, gtt. vj.

Fiant l. a. rotulae, dentur in vitro. S. Drey mal täglich fünf bis zehn Stück zu nehmen. (Ich habe sie einst einer verwöhnten Dame gegen Atonie der Gebärmutter gebrauchen lassen.)

Rec. Pulveris corticis cinnamomi, — seminum cardamomi minoris,

Pulveris nucum moschatarum, singul. ℥ j.

Sacchari, ad consistentiam tabulandi cocti, ℥ iiß.

Fiant. l. a. mortuli numer. xij. S. Eine Stunde vor dem Essen ein Stück mit einem Glase Rheinwein.

(Brückner.)

Rec. Radicum ipecacuanhae, ℥ j. Catechu, ℥ ij.

Ambrae, gr. iij.

Sacchari albi, ʒj.

Misce. Fiant cum mucilagine tragacanthae trochisci numer. lx. S. Ein bis zwey Stück zweymal täglich. (Daubenton, gegen Atonie des Nahrungskanals und habituelle, atonische Diarrhöen.)

Pillenformeln.

A u f l ö s e n d e M i t t e l.

Rec. Saponis medicati,

Natri carbonici sicci, singul. ʒij.

Misce, fiant cum extracti trifolii q. s. pilul. ponderis gr. ij; conspergantur pulv. rad. glycyrrhiz. S. Drey mal täglich drey bis zehn Stück zu nehmen. (Berends, als auflösendes, absorbirendes und lithontriptisches Mittel.)

Rec. Hyrargyri puri, ʒj.

Gummi mimosae, ʒij.

*Tere ad extinctionem hydrargyri, cum pauxillo aquae destillatae;
adde*

Extracti conii maculati, ʒj.

Pulveris radices glycyrrhizae, q. s.

*ut fiant pilul. pond. gr. ij. S. Früh u.
Abends 6 — 10 Stück. (Plenk.)*

*Rec. Hydrargyri stibiato-sulphurati, ʒj.
Resinae guajaci nativae,
Saponis medicati, singul. ʒij.*

*Misce, fiant pilul. gr. ij. S. Drey mal
täglich 5 — 10 Stück. (Berends.)*

Rec. Stibii sulphurati nigri, ʒß.

*Resinae guajaci nativae,
Extracti fumariae, singul. ʒj.*

*Fiant cum tinct. rhei aquos. q. s. pilul.
gr. j. S. Viermal täglich 10 — 15 Stück
zu nehmen. (Klein.)*

*Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci,
Extracti arnicae, singul. ʒj.
Sulphuris depurati, ʒß.*

Oxymellis squillitici, q. s.

*ut fiant pilul. gr. ij. S. Zweymal täg-
lich 12 Stück zu nehmen. (Stoll.)*

*Rec. Extracti taraxaci,
— millefolii,
— cardui benedicti,
— arnicae, singul. ʒij.*

Kali acetici,

Ammoniacy, singul. ʒß.

Radici rhei, ʒij.

*Misce, fiant pilul. gr. ij. S. Ein - bis
zweymal täglich 15 — 30 Pillen.*

(Kämpf.)

*Rec. Ammoniacy,
Saponis medicati,
Extracti taraxaci, singul. ʒij.*

Misce, fiant pilul. gr. ij. S. Dreymal
täglich 15 Stück zu nehmen.

(Tissot.)

Rec. Saponis stibiati, ʒj.

Radicis rhei optimi, ʒiv.

Ammoniacy, ʒiij.

Extr. taraxac., q. s.,

ut fiant pilul. gr. ij. S. Viermal täglich
6 — 10 Pillen. (Burdach.)

Rec. Stibii sulphurati nigri, ʒiʒ.

Corticis cascarillae, ʒij.

Fiant c. extr. fumar. pilul. gr. iij. S.
Dreymal täglich 4 — 6 Stück.

(Burdach.)

Rec. Saponis stibiati, ʒij.

Ammoniacy, ʒiʒ.

Extracti gratiolae, ʒʒ.

M. f. pilul. gr. ij. S. Dreymal täglich
5 — 10 Stück.

Rec. Kali sulphurati, ʒj.

Carbonis vegetabilis,

Extracti cardui benedicti, sing. ʒij.

M. f. pilul. gr. ij. S. Viermal täglich 15
— 20 Pillen. (Von Garnett gegen
Lungenschwindsucht empfohlen.)

Rec. Tartari stibiati, gr. x.

Radicis belladonnae, gr. viij.

Extracti conii maculati, ʒʒ.

Saponis medicati, ʒiij.

Asae foetidae, ʒj.

M. f. pilul. gr. ij. S. Dreymal täglich
10 Stück. (Richter.)

Rec. Ammoniaci,
Galbani,
Saponis medicati, singul. ʒj.
Radicis rhei, ʒß.
Tartari stibiati, grana sedecim
(gr. xvj).

Succi glycyrrhizae inspissati, ʒj.
M. f. pilul. gr. j. S. Zweymal täglich
15 Pillen. (Schmucker.)

Rec. Stibii sulphurati nigri, ʒß.
Asae foetidae, ʒiß.
Extracti conii maculati, ʒj.
— aconiti, ʒß.

M. f. pilul. gr. ij. S. Zweymal täglich
acht Stück. (Stoll.)

Rec. Extracti helenii,
Sulphuris depurati,
Succi glycyrrhizae inspissati,
singul. ʒj.

Ammoniaci, ʒij.
Radicis iridis florentinae, ʒß.
M. f. pilul. gr. ij. S. Zweymal täglich
10 Stück. (Quarin.)

Rec. Fellis tauri, ʒß.
Saponis medicati, ʒj.
Aloës, ʒj.

M. f. c. liquore kali carbonic. pilul. gr. ij.
S. Zweymal täglich 5 — 15 Pillen.

Rec. Ammoniaci,
Extracti taraxaci,
Saponis medicati, singul. ʒj.

Asae foetidae,

Aloës, singul. ʒiʒ.

M. f. pilul. gr. ij. S. Zweymal täglich
10 Stück. (Jahn.)

Alterirende Mittel.

Rec. Hydrargyri puri, ʒij.

Terebinthinae, ʒj.

Tere usque ad hydrargyri extinctionem,
adde

Zinci oxydati albi, ʒij,

M. f. pilul. gr. ij. S. Am ersten Tage
zweymal eine Pille, dann an jedem der
folgenden Tage um eine Pille gestiegen,
bis sich Ekel und Erbrechen einstellen.
Dann setzt man das Mittel um einige Ta-
ge aus. Es soll von den empfindlichsten
Kranken ertragen werden, und erst sehr
spät Speichelfluss erregen.

(Molwitz.)

Rec. Hydrargyri nitrici oxydulati cry-
stallini, grana sex (gr. vj).

Solve in pauxillo aquae destillat.

Adde

Pulveris radice althaeae, ʒiʒ.

M. fiant pilulae numero sexaginta
(Lx). *S. Nach Verordnung.*

Anmerkung. Das salpetersaure
Quecksilberoxydulat lasse ich nach
folgender Vorschrift bereiten:

Rec. Hydrargyri puri, ℥iib.

Acidi nitrici puri, ℥ij.

Aquae destillatae simpl., ℥j.

Seponantur loco frigido, donec crystalli existant, aqua destillata sedulo abluendi. Serva ad usum.

Von den Pillen gebe ich anfänglich Morgens und Abends eine, und steige um den dritten Tag mit einer Pille, so daß zuletzt täglich zwey Gran des Mittels genommen werden. Diese höchste Gabe lasse ich drey bis fünf Tage hinter einander fortbrauchen, und vermindere dann die Gabe einen Tag um den andern um eine Pille, bis wiederum nur eine Pille genommen wird. Zum Getränk lasse ich ein mäßig starkes Sarsaparillenwasser nehmen. Das Mittel wird außerordentlich gut ertragen, greift die Verdauungsorgane sehr wenig an, und wirkt mehr auf die Diuresis, als auf den Schweiß. Ich habe es mit Erfolg gegen frische und ältere Syphilis, auch gegen eingewurzelte skrofulöse, herpetische, arthritische Kachexien angewendet.

Rec. Hydrargyri muriatici mitis,

Sulphuris stibiati aurantiaci,

singul. ℥j.

Conterantur exactissime per tres circiter horas.

Adde

Extracti glycyrrhizae, ℥ij.

M. f. pilul. gr. ij. S. Früh und Abends zwey Pillen zu nehmen. (Plummer's pilul. alterantes.)

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi, grana duo (gr. ij).

Solve in

Aetheris sulphurici, ʒß.

Solutioni adde

Pulveris radidis glycyrrhizae, ʒj.

Tere in mortario ad siccitatem usque, tunc adde

Succi glycyrrhizae inspissati, q. s. ut fiant pilul. numero sexagint. (lx).

S. Anfänglich Morgens und Abends eine Pille zu nehmen. (Meurer.)

Anm. Durch das angegebene Verfahren soll die Zersetzung des Sublimats, welche bey der Beobachtung der gewöhnlichen Vorschriften statt findet, vermieden werden.

Rec. Unguenti hydrargyri cinerei, ʒß.

Saponis medicati, ʒ viij.

Amyli, ʒ iij.

M. f. pilul. gr. iv. S. Anfänglich Morgens und Abends eine Pille. (Im hôpital St. Louis gebräuchlich.)

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi, grana sex (gr. vj).

Ammonii muriatici depurati, gr. xv.

Solve in suff. quant. aqu. destill. Solutioni filtratae,

adde

Pulveris radidis althaeae, ʒ iiß.

Fiant pilul. numero nonaginta et sex
(xcvj). *S.* Anfänglich Morgens und
Abends eine Pille. (Berends.)

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi,
grana duodecim (gr. xij).

Solutis in pauxillo aquae destillatae,
q. s., adde

Micae panis albi,

Sacchari albi, singul. q. s.

ut fiant pilul. numer. ccxl (240).

Am ersten Tage werden 4 Pillen bald nach dem Mittagessen genommen, dann aber jedesmal um 2 Pillen mehr, doch überhaupt nur einen Tag um den andern, bis der Kranke, am letzten Tage der Behandlung, 30 Pillen, also anderthalb Gran Sublimat bekommt. Die gröfseren Gaben können in mehrere kleinere zertheilt werden, welche aber rasch hinter einander genommen werden müssen. Üble Zufälle sind durch Opiumtinktur zu beseitigen. Die ganze Kur dauert sieben und zwanzig Tage, und muß durchaus, sowol was die Zeit als die Quantität des Mittels betrifft, vollendet werden. Durch Sarsaparillende-kokt, warmes Verhalten wird eine beständige Hautausdünstung unterhalten; auch darf sich der Kranke nur halb satt essen. (Dzondi's zuverlässige [??] Heilart der Syphilis.)

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi,
grana decem (gr. x).

Opii crudi,
Camphorae, singul. ℥℥.
Pulveris radices glycyrrhizae,
Succi glycyrrhizae inspissati,
singul. ℥j.

M. f. pilul. numero sexaginta (Lx).
S. Anfänglich Morgens und Abends eine
Pille zu nehmen. (v. Graefe.)

Rec. Hydrargyri jodici,
granum unum (gr. j).
Succi juniperi inspissati, gr. xij.
Pulveris radices glycyrrhizae, q. s.
ut fiant pilul. numer. octo (viij). S.
Früh und Abends zwey bis vier Stück zu
nehmen. (Magendie.)

Reizend auflösende Mittel.

Rec. Carbonis spongiae, ℥℥.
Gummi mimosae, ℥℥.
Corticis cinnamomi, gr. viij.
Syrupi corticum aurantiorum, q. s.
ut fiant pilulae (sive potius boli) nu-
mero duodecim (xij). S. Morgens
ein Stück im Munde zergehen zu lassen.
(Wylie.)

Rec. Carbonum spongiae, ℥j.
Ammoniacy,
Extracti fumaricae, singul. ℥iv.
Sulphuris depurati,
Stibii sulphurati nigri, sing. ℥℥.

M. f. pilul. ponder. gr. iij. S. Drey-
bis viermal täglich sechs Pillen zu neh-
men. (Burdach.)

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci, ℥j.
Hydrargyri muriatici mitis, ℥ß.
Extracti aconiti,
grana sex (gr. vj).

Saponis medicati,
Resinae guajaci nativae, sing. ℥iv.
M. f. pilul. gr. ij. S. Zwey- bis drey-
mal täglich vier bis acht Stück zu neh-
men. (Berend s.)

Rec. Extracti conii maculati, ℥ij.
— corticis peruviani, ℥ij.
Hydrargyri muriatici mitis,
Sulphuris stibiati aurantiaci,
singul. gr. xv.

M. f. pilul. gr. ij. S. Zweymal täglich
acht Stück. (Weikard.)

Rec. Extracti hellebori nigri,
— myrrhae aquosi, sing. ℥ij.
Herbae cardui benedicti, q. s.
ut fiant pilul. gr. j. S. Zweymal täglich
vier Stück. (Bacher's *pilul. tonicae.*)

Rec. Pulveris radices valerianae,
— florum arnicae,
Asae foetidae, singul. ℥ij.
Extracti pulsatillae, ℥ß.
Tartari stibiati, gr. xij.

M. f. pilul. gr. ij. S. Dreymal täglich
15 Stück. (Rust, gegen Amaurose.)

*Rec. Extracti opii aquosi,
Tartari stibiati, singul. grana
tria (gr. iij).*

Gummi tragacanthae, gr. x.

Conservae rosarum, q. s.

ut fiant pilul. numer. quinquagint.

(1). *S.* Morgens und Abends zwey Stück
zu nehmen. (Paris et.)

Abführende Mittel.

Rec. Hydrargyri muriatici mitis,

Extracti aloës aquosi,

Saponis medicati, singul. ℥j.

M. f. pilul. gr. ij. S. Zwey bis drey
Stück Abends. (Burdach.)

Rec. Resinae jalappae,

Hydrargyri muriatici mitis,

Saponis medicati, singul. ℥j.

M. f. pilul. gr. ij. S. Neun Stück auf
die Gabe.

Rec. Resinae jalappae, ℥j.

Solve in spiritus vini rectificatissimi, ℥ij.

Adde

Saponis medicati, ℥j.

Evaporentur ad aptam spissitudinem,

fiant pilul gr. iv. S. Abends u. Mor-
gens zwey Stück. (Althof.)

Rec. Radicis rhei, ℥ij.

Extracti corticis peruvian, q. s.

M. f. pilul. gr. ij. S. Abends und Mor-
gens 5 — 10 Stück. (Berends.)

Rec.

Rec. Olei crotonis, gtt. iij (gutt. tres).
Saponis medicati, ℥ j.
Olei menthae crispae, gtt. vj.
Fiant pilul. numer. decem (x). S. Zwey
 bis fünf Pillen auf einmal.

Diuretische Mittel.

Rec. Ammoniacy, ℥i℔.
Radicis senegae, ℥ij.
Sulphuris stibiati aurantiacy, ℥℔.
Radicis squillae, gr. xv.
M. f. c. extr. taraxac. q. s. pilul. gr. ij.
S. Dreymal täglich fünf bis acht Stück
 zu nehmen. (Berends.)

Rec. Radicis scillae,
Hydrargyri muriatici mitis,
singul. ℥ij.
Aloës, ℥℔.
Opii crudi, grana duo (gr. ij).
M. f. c. extr. taraxac. pilul. gr. ij. S.
 Dreystündlich eine Pille zu nehmen.
 (Weikard.)

Rec. Radicis squillae recentis,
Ammoniacy, singul. ℥ij.
Contunde exactissime, adde
Cardamomi minoris, ℥ij.
M. f. c. balsami peruviani q. s. pilul.
gr. ij. S. Dreymal täglich sieben Pillen
 zu nehmen. (Vogel.)

Rec. Saponis medicati,
Ammoniacy,

Pulveris radice squillae, sing. ʒij.

Olei anisi aetherei, gtt. viij.

M. f. pilul. gr. ij. S. Zweymal täglich zehn Stück. (Baldinger.)

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci,

Radice squillae,

Gutti,

Extracti pimpinellae, singul. ʒij.

Fiant pilul. gr. ij. S. Zwey - bis drey - stündlich eine Pille. (Heim.)

Rec. Ipecacuanhae,

Radice squillae,

Sulphuris stibiati aurantiaci,

singul. ʒß.

Galbani, ʒij.

Extracti pimpinellae, ʒj.

M. f. pilul. gr. j. S. Dreymal täglich fünf Stück. (Heim.)

Rec. Extracti digitalis purpureae, ʒß.

Pulveris radice calami aromatici,
ʒj.

M. f. pilul. numer. quadraginta octo (xlvij). S. Morgens und Abends drey Pillen zu nehmen. (J. A. Schmidt.)

Rec. Pulveris radice squillae,

Kali nitrici depurati,

Ammoniacy, singul. ʒj.

Saponis medicati, ʒij.

M. f. c. syrup. simpl. pilul. gr. iij. S. Zweystündlich eine Pille.

(Parmentier.)

Rec. Pulveris herbae digitalis purpureae,
— *radicis squillae, sing. ℥℥.*

Extracti gentianae, ʒj.

Olei juniperi, gtt. vii.

*M. f. c. syrup. simpl. q. s. pilul. nu-
mer. duodecim* (xij). *S.* Dreymal
täglich eine Pille. (Pearson.)

Rec. Natri carbonici sicci, 3j.

Saponis medicati, Div.

Olei juniperi, gtt. xv.

M. f. c. syr. simpl. q. s. pilul. numer.
xxx. S. Drey mal täglich drey Stück.
(Beddoes, bey Harnsteinen.)

Rec. Aloës,

Gutti,

Ammoniacy, singul. 3ij.

Solve in aceti vini sufficiente quantitate, evapora in balneo Mariae ad consistentiam aptam. Fiant pilul. ponderis gr.ij. S. Fünf bis zehn Pillen zweymal täglich. (Bontius.)

Narkotische Mittel.

Rec. Opii crudi, grana quinque
(gr.v).

Herbae digitalis purpureae,

Radiciſ ipecacuanhae, ſing. gr. x.

Extracti helenii, 3j.

M. f. pilul. gr. ij. S. Dreystündlich eine Pille. (Heim.)

Rec. Morphii acetici, grana duo
(gr. ij.).

Succi glycyrrhizae, ℥j.

M. f. pilul. numero sedecim (xvj).

S. Eine bis zwey Pillen Morgens und Abends. (Richard.)

Rec. Herbae conii maculati pulveratae,
℥ij.

Extracti conii maculati, q. s.

ut fiant. pilul. gr. ij. *S.* Dreymal täglich eine bis zwanzig Pillen zu nehmen.

(Berends.)

Rec. Extracti daturae stramonii,
grana decem (gr. x).

Succi glycyrrhizae inspissati, ℥ij.

M. f. pilul. numero sexaginta (LX).

S. Eine bis zehn Pillen zweymal täglich. (Berends.)

Rec. Seminum daturae stramonii,
grana decem (gr. x).

Conservae rosarum, ℥i℔.

Contundantur exactissime in mortario;
adde

Pulveris radice althaeae, q. s.

ut fiant pilul. numero sexaginta (LX).

S. Wie die Vorigen. (Ich habe diese Pillen ungemein wirksam gefunden.)

Rec. Seminum hyoscyami albi,

Radice cynoglossi,

Extracti opii vinosi, singul. ℥ij.

Myrrhae, ℥iij.

Olibani, ℥i℔.

Croci,

Castorei, singul. ʒiʒ.

Fiant c. syr. simpl. pilul. gr.ij. S. Vier bis acht Stück zweymal täglich. (Die bekannten pilul. de cynoglosso.)

Metallische, umstimmende Mittel.

Rec. Zinci oxydati albi, gr.xv.

Asae foetidae, ʒʒ.

Extracti millefolii, ʒiʒ.

M. f. pilul. gr.ij. S. Zweymal täglich fünf Pillen. (Jahn.)

Rec. Zinci oxydati albi, ʒj.

Pulveris aromatici, ʒij.

Syrupi balsamici, q. s.

ut fiant pilul. numero xxx. S. Zweymal täglich zwey Pillen zu nehmen.

(W i t h e r.)

Rec. Zinci sulphurici crystallini, ʒj.

Extracti calami aromatici, ʒij.

M. f. pilul. gr.ij. S. Zweymal täglich fünf Pillen. (Burdach.)

Rec. Zinci sulphurici crystallini, ʒj.

Asae foetidae, ʒj.

M. f. c. extract. valerian. pilul. numer. xxx. S. Zwey - bis dreymal täglich eine bis drey Pillen. (Berends.)

Rec. Zinci oxydati albi,

Extracti hyoscyami,

— *valerianae,*

— *fumariae, singul. ʒj.*

*M. f. pilul. gr. iij. S. Zweymal täglich
anfänglich eine Pille. (Möglin.)*

*Rec. Cupri sulphurico-ammoniaci, ℥ß.
Solve in pauxillo liquoris ammonii cau-
stici,*

adde

Pulveris radice althaeae, ℥iijß.

*M. f. pilul. numer. trigint. (xxx), den-
tur in vitro orificio amplo, subere
clauso. S. Anfänglich Morgens und
Abends eine Pille. (Berends.)*

*Rec. Cupri sulphurici crystallini,
Corticis Winterani, singul. ℥ß.*

*M. f. c. mucilagin. gummi mimos. q. s.
pilul. numer. trigint. (xxx). S. Abends
eine Pille. (Whright.)*

*Rec. Argenti nitrici crystallini,
scrupul. dimid. (℥ß).*

Extracti gentianae,

*Succi glycyrrhizae inspissati,
singul. ℥iijß.*

*Opii crudi, grana quatuor
(gr. iv).*

*M. f. pilul. ponder. gr. j. S. Morgens
und Abends drey Stück. (Heim.)*

*Rec. Argenti nitrici crystallini,
grana quinque (gr. v).*

*Solve in pauxillo aquae destillatae,
adde*

Pulveris radice columbo, ℥iv

Olei anisi aetherei, gtt. x.

M. f. pilul. numero quadragint. (XL).
S. Anfänglich Morgens und Abends eine Pille. (Diese Formel, welcher ich mich in einigen Fällen bedient habe, ist genauer als die oben angegebene. Die Pille enthält genau den achten Theil eines Grans.)

Rec. Plumbi acetici crystallini,
grana quinque (gr.v).
Opii crudi, grana decem (gr.x).
Extracti millefolii,
Pulveris radices glycyrrhizae,
singul. ʒj.

M. f. pilul. numer. sexagint. (LX). *S.*
 Vierstündlich drey Pillen zu nehmen.
 (J a h n.)

Rec. Plumbi acetici crystallini,
grana sex (gr.vj).
Extracti polygalae amarae,
Pulveris radices althaeae, sing. ʒj.

M. fiant pilul. numer. sexaginta (LX).
S. Dreymal täglich zwey bis fünf Pillen zu nehmen.
 (K o p p.)

Anmerk. In dieser Zusammensetzung fehlt das Opium, ohne welches man doch den Bleyzucker nicht anwenden sollte.

Erregende Mittel.

Rec. Moschi, gr.vj — xij.
Castorei, gr. xij — xxiv.
Asae foetidae, ʒß.

M. f. c. tinct. valerian. q. s. pilul. numer. xxiv. S. Gegen Abend, Nachts und Morgens vier Pillen. (Berends, gegen nervöse Unruhe und Schlaflosigkeit.)

*Rec. Radicis ipecacuanhae,
Opüi crudi, singul. grana quindecim (gr. xv).*

*Balsami copaivae, q. s.
ut fiant. pilul. numer. xxx. S.* Vierstündlich eine Pille. (Weikard.)

Rec. Asae foetidae, ʒij.

Radicis zingiberis, ʒj.

Extracti sabinae, ʒß.

M. f. pil. gr. ij. S. Dreystündlich sechs Pillen zu nehmen. (Hartmann.)

Rec. Galbani,

Myrrhae, singul. ʒiß.

Castorei, gr. xv.

Asae foetidae, ʒß.

Balsami indici nigr. q. s.

ut f. pilul. gr. ij. S. Abends acht Stück zu nehmen. (Sydenham.)

Rec. Theriacae,

Extracti chamomillae,

— millefolii, singul. ʒj.

Sagapeni,

Asae foetidae,

Opopanax,

Camphorae, singul. gr. xv.

M. f. pilul. gr. ij. S. Drey bis zehn Stück dreymal täglich. (Fr. Hoffmann.)

Rec. Pulveris millepedum, 3vj.

Ammoniacy, 3ij.

Acidi benzoici, 3ij.

Croci,

Balsami indici nigri, singul. 3ß.

Olei anisi sulphurati, q. s.

ut f. pilul. gr. ij. S. Eine bis drey Pillen dreystündlich. (Morton, zur Beförderung der Expektion.)

Rec. Petrolei rectificati, 3j.

Castorei sibirici, q. s.

ut f. pilul. gr. ij. Dentur in vitro obturato. S. Vierstündlich drey Pillen zu nehmen. (Kämpf.)

Rec. Terebinthinae laricinae, 3j.

Corticis cascarillae, 3ij.

Radici rhei optimi, q. s.

ut f. pilul. gr. ij. S. Dreymal täglich fünf bis zehn Stück, (Mellin, gegen Schleimflüsse, Steinbeschwerden.)

Rec. Ipecacuanhae radici,

Opii crudi, singul. grana duo (gr. ij).

Asae foetidae, 3ß.

Olei menthae piperitae, gtt. ij.

M. f. pilul. gr. ij. S. Dreymal täglich zehn Stück zu nehmen. (Conradi, gegen Strangurie.)

Rec. Ammonii carbonici pyro-oleosi, 3ß.

Asae foetidae, 3iß.

Saponis medicati, ʒj.

Olei valerianae aetherei, gtt.vj.

M. f. c. extr. gentianae q. s. pilul. gr. ij.

Dentur in vitro. S. Dreyimal täglich fünf bis acht Stück. (Diese Pillen habe ich oft mit grossem Nutzen gegen hypochondrische und hysterische Zufälle angewendet.)

Rec. Aloës, ʒj.

Ferri pulverati, ʒij.

Sulphuris stibiati aurantiaci, ʒß.

Hydrargyri muriatici mitis, ʒj.

Olei sabinæ aetherei, gtt.xx.

M. f. c. syr. althæae q. s. pilul. gr. iij.

Dentur in vitro obturato. S. Vor dem Schlafengehen zwey Stück zu nehmen. (Weikard, gegen Menischesis.)

Rec. Pulveris foliorum sabinæ, ʒij.

Extracti sabinæ, q. s.

ut f. pilul. numer. sexaginta (LX).

S. Zwey- bis dreyimal täglich vier bis fünf Stück.

Reizende und scharfe Mittel.

Rec. Colocynthis præparatae, ʒj.

Pulveris radicis althæae, ʒi.

Olei menthæ piperitæ, gtt.vj.

M. f. c. aqu. destill. q. s. pilul. numero

quadraginta (XL). S. Dreyimal täglich eine bis drey Pillen. (Gegen Lähmungen.)

Rec. Extracti gratiolae, 3ß.

Pulveris radices calami aromatici,

q. s.

ut f. pilul. numer. sexagint. S. Drey-
mal täglich eine bis fünf Pillen zu neh-
men.

Rec. Gutti, grana sex (gr. vj).

Macidis,

Asae foetidae, singul. 3j.

Olei anisi aetherei, gtt. xxx.

M. f. pilul. numer. sexagint. (lx). S.

Dreymal täglich zwey bis vier Pillen.

(Berends.)

Rec. Capsici annui, gr. vj — 3ß.

Succi glycyrrhizae, 3ij.

Olei anisi aetherei, gtt. xxx.

M. f. c. syrup. simpl. q. s. pilul. gr. ij.

S. Dreymal täglich drey bis fünf Stück
zu nehmen.

Rec. Extracti opii aquosi, grana duo
(gr. ij).

Capsici annui, gr. xxiv.

Olei foeniculi aetherei, gtt. xvj.

Succi glycyrrhizae, 3ß.

M. f. pilul. numer. quadragint. (xl).

S. Dreymal täglich fünf Stück zu neh-
men. (Nach Lind, gegen Tympanie.)

Rec. Extracti belladonnae,

— hyoscyami,

Opium crudi, singul. gr. x.

Radice pyrethri, 3ß.

Olei caryophyllorum, gtt. xx.

M. f. pilul. gr. j. S. Eine Pille in den hohlen Zahn zu drücken. (Rust.)

Tonische und stärkende Mittel.

Rec. Myrrhae, ʒ iij.

Extracti opii, drachmam dimidiam (ʒ ʒ).

Balsami peruviani, q. s.

ut fiant pilul. gr. ij. S. Dreystündlich zwey bis drey Pillen. (Marcus.)

Rec. Acidi phosphorici sicci,

Asae foetidae,

Pulveris radice althaeae, singul. ʒ j.

M. f. pilul. gr. ij. S. Dreymal täglich sechs bis zehn Stück zu nehmen. (Rust, gegen Beinfraß.)

Rec. Pulveris corticis cascarillae,

— radice rhei, singul. ʒ j.

Extracti ferri pomati, ʒ iʒ.

M. f. pilul. gr. ij. S. Dreymal täglich fünf bis zehn Stück. (Burdach.)

Rec. Chininii sulphurici, gr. v — xx.

Succi glycyrrhizae, ʒ j.

M. f. pilul. num. xxx. S. Nach Umständen fünf Pillen.

Rec. Ammonii muriatici martiati,

Galbani, singul. ʒ j.

Asae foetidae, ʒ ij.

Castorei sibirici, ʒ j.

M. f. c. tinct. valerian. pilul. gr. iij. S.
 Morgens und Abends zwey bis drey Pillen.
 (Berends.)

Anmerk. Mit diesen Pillen leitete Berends den anhaltenden Gebrauch des Eisens gegen atonische Nervenkrankheiten ein.

Rec. Ferri muriatici,
Aloës,
Extracti marrubii, singul. ʒß.
Asae foetidae, ʒiß.

M. f. pilul. gr. ij. S. Dreymal täglich vier bis fünf Stück. (Whytt.)

Rec. Ferri pulverati, ʒij.
Extracti millefolii, ʒß.
Fiant cum pulver. cinnamom. pilul. gr. iij.
S. Dreymal täglich vier Pillen.
 (Quarin.)

Rec. Ferri pulverati,
Sulphuris depurati,
Myrrhae, sing. ʒij.
Fellis tauri, q. s.
ut f. pilul. gr. ij. S. Zweymal täglich 6 Stück zu nehmen. (Burdach.)

Rec. Ferri pulverati, ʒj.
Saponis medicati,
Extracti chamomillae, sing. ʒß.
M. f. pilul. gr. ij. S. Dreymal täglich funfzehn Stück. (Theden.)

Rec. Extracti myrrhae aquosi, ʒiß.
Ferri sulphurici crystallini, ʒj.

M. f. c. syrup. c. aurant. q. s. pilul.
gr. ij. S. Dreystündlich vier Pillen zu
 nehmen. (A c k e r m a n n.)

Rec. Acidi phosphorici sicci, ʒj.

Ferri pulverati,

Corticis cascarillae, singul. ʒiß.

Extracti corticis peruviani, q. s.

ut f. pilul. gr. ij. S. Dreymal täglich
 fünf bis acht Stück. (L e n t i n.)

Rec. Ferri pulverati,

Ammoniacy,

Extracti centaurii minoris, sing.
ʒj.

M. f. pilul. ponder. gr. iv. S. Dreymal
 täglich ein Stück zu nehmen.

(S t o l l.)

Rec. Lupulinae (vide lupulus im I. Thl.),
ʒiiß.

Gummi arabici, ʒj.

Extracti taraxaci, q. s.

ut f. pilul. ponder. gr. iv. S. Täglich
 zwey bis drey Stück. (C h e v a l l i e r,
 gegen Skrofeln.)

Rec. Myrrhae, ʒij.

Extracti centaurei minoris, ʒj.

Balsami peruviani, ʒj.

M. f. pilul. gr. iij. S. Dreymal täglich
 vier Stück. (T r o n c h i n.)

Rec. Aloës, ʒij.

Foliorum sennae, ʒj.

Asae foetidae,

Galbani, singul. ʒß.

Myrrhae, ℥ij.

Ferri sulphurici, ℥iij.

Croci,

Macidis, singul. gr. xv.

Olei succini rectificati, gtt. ij.

M. f. cum syr. simpl. pilul. gr. iv. S.
Früh und Abends zwey Stück. (Fuller's *pilulae benedictae*.)

Adstringirende Mittel.

Rec. Ammonii muriatici martiati,

Aluminis,

Pulveris aromatici,

Extracti corticis peruviani frigide parati, singulor. ℥ß.

Olei cinnamomi aetherei, gtt. xij.

M. f. pilul. gr. ij. Dent. in vitro, subere clauso. S. Morgens und Abends fünf bis zehn Stück. (Formey, gegen asthenische Metrorrhagie.)

Rec. Radicis valerianae minoris, ℥ß.

Ferri pulverati, ℥iß.

Myrrhae,

Olibani,

Extracti tormentillae, singul. ℥iß.

M. f. pilul. pond. gr. iij. S. Viermal täglich zehn Stück.

Rec. Olibani,

Corticum aurantiorum, sing. ℥j.

Corticis quercus, ℥ß.

M. f. c. extr. gentian. q. s. pilul. gr. ij.
S. Dreymal täglich zehn bis funfzehn
 Pillen. (Burdach.)

Rec. Kino,
Myrrhae,
Extracti marrubii, singul. ʒ ij.
Ferri sulphurici, ʒ j.

M. f. pilul. gr. ij. *S.* Dreymal täglich
 acht Stück. (Weitz.)

Rec. Corticis cascarillae,
Extracti ligni campechiensis sicci,
singul. ʒ iß.
Ferri oxydati fusci, ʒ j.

M. f. c. extr. gentian. q. s. pilul. gr. ij.
S. Dreymal täglich fünf bis zehn Stück.
 (Diese Pillen habe ich oft mit Nutzen ge-
 gen atonische Leukorrhöen angewendet.)

Rec. Aluminis, ʒ ß.
Extracti ratanhiaë, ʒ ij.
Pulveris radici calami aromatici,
ʒ j.

M. f. pilul. gr. ij. *S.* Dreystündlich fünf
 bis zehn Stück. (Gegen atonische Blut-
 flüsse.)

Rec. Terebinthinae,
Extracti gentianae rubrae, sing.
ʒ iij.
Ferri sulphurici crystallini,
Kino, singul. ʒ iß.

M. f. pilul. gr. ij. S. Viermal täglich zehn Stück zu nehmen. (Walch, gegen Nachtripper.)

Bissen (*Boli*).

Auflösende Mittel.

*Rec. Ammonii muriatici depurati,
Succi glycyrrhizae inspissati,
singul. ℥j.*

*Extracti taraxaci, q. s.
ut fiat bolus. Detur in quadruplo. S.*
Vierstündlich einen Bissen zu nehmen.
(Fischer in Dresden.)

*Rec. Hydrargyri stibiato-sulphurati,
gr. vj.
Resinae guajaci nativae, gr. viij.
Lapidum cancrorum praeparato-
rum, ℥j.*

*Syrupi simplicis, q. s.
Fiant boli duo, dentur in charta cera-
ta. S.* Früh und Abends einen Bissen zu nehmen und eine Tasse warmen Thee nachzutrinken. (J. A. Schmidt.)

Brechenenerregende Mittel.

*Rec. Radicis ipecacuanhae, ℥j.
Syrupi simplicis, q. s.*

Fiat bolus, detur cum nebula. S. Auf einmal zu nehmen, und erst nach beginnender Wirkung reichlich nachzutrinken.
(G a u b i u s.)

*Rec. Radicis ipecacuanhae,
Kali sulphurici, singul. ℥j.
Extracti graminis liquidi, ʒß.
M. f. bolus, conspergatur lycopodio.
S.* Auf einmal zu nehmen.
(B r ü c k n e r.)

*Rec. Zinci sulphurici crystallini, ℥j.
Extracti taraxaci, ʒj.
M. f. bolus, conspergatur pulvere radicis glycyrrhizae. S.* Brechbissen, auf einmal zu nehmen. (Die Gabe ist wol um die Hälfte zu groß.)
(G a u b i u s.)

A b f ü h r e n d e M i t t e l .

*Rec. Pulveris radicis jalappae, ʒß.
Kali sulphurici, gr. xv.
Mellis crudi, q. s.
Fiat bolus. Detur cum nebula. S.* Auf einmal.
*Rec. Hydrargyri muriatici mitis, gr. ij.
Radicis jalappae, ℥j.
Olei anisi aetherei, gtt. ij.
Mellaginis taraxaci, q. s.
Fiat bolus. S.* Auf einmal zu nehmen, und schwarzen Kaffee nachzutrinken.
(B e r e n d s.)

Rec. Resinae jalappae, gr. xij.
Radicis rhei optimi, ℥ij.
Mellis crudi, q. s.

Fiant inde boli numer. iij. S. Zwey-
 stündlich einen Bissen. (G a u b i u s.)

Rec. Hydrargyri muriatici mitis, gr. xij.
Magnesiae sulphuricae, gr. xvj.
Syrupi rhamni cathartici, q. s.

Fiant boli numer. iv. S. Den Tag über
 zu nehmen, oder dreystündlich einen
 Bissen bis zur Wirkung.

(C h a u s s i e r.)

Rec. Pulveris radicis rhei,
 — — *jalappae, sing. ʒß.*
Tartari depurati, ʒj.
Mellis crudi, q. s.

Fiant boli num. viij. S. Zweystündlich
 einen Bissen bis zur Wirkung.

(A l i b e r t.)

Rec. Pulveris radicis jalappae, ℥j.
Gutti, gr. iij (grana tria).
Mellis depurati, q. s.

Fiat bolus, detur in triplo. S. Pur-
 girbolus. (H a r t m a n n.)

Anthelmintische Mittel.

Rec. Pulveris seminis santonici,
 — *radicis valerianae mino-*
ris,
Pulveris radicis jalappae, sing. ʒß.
Oxymellis squillitici, q. s.

Fiat bolus, consperg. cinnamom. S.
Auf einmal. (Herrmann.)

Rec. Hydrargyri muriatici mitis, gr. vj.
Pulveris seminis santonici, 3 iß.
Succi dauci inspissati, q. s.

Fiant boli tres. S. Morgens einen Bissen zu nehmen.

Diuretische Mittel.

Rec. Herbae digitalis purpureae pulve-
ratae, gr. iij.

Opium crudi, gr. iß.

pulveris corticis cascarillae, 3ß.

Syrupi simplicis, q. s.

Fiant l. a. boli tres. S. Früh u. Abends ein Stück zu nehmen.

(J. A. Schmidt.)

Rec. Radicis squillae siccatae, gr. iij.

Pulveris radicis glycyrrhizae, 3ß.

Mellis crudi, q. s.

ut fiant boli tres. S. Drey mal täglich einen Bissen. (J. A. Schmidt.)

Rec. Extracti squillae, gr. ij.

Pulveris radicis columbo, 3ß.

Succi juniperi inspissati, q. s.

Fiant boli duo. S. Morgens u. Abends einen Bissen. (J. A. Schmidt.)

Rec. Radicis squillae pulveratae, gr. iß.

Pulveris aromatici,

Kali acetici, singul. gr. viij.

Syrupi zingiberis, q. s.

Fiat bolus. Detur in triplo. S. Drey-
mal täglich einen Bissen. (P o r t a l.)

Rec. Kali tartarici, gr. x — xx.
Hydrargyri muriatici mitis, gr. ij.
Pulveris radices zingiberis, gr. v.
Syrupi simplicis, q. s.

Fiat l. a. bolus. S. Beym Schlafengehen
zu nehmen. (P o r t a l, gegen Brustwas-
sersucht.)

Rec. Radicis squillae pulveratae, gr. vj.
Pulveris ari compositi, gr. x.
— *radicis zingiberis, gr. v.*
Syrupi corticum aurantiorum, q. s.

Fiat bolus. S. Am Morgen zu nehmen.

Erregende und reizende Mittel.

Rec. Pulveris radices serpentariae, ʒß.
Asae foetidae, gr. xij.
Camphorae, gr. vj.
Syrupi croci, q. s.

Fiant boli duo. S. Auf einmal zu neh-
men. (B u c h a n, gegen Nervenaffek-
tionen.)

Rec. Castorei sibirici, ʒj.
Ammonii carbonici, gr. v.
Syrupi simplicis, q. s.

Fiat bolus. S. Auf einmal zu nehmen.
(A. d. Pharmakop. d. Edinburg. Kranken-
hauses.)

Rec. Extracti aconiti,
Sulphuris stibiati aurantiaci,
singul. gr. ij.

Lapidum cancrorum, ℥j.

Mellis crudi, q. s.

Fiant boli duo. S. Früh und Abends einen Bolus zu nehmen.

(J. A. Schmidt.)

Rec. Moschi genuini, gr. xij.

Ammonii carbonici pyro-oleosi,
gr. ix.

Extracti corticis peruviani, ℥ij.

M. f. boli quatuor. S. Dreystündlich einen Bissen zu nehmen.

(Berends.)

Stärkende und adstringirende
Mittel.

Rec. Croci pulverati, gr. vj.

Cinnamomi, gr. iiij.

Magnesiae ustae, gr. viij.

Syrupi corticum aurantiorum, q. s.
ut f. bolus. S. Auf einmal.

(Richard.)

Rec. Corticis peruviani regii, ℥j.

Kali carbonici depurati, ℥j.

Tartari stibiati, gr. xvj (*grana
sedecim*).

Syrupi simplicis, q. s.

Fiant boli numero sexagint. (Lx). S.

In vier und zwanzig Stunden gegen hartnäckige Wechselfieber. (Durch die China wird dem Spießsglanzweinstein die Erbrechen erregende Wirkung fast gänzlich geraubt.)

Rec. Chininii s. Cinchonii sulphurici,
gr. x.

Pulveris radicis glycyrrhizae, gr. xij.

Gummi tragacanthae, gr. vj.

Syrupi diacodion, q. s.

Fiant boli numer. iij. S. Während der Apyrexie eines Wechselfiebers in gleichen Zwischenräumen zu nehmen. Nach Umständen muß auch die Gabe vermindert werden. (Richard.)

Rec. Corticis peruviani regii pulverati,
3vj.

Corticis cinnamomi, 3j.

Syrupi corticum aurantiorum, q. s.

Fiant boli numero sex. Conspergantur pulvere cinnamomi. S. Zweystündlich einen Bissen zu nehmen.

(Herrmann.)

Rec. Pulveris corticis granatorum, 3j.
— — peruviani rubri,
3ij.

Balsami copaivae, q. s.

Fiant boli ponder. gr. xij. S. Morgens und Abends einen Bissen zu nehmen. (Richard, gegen chronische Schleimflüsse.)

Rec. Extracti opii, gr. ij.

Catechu, gr. XLviij.

Conservae rosarum, q. s.

ut fiat bolus. S. Morgens und Abends
einen Bissen. (Parmentier, gegen
chronische Diarrhöe.)

Latwergen (*electuaria*).

Auflösende Mittel.

Rec. Kali acetici, ʒij.

Extracti taraxaci liquidi, ʒij.

Elaeosacchari foeniculi, ʒiij.

M. f. electuar. S. Drey- bis viermal
täglich einen Theelöffel voll.

Rec. Tartari boraxati, ʒij.

Pulpae tamarindorum, ʒij.

Elaeosacchari flavedinis citri, ʒß.

M. f. electuar. S. Viermal täglich einen
Theelöffel voll.

Rec. Tartari depurati, ʒß.

Pulpae tamarindorum, ʒij.

Elaeosacchari flavedinis citri, ʒvj.

M. f. electuar. S. Zweystündlich einen
Theelöffel voll.

Rec. Sulphuris praecipitati, ʒiß.

Corticum aurantium conditorum,
ʒß.

Pulpae tamarindorum, ʒij.

Sacchari albi, ʒj.

M. f.

M. f. electuar. S. Dreymal täglich einen Theelöffel voll. (Berends.)

Abführende Mittel.

Rec. Tartari natronati, ʒj.

Kali nitrici, ʒj — ʒij.

Pulpae tamarindorum, ʒiß.

Oxymellis simplicis, q. s.

Fiat l. a. electuarium. S. Zwey- oder dreystündlich einen Theelöffel.

Rec. Electuarii e senna,

Pulpae cassiae,

— *tamarindorum, singul. ʒj.*

Tartari depurati, ʒij.

Radici jalappae, ʒij — ʒj.

Syrupi corticum aurantiorum,

— *cinnamomi, singul. ʒij.*

M. f. electuar. S. Zwey- bis dreymal täglich einen Theelöffel voll.

(Selle.)

Rec. Radici jalappae, ʒj.

Tartari depurati, ʒij.

Succi sambuci inspissati, ʒij.

M. f. electuar. S. Zweystündlich einen Theelöffel bis zur Wirkung.

(Weikard.)

Rec. Natri carbonici depurati,

Carbonis vegetabilis, singul. ʒj.

Electuarii e senna, ʒij.

M. f. electuar. S. Drey- bis viermal täglich einen Theelöffel voll. (Mitchill, gegen hartnäckige Verstopfung)

Anthelmintische Mittel.

Rec. Stanni limati, ʒj.

Pulveris radice jalappae, ʒij.

Mellis depurati, ʒiij.

Misce. S. Gut umgerührt, viertelstündlich drey Theelöffel zu nehmen.

(Bloch.)

Rec. Radicis valerianae minoris, ʒiʒ.

— *jalappae, ʒj.*

Seminis santonici, ʒʒ.

Kali tartarici, ʒij.

Oxymellis scillitici, ʒvj.

Syrupi simplicis, q. s.

Fiat electuarium. S. Theelöffelweise.

Rec. Tartari natronati,

Radicis jalappae,

— *valerianae minoris, sing.*
ʒʒ.

Oxymellis scillitici, ʒiv.

M. f. electuarium. S. Dreystündlich einen Theelöffel voll. *Stoerk.*

Rec. Ferri sulphurici,

Extracti corticis peruviani, sing.
ʒij.

Seminis santonici, ʒvj.

Syrupi cinnamomi, q. s.

Fiat electuar. S. Zwey- bis dreymal täglich einen Theelöffel voll.

(Selle.)

Rec. Olei terebinthinae rectificati, ʒiij.

Mellis crudi, ʒiij.

M. f. electuar. S. Dreystündlich einen bis zwey Theelöffel voll. (Thompson, gegen den Bandwurm.)

Erregende und reizende Mittel.

*Rec. Saponis medicati,
Terebinthinae laricinae,
Radiciis rhei optimi, singul. ʒj.
Syrupi simplicis, q. s.*

M. f. l. a. electuar. S. Dreymal täglich einen Theelöffel voll. (Berends, gegen Wassersucht.)

*Rec. Terebinthinae laricinae, ʒiʒ.
Saponis medicati, ʒij.
Pulveris corticis peruviani regii,
Radiciis serpentariae virginianae,
singul. ʒiij.*

*M. f. c. syrup. simpl. q. s. electuarium.
S.* Dreymal täglich einen Theelöffel voll. (Berends, gegen atonische Wassersuchten.)

*Rec. Herbae conii maculati pulveratae,
ʒij.*

Mellis depurati, ʒij.

M. S. Zweymal täglich einen Theelöffel voll. (Baldinger.)

*Rec. Pulveris radiciis helenii,
— ligni guajaci,
— radiciis imperatoriae,
— foliorum sennae,
— corticis ligni sassafras,*

Pulveris baccarum juniperi, sing.
3ß.

— *seminis anisi, 3ij.*

Mellis depurati, q. s.

Fiat electuarium. S. Drey- bis viermal
 einen großen Theelöffel voll. (Hi m-
 ly's *electuar mundificans*, gegen chro-
 nische Hautkrankh.)

Rec. Resinae guajaci nativae, 3j.

Radicis rhei optimi, 3ij.

Tartari depurati, 3j.

Sulphuris depurati, 3ij.

Nucis moschatae, 3iß.

Mellis crudi, libr. j.

M. f. electuar. S. Drey- bis viermal
 täglich einen Theelöffel voll. (Ein in
 England gebräuchliches Mittel gegen
 chronischen Rheumatismus, *Chelseapen-
 sioner* genannt.)

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi,
grana tria (gr. iij).

Solve in pauxillo aquae destillatae,
adde

Extracti gratiolae, 3iij.

Succi sambuci inspissati, 3iij.

M. f. electuar. S. Zweymal täglich ei-
 nen Theelöffel voll zu nehmen. (Von
 Stoll und Swediaur gegen eingewur-
 zelte Syphilis empfohlen.)

Rec. Tartari depurati, 3ij.

Pulveris radices zingiberis,

Conservae rosarum, singul. ʒij.
Syrupi corticum aurantiorum, q. s.
Fiat l. a. electuarium. S. Drey- mal täg-
 lich einen Theelöffel. (M o n r o, gegen
 Wassersucht.)

Rec. Piperis nigri, ʒij.
Seminis foeniculi,
Radicis helenii, singul. ʒß.
M. f. c. mellis crudi, q. s., electuar.
S. Zwey- bis dreymal täglich einen
 Theelöffel voll. (Von Ward gegen
 Mastdarmfisteln empfohlen. Verbessert
 die Eiterung.)

Rec. Calcariae muriaticae siccae, ʒj.
Pulveris radidis calami aromatici,
ʒiij.
 — — *senegae, ʒiß.*

Oxymellis squillitici, q. s.
M. f. electuar. S. Drey- mal täglich ei-
 nen Theelöffel voll. (Diese Latwerge
 habe ich oft mit Nutzen gegen torpide
 Wassersuchten und chronische Verschlei-
 mungen angewendet.)

Stärkende und adstringirende
 Mittel.

Rec. Extracti corticis peruviani frigide
parati, ʒij.
Pulpaе tamarindorum, ʒij.
Elaeosacchari flavedinis citri, ʒvj.
Aetheris acetici, ʒj.

M. f. electuar. S. Zweystündlich einen Theelöffel voll zu nehmen. (Nach den Anfällen der Meläna fand ich diese Zusammensetzung sehr nützlich.)

Rec. Radicis valerianae minoris, ʒj.

Corticis peruviani regii, ʒij.

Ammonii carbonici sicci, ʒj.

Syrupi corticum aurantiorum, q. s.

M. f. electuar. S. Zweystündlich einen Theelöffel. (Monro, in asthenischen Nervenkrankheiten.)

Rec. Corticis peruviani regii, ʒj.

Radicis calami aromatici, ʒij.

M. f. c. syrup. c. aurant. q. s. electuar.

S. Dreymal täglich einen Theelöffel voll.

Rec. Extracti corticis peruviani, ʒiij.

— *cascarillae, ʒj.*

— *ligni campechiensis,*

Succi glycyrrhizae inspissati, singul. ʒij.

Mucilaginis cydoniorum, q. s.

M. f. electuar. S. Dreymal täglich einen Theelöffel voll. (Kämpf, bes. gegen asthenische Profluvien.)

Rec. Corticis peruviani regii,

— *simarubae, singul. ʒß.*

Syrupi rubi idaei q. s.

M. f. electuar. S. Dreystündlich einen Theelöffel voll. (Kämpf.)

Rec. Corticis peruviani regii, ʒiiß.

Ammonii muriatici, ʒij.

Mellis puri,

Syrupi corticum aurantiorum,
singul. ℥ij.

M. f. electuarium. S. Kurz vor dem Wechselfieberanfall theelöffelweise zu einer bis zwey Unzen zu verbrauchen.
 (Richard.)

Rec. Pulveris corticis peruviani fusci, ℥j.
— radicis calami aromatici, ℥ij.
— corticis cinnamomi, ℥ß.

Syrupi corticum aurantiorum, q.s.
M. f. electuar. S. Die ganze Quantität in der fieberfreyen Zeit zu verbrauchen.
 (Herrmann.)

Rec. Ammonii muriatici depurati, ℥ij.
Florum chamomillae,
Radicum calami aromatici,
Corticum salicis pentandrae, singul. ℥iij.

M. f. c. mellis depurati, q. s. electuar.
 S. In der fieberfreyen Zeit zweystündlich einen oder zwey Theelöffel voll. (Diese Latwerge habe ich bey Unbemitelten oft mit Nutzen gegen Wechselfieber gegeben.)

Rec. Radicis valerianae minoris,
Corticis peruviani regii, sing. ℥iij.
Ferri pulverati, ℥iß.

Syrupi corticum aurantiorum, q. s.
M. f. electuar. S. Drey mal täglich einen Theelöffel voll. (Gegen chronische, asthenische Nervenkrankheiten.)

Rec. Radicis sarsaparillae pulveratae,
℥i℔.

Corticis ligni quassiae,
 — — *sassafras, sing. ℥iij.*

M. f. c. syrup. balsamic. q. s. electuar.
S. Drey- bis viermal täglich einen Theelöffel voll. (Diese Latwerge habe ich gegen asthenische Reproduktionskrankheiten und Kachexien sehr wirksam gefunden.)

Rec. Pulveris radicis columbo, ℥℔.

— *corticis cascarillae, ℥ij.*

Macidis, ℥j.

M. f. c. syrup. cort. aurant. q. s. electuarium. *S.* Dreymal täglich einen Theelöffel voll. (Hat mir gegen atonische, langwierige Diarrhöen gute Dienste geleistet.)

Rec. Extracti ratanhia, ℥℔.

Catechu, ℥j.

Syrupi diacodion, ℥ij.

Conservae rosarum, ℥iv.

M. f. electuar. *S.* Dreymal täglich einen Theelöffel voll, (Richard, gegen chronische Durchfälle.)

Rec. Corticis peruviani regii, ℥j.

Balsami tolutani,

Catechu, singul. ℥j.

Syrupi corticum aurantiorum, q. s.

M. f. electuar. *S.* Zwey- bis dreymal täglich einen Theelöffel voll.

*Rec. Pulveris herbae tussilaginis farfa-
rae, ℥i℥.*

*Extracti polygalae amarae,
— arnicae, singul. ℥ij.*

Mellis depurati, q. s.

M. f. electuar. S. Dreyimal täglich ei-
nen Theelöffel voll. (Ich habe sie mit
Erfolg gegen chronische Blennorrhöen,
besonders der Lungen, angewendet.)

Gallerten (*gelatinae*).

Rec. Radicis salep pulveratae, ℥i℥.

*Coque ex sufficiente aquae quantitate
ad gelatinae consistentiam; adde
Syrupi ribium, ℥j.*

M. S. Theelöffelweise.

Rec. Lichenis islandici, ℥ij.

*Kali carbonici depurati, in aquae
calidae mensura solutae, ℥ij.*

*Macerentur per tres horas, deinde co-
lentur. Residuum rite ablutum co-
que ex sufficiente aquae quantitate
ad remanent. ℥xvj.*

*Colatura seponetur, donec crassiora
subsederint.*

Adde

Ichthyocollae, ℥j.

Sacchari albi, ℥i℔.

*Evapora ad remanentiam ℥vj;
cui refrigerati adde*

Elaeosacchari flavedinis citri, ℥ij.

S. Zweystündlich einen Theelöffel voll.

Rec. Radicis senegae, ℥ij.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad col. ℥viij.

Adde

Ichthyocollae, ℥i℔.

Syrupi florum aurantii, ℥j.

F. l. art. gelatina. S. Theelöffelweise.

(Choulant, zur Beförderung des Auswurfs.)

Rec. Foliorum aurantii, ℥i℔.

*Infunde aquae fervidae ℥xxiv; digere
per diem, coia.*

Colaturae adde

Radicis salep pulverati, ℥ij.

Coque ad consistentiam gelatinae spissioris, admisce

Vini rhenani optimi,

Syrupi florum aurantii, sing. ℥j.

M. S. Theelöffelweise, (Diese Gallerte habe ich bey grofser Nervenschwäche mit Abzehrung gegeben.)

Rec. Ichthyocollae, ℥i℔.

*Coque ex sufficient. aquae quantitate
ad consistentiam gelatinae; adde*

*Extracti corticis peruviani frigide
parati, ℥ij.*

Syrupi corticum aurantium, ℥j.

M. S. Drey- bis viermal täglich einen Theelöffel voll.

Rec. Helminthochorti, ℥j.

Ichthyocollae, ℥℔.

Coque ex aqu. fontan. q. s. ad remanent. ℥iv.

Adde

Sacchari albi, ℥j.

S. Theelöffelweise zu nehmen. (Wurm-gallerte.)

Pflaster (*emplastra*) *).

Rec. Emplastri cerussae,

— *lithargyri compositi,*
singul. ℥xv.

Picis albae, ℥x.

M. S. Heftpflaster für den Sommer.

Rec. Emplastri cerussae, ℥xx.

— *lithargyri simplicis,*

Picis albae, singul. ℥x.

M. S. Heftpflaster für den Winter.
(Martius, sehr brauchbar.)

Rec. Theriacae,

Pulveris radidis belladonnae,

*) Schon im ersten Theil (S. 115) sind mehrere Pflasterformeln angeführt worden.

Tincturae opii crocatae, sing. ℥j.
Gummi arabici, ℥ij.

M. S. Auf Leder gestrichen, auf die Magengegend zu legen. (Gölis, gegen Keuchhusten.)

Rec. Succi recentis herbae hyoscyami,
 — — — *papaveris albi,*
 — — — *phellandrii aquati-*
ci, singul. ℥ij.

Inspissentur leni igne ad extracti consistentiam; adde

Cerae liquefactae, ℥iv.

Olei lavendulae, ℥℔.

M. S. Schmerzstillendes Pflaster
 (J. A. Schmidt)

Rec. Picis albae, ℥℔.

Camphorae, ℥j.

Opium puri, ℥℔.

Petrolei, q. s.

M. f. emplastr. S. Auf Leder gestrichen, aufzulegen. (Gegen chronischen Rheumatismus.)

Rec. Euphorbii, ℥ij.

Emplastri meliloti, ℥j.

M. S. Pflaster. (Statt des Kantharidenpflasters in Fällen, wo man Ursache hat, dies zu vermeiden.)

Rec. Emplastri lithargyri, ℥℔.

Balsami indicis nigri, ℥j.

Opium crudi, ℥j.

M. S. Pflaster gegen Frostgeschwüre.
 (Rust.)

*Rec. Emplastri de galbano crocati, ʒß.
Camphorae, ʒj.*

*Ammonii carbonici pyro-oleosi,
Opii crudi, singul. ʒß.*

Olei cajeput, gtt. xl.

M. f. emplastr. S. Auf Leder gestrichen, über die ganze Magengegend zu legen. (Gegen krampfhaftes Erbrechen, Seekrankheit u. d. m.).

Rec. Galbani,

Elemi, singul. ʒß.

Cerae flavae,

Terebinthinae laricinae, sing. ʒij.

Leni calore liquefactis admisceantur:

Castorei sibirici, ʒij.

Olei chamomillae aetherei, gtt. xx.

M. f. emplastr. S. Auf den Magen oder Unterleib zu legen. (Brückner.)

Salben und Cerate, Lini-
mente (*unguenta, cerata,
linimenta*).

Rec. Vitellorum ovi,

Mellis crudi,

Olei lini recentis, singul. q. pl.

M. S. Salbe (eine milde Digestivsalbe).
(Berends.)

Rec. Decocti corticis quercus (ex ℥j. parat.) ℥vj.

Aceti saturnini, ℥i℔.

Misceantur, seponentur per horam.

Praecipitatum inde ortum, filtro collectum, adhuc humidum misce cum

Adipis suillae recentis loti, ℥j.

Adde

Camphorae, gr. x.

M. f. unguent. S. Salbe. (Diese Salbe habe ich oft mit Nutzen gegen das brandig werdende Durchliegen angewendet.)

Rec. Boracis, ℥ij.

Unguenti rosati, ℥j.

M. f. unguent. S. Frostsalbe, des Abends einzureiben.

Rec. Olei lini recentis, ℥iv.

Albuminum ocorum, numer. ij.

M. S. Brandsalbe, die verbrannte Stelle hiermit stündlich oder zweystündlich zu bestreichen.
(Mynsicht.)

Rec, Seminis lycopodii,

Zinci oxydati albi, singul. ℥℔.

Unguenti rosati, ℥j.

M. f. unguent. S. Salbe. (Pitschaft, gegen wunde Brustwarzen, Exkorationen.)

Rec. Butyri recentis sine sale,

Cerae flavae, singul. q. pl.

Terantur c. pauxillo aquae destillatae.

S. Salbe. (Stahl's Brandsalbe.)

Rec. Sevi bovini, ℥℔.

Butyri recentis sine sale, ℥iij.

Amyli pulverati, ℥j.

Opii crudi, ℥℔.

M. f. ungt. S. Schmerzstillende Salbe.

Rec. Medullae ossium bovis, ℥i℔.

Mixturae oleoso-balsamicae, ℥vj.

Balsami indicis nigri, ℥i℔.

M. f. unguent. Signa. Zum Einreiben.

(Wendt, zum Einreiben in Rücken,
Brust, Glieder, bey Rhachitis.)

Rec. Unguenti basilici, ℥j.

Tincturae myrrhae, ℥j.

*M. S. Salbe. (Rust, zur Verbesserung
des Eiters und Beförderung der Granu-
lation.)*

Rec. Sevi bovini, ℥j.

Cerae flavae, ℥℔.

Resinae burgundicae, ℥j.

Terebinthinae, ℥ij.

Olei olivaceum, ℥iij.

*M. f. unguent. S. Frostsalbe, auf Lein-
wand überzulegen.*

Rec. Petrolei, ℥iij.

Camphorae, ℥j.

Unguenti cerei, ℥i℔.

M. S. Frostsalbe.

Rec. Unguenti rosati,

Olei nucis moschatae expressi,

singul. ℥ij.

Mixturae oleoso-balsamicae, ʒß.

Tincturae opii simplicis, gtt. x.

M. f. unguent. Signa. Bey chronischen Durchfällen der Kinder in den Unterleib einzureiben.

Rec. Unguenti hydrargyri cinerei, ʒß.

Saponis domestici, ʒij.

Camphorae, ʒß.

M. f. unguent. S. Salbe. (Schreger, gegen Drüsengeschwülste.)

Rec. Tartari stibiati, ʒij.

Unguenti rosati, ʒß — ʒvj.

Misce exactissime. S. Drey mal täglich die bezeichnete Stelle damit einzureiben. (Da die Salbe sich leicht weiter verbreitet, als man es beabsichtigt, so verdient das oben angegebene Pflaster, zur Hervorbringung des künstlichen Pustelausschlages, den Vorzug.)

(Authenrieth.)

Rec. Aeruginis,

Hydrargyri muriatici mitis, singul. ʒj.

Unguenti rosati, ʒx.

M. f. unguent. S. Morgens und Abends den Rand des Grindes damit einzureiben. (Bicker, gegen Erbgrind.)

Rec. Tincturae cantharidum, ʒij.

Camphorae, ʒj.

Unguenti rorismarini compositi,

ʒj.

M. f. unguent. S. Salbe, in die gelähmten Theile einzureiben.

Rec. Olei nucis moschatae expressi, ʒß.

Balsami indici nigri, ʒß.

Olei caryophyllorum, ʒß.

Moschi orientalis, gr. j.

Misce exacte, detur in vitro clauso.

S. In die Schläfengegend einzureiben.

(Schubarth.)

Rec. Olei laurini unguinosi,

— nucis moschat. expressi, singul. ʒij.

— chamomillae aetherei, ʒß.

M. S. In den Unterleib einzureiben.

(Herrmann.)

Rec. Unguenti althaeae, ʒß.

Fellis tauri recentis,

Saponis medicati, singul. ʒiß.

Petrolei,

Ammonii carbonici pyro-oleosi,
singul. ʒj.

Camphorae, ʒß.

M. f. unguent. S. Dreystündlich einen Theelöffel voll in den Unterleib einzureiben. (Hufeland, gegen Mesenterialskrofeln.)

Rec. Olei hyoscyami infusi, ʒj.

Liquoris ammonii caustici,

— — succinici,

Tincturae opii crocatae, sing. ʒij.

M. f. liniment. S. Zweystündlich einen Theelöffel voll in den Unterleib einzu-

reiben. (Starke's krampfstillendes Liment.)

Rec. Kali hydriodici, ʒß — ʒj.

Unguenti rosati, ʒj.

Misce exacte. S. Täglich zweymal einer Linse oder Bohne groß einzureiben. (Gegen Kröpfe, Drüsengeschwülste. Doch wird das hydriodsaure Kali durch das Fett zersetzt, daher sind spirituöse Auflösungen vorzuziehen.)

Rec. Phosphori, gr. v.

Olei amygdalarum, ʒj.

Solve et adde

Cerae albae, q. s.

ut fiat unguent. S. Phosphorsalbe.

Rec. Phosphori, gr. v.

Olei amygdalarum, ʒj.

Solve et adde

Olei caryophyllorum, ʒj.

Cerae albae, ʒiij.

M. f. unguent. S. Salbe. (Gegen torpide Lähmungen.)

Rec. Cinnabaris factitii, ʒß.

Cineris solearum calcei,

Sanguinis draconis, singul. gr. iv.

Arsenici albi, grana decem

(gr. x).

M. f. pulvis subtilissimus.

Rec. Balsami indici nigri,

Extracti conii maculati, sing. ʒj.

Plumbi acetici, ʒj.

Tincturae opii crocatae, ℥ß.

Unguenti cerei, ℥j.

M. f. unguentum.

Ein und ein halber bis zwey Grane des obigen Pulvers werden mit einer Drachme dieser Salbe gemischt. Diese Mischung wird dünn auf Plümaceau's gestrichen, und damit nicht nur das Krebsgeschwür, sondern auch noch der gesunde Rand um einen Strohhalm breit bedeckt.

(Hellmund.)

Rec. Arsenici albi, grana sex ad decem (gr. vj — x).

Opium crudi, gr. xij — xx.

Zinci oxydati albi, ℥ß.

Butyri recentis, ℥j.

Cerae flavae, ℥iß.

Conterantur exactissime. S. Mit Plümaceau's auf die krebssgeschwürrige Stelle zu bringen.

(Harless.)

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi,

Ammonii muriatici, singul. ℥ß.

Solve in aquae rosarum, ℥iv.

Filtra et adde

Adipis suillae, ℥iv.

Conterantur in mortario vitreo, aquae ferventi imposito, ad perfectam evaporationem aquae. Adde

Olei citri italici, gtt. xxx.

M. S. Salbe. (Cirillo's Sublimatsalbe, von Hufeland verbessert.)

Rec. Hydrargyri ammoniati muriatici,
℥iij — iv.

Unguenti digitalis purpureae, ℥j.

M. exactissime. S. Täglich drey- bis viermal einzureiben, und die Stelle mit Wachstaffent zu bedecken. (K o p p empfiehlt diese Salbe, welche ebenfalls Pusteln erzeugt, statt der Brechweinstein-salbe. Sie schmerzt weniger, bewirkt keine bösartigen, brandigen Geschwüre, erzeugt kaum Narben, wirkt schneller.)

Rec. Pulveris cantharidum, ℥ij.

Adipis suillae, ℥iv.

Hydrargyri muriatici corrosivi,
Tartari stibiati, singul. ℥ß.

M. exactissime. S. Salbe zur Erzeugung künstlicher Geschwüre. (R u s t.)

Rec. Pulveris herbae sabinae,

Adipis suillae, singul. ℥iij.

M. f. unguent. S. Salbe zur Zerstörung der Feigwarzen. (H o r n.)

Rec. Aluminis, ℥j.

Butyri recentis sine sale, ℥ij.

M. S. Auf Charpie oder Leinwand gestrichen, einigemal täglich frisch überzulegen. (Gegen variköse Hämorrhoiden.)

Rec. Adipis suillae, ℥j.

Leni igne liquefactae adde

Acidi nitrici concentrati, ℥j.

Subigendo fiat unguent. S. Salbe.

(Edinburgsche Pharmakopöe.)

Rec. Kali sulphurati, ℥℥.

Saponis domestici, ℥ij.

Olei papaveris, ℥iv.

— *thymi aetherei, ℥℥.*

M. f. unguent. S. Krätzsalbe.

Rec. Herbae digitalis purpureae, ℥ij.

Coque ex aquae q. s. ad colat. ℥j.

Adde

Olei terebinthinae, ℥j.

Vitellorum ovi, numer. ij.

Extracti squillae, ℥j.

M. f. liniment. S. In die Nierengegend einzureiben. (Schubarth, diuretisch.)

Rec. Pulveris carbonum, ℥iij.

Adipis, ℥j.

M. f. unguent. S. Grindsalbe.

(Alibert.)

Rec. Sulphuris depurati, ℥i℥.

Radici veratri pulverati, ℥℥.

Kali nitrici, gr. xv.

Saponis nigri s. viridis, ℥i℥.

Adipis, ℥iij℥.

M. f. unguent. S. Krätzsalbe.

Rec. Kali carbonici depurati, ℥j.

Sulphuris depurati, ℥ij.

Adipis, ℥iv.

M. f. unguent. S. Krätzsalbe.

(Alibert.)

Rec. Foliorum sabinae recentium contusorum, ℥iij.

Cerae flavae, ℥i℥.

Adipis suillae lotae, ℥vj.

Coque et exprime. Signa. Sabinazerat.
(Sehr reizend. *Pharm. Londin.*)

Rec. Hydrargyri sulphurici flavi, ʒj.
Sulphuris depurati, ʒij.
Adipis suillae, ʒij.
Olei citri italici, gtt. xv.

M. f. unguent. S. Flechtensalbe, bes.
bey herpes lichenoides. (Bi ett.)

Rec. Hydrargyri ammoniato-muriatici,
ʒiß.

Camphorae, ʒj.
Adipis suillae, ʒij.
M. f. unguent. S. Flechtensalbe, gegen
pustulöse Flechten, nach der Anwendung
erweichender Mittel. (Bi ett.)

Rec. Calcariae, aqua adpersa extin-
ctae, ʒj.

Natri carbonici depurati, ʒij.
Extracti opii aquosi, gr. x.
Adipis suillae, ʒij.
M. f. unguent. S. Salbe gegen prurigo.
(Bi ett.)

Rec. Corticis mezerei concisi, ʒj.
Adipis, ʒviiij.

Digere in balneo Mariae per tres cir-
citer horas, exprime. S. Epispasti-
sche Salbe.

Rec. Pulveris gallarum turcicarum sub-
tilissimi, ʒj.
Adipis suillae lotae, ʒj.

M. f. ungt. S. Adstringirende Salbe
(bey Hämorrhoidalknoten, wenn sie
schlaff sind.)

Rec. Graphitis puri, ℥ij.
Adipis, ℥vj.

M. f. unguent. S. Flechtensalbe.
(Weinhold.)

Rec. Ceparum assatarum,
Cerae flavae,
Picis, singul. ℥iib.
Saponis domestici, ℥vj.
Seminis foenugraeci, ℥iij.
Olei olivarum, ℥j.

M. f. unguent. S. Karbunkelsalbe.
(Bücking.)

Rec. Butyri recentis sine sale, ℥iib.
Terebinthinae communis, ℥iv.
Cerae albae, ℥vj.

leni igne liquefactis adde:

Hydrargyri oxydati rubri, ℥j.

Natri muriatici,

Hydrargyri muriatici corrosivi,
singul. ℥ij.

Succi citri, q. s.

ut fiat unguent. S. Zum Einreiben.
(Galotti, gegen Elephantiasis.)?

Rec. Unguenti althaeae, ℥ß.

— *juniperini Pharmac. au-*
striac., ℥ij.

Acidi muriatici, ℥ß.

M. f. unguent. S. Zwey - bis dreymal täglich einzureiben. (Plenk, gegen Grind.)

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci, ʒ ij.
Kali carbonici depurati, ʒ j.
Unguenti rosati, ʒ j.

M. f. ungt. S. Salbe. (Ich habe sie oft mit Erfolg gegen pustulöse Flechten und Hirsekrätze angewendet.)

Rec. Calcariae muriaticae, ʒ iß.
Pulveris foliorum digitalis purpureae, ʒ iij.
Aceti concentrati, ʒ j.
Adipis suillae lotae, ʒ iß.

M. f. unguent. S. Salbe. (Hat mir gegen chronische Drüsengeschwülste gute Dienste geleistet.)

Rec. Herbae digitalis purpureae, ʒ iß.
Aceti vini crudi, ʒ vj.

Coque ad remanent. ʒ iv. Cola.
Colaturam evapora leni igne ad extracti consistentiam; adde
Hydrargyri muriatici mitis, ʒ j.
Unguenti elemi, ʒ ij.

M. f. unguent. S. Auf Leinwand dick aufgestrichen, täglich zweymal überzulegen. (Ich habe diese Salbe mit Erfolg gegen chronische Drüsengeschwülste angewendet.)

Rec. Hydrargyri oxydati rubri,
gr. iv — vj.
Butyri recentis sine sale, ʒ ij.
Aceti

Aceti saturnini,

Tincturae opii crocatae, sing. ʒß.

Misce exactissime. S. Früh und Abends einer Linse groß ins Auge zu bringen, oder nur zwischen die Wimpern zu streichen. (Rust, gegen Psorophthalmie u. d. m.)

Rec. Hydrargyri ammoniato-muriatici,
gr. xv.

Boli armenae, ʒj.

Butyri recentis sine sale, ʒß.

M. exactissime. S. Abends einer Linse groß ins Auge zu streichen. (Rust.)

Rec. Hydrargyri ammoniato-muriatici,
gr. iv — vj.

Aceti saturnini,

Tincturae opii crocatae, sing. ʒß.

Butyri recentis sine sale, ʒij.

M. exactissime. S. Augensalbe.

(Rust.)

Rec. Hydrargyri oxydati rubri, gr. x.

Tutiae praeparatae, gr. vj.

Butyri recentis insulsi, ʒß.

M. exactissime. S. Augensalbe.

(Rust.)

Rec. Hydrargyri oxydati rubri, gr. x.

Olei ovorum, ʒj.

Butyri recentis sine sale, ʒß.

Cerae albae, ʒß.

M. f. unguent. S. Einer Linse groß mittelst eines Pinsels täglich einmal ins Auge zu bringen. (J. A. Schmidt.)

Rec. Hydrargyri oxydati rubri, gr. xv.
Cupri sulphurici crystallini, gr. iv.
Camphorae, oleo ovorum sub-
actae, gr. vj.

Olei cacao, ℥ij.
M. exactissime. S. Augensalbe.
 (Beer.)

Rec. Zinci oxydati albi, ℥ß.
Olei nucum juglandis, ℥j.
Unguenti rosati, ℥j.

M. f. unguent. S. Mit einem Pinsel zweymal täglich einer Linse groß in das Auge zu streichen. (J. A. Schmidt, gegen Hornhautflecke.)

Rec. Zinci sulphurici crystallini, ℥j.
Butyri recentis sine sale, ℥ij.

M. f. unguent. S. Einer Linse groß in den Augwinkel zu bringen. (Reil, gegen triefende Augen.)

Rec. Hydrargyri oxydulati nigri, gr. ij.
Olei nucum juglandis, ℥ij.

M. S. Augensalbe. (Hufeland, gegen Hornhautflecke.)

Rec. Opii crudi, ℥j.
Extracti hyoscyami, aëre exsic-
cati, ℥ij.

Unguenti hydrargyri cinerei, ℥ß.
M. f. unguent. S. In die Umgegend des Auges einzureiben. (v. Gräfe.)

Rec. Hydrargyri oxydati rubri,
gr. viij — xvj.

Aeruginis crystallini, gr. iv — vj.

Butyri recentis sine sale, ℥℔.

M. f. unguent. S. Augensalbe.

(Benedict.)

Rec. Aeruginis, ℥iij.

Olibani, ℥ij.

Conterantur exactissime cum pauxillo aceti; adde

Terebinthinae, ℥j.

M. f. unguent. Signa. Salbe, eine oder zwey Stunden lang aufzulegen, dann eben so lange zu entfernen, und wiederum aufzulegen. (Archigenes, gegen böse Flechten, syphilitische Hautkrankheiten.)

Rec. Hydrargyri puri,

Acidi nitrici puri, singul. ℥j.

Solve leni calore, dein adde agitando:

Olei olivarum,

Adipis lotae, singul. ℥vj.

S. Salbe. (Swediaur.)


Rec. Hydrargyri puri, ℥j.

— *oxydati rubri, gr. x.*

Conterantur, donec hydrargyrum colorem gryseum aut nigricantem adquisiverit, adde:

Adipis lotae, ℥j.

S. Quecksilbersalbe. (Swediaur.)



Breyumschlag (*cataplasma*).

Rec. Farinae tritici, ℥iv.

Aceti vini crudi, q. s.

Coque ad consistent. pultis.

S. Erweichender Umschlag, warm überzulegen. (T o d e.)

Rec. Farinae seminis lini,

— *hordei, singularum part. aequal.*

Coque ex aqu. q. s.

Fiat cataplasma. S. Erweichender Breyumschlag. (R i c h a r d.)

Rec. Micae panis albi, ℥ij.

Lactis, q. s.

Coque ad consistentiam pultis, sub finem adde:

Croci pulverati, ℥ß.

S. Lauwarm überzulegen.

Rec. Saponis albi pulverati, ℥ij.

Farinae hordei, ℥iv.

Aquae fervidae, q. s.

M. f. cataplasma. S. Zertheilender Umschlag. (R i c h a r d.)

Rec. Ammonii muriatici,

Saponis domestici,

Herbae hyoscyami pulveratae,

singul. ℥ß.

Pulveris seminis lini, ℥ß.

Aquae ferventis, q. s.

M. S. Warm überzulegen.
(Vogler.)

Rec. Ammonii muriatici, ℥j.

Opium crudi, ℥℥.

Farinae secalis, ℥iv.

Aceti ferventis deluti, q. s.

M. S. Kalt auf die Stirn zu legen.

(Vogler.)

Rec. Saponis domestici, ℥℥.

Herbae hyoscyami pulverati,

— *conii pulverati, sing. ℥i℥.*

Seminis lini, ℥j.

Aquae fervidae, q. s.

M. f. cataplasma. S. Warm zwischen
Leinwand überzulegen.

Rec. Fermenti cerevisiae,

Mellis crudi, singul. ℥iv.

Farinae secalis, q. s.

F. cataplasma. S. Gährender Breyum-
schlag auf brandige Theile.

Rec. Extracti conii maculati, ℥j.

— *hyoscyami, ℥℥.*

Pulveris foliorum belladonnae, ℥j.

Liquoris ammonii acetici, q. s.

F. cataplasma. S. Auf Leder gestrichen,
auf das Krebsgeschwür zu legen.

(A. G. Richter.)

Rec. Specierum emollientium, ℥ij.

Seminis sinapis pulverati, ℥℥.

Aceti, q. s.

M. f. cataplasma. S. Rothmachender
Umschlag.
(Berends.)

Rec. Seminis sinapis pulverati,
Ceparum assatarum, singul. ℥ij.
Saponis nigri, ℥j.

Coque cum aqu. font. q. s. ad consist.
pultis.

S. Einen Zoll dick unmittelbar auf die Geschwulst, und dann einen heißen einfachen Breiumschlag darüber zu legen. (Kerndl, um die Bubonen in Eiterung zu setzen.)

Rec. Farinae hordei, ℥iv.
Pulveris corticis peruviani, ℥j.
Camphorae, ℥j.
Aquae fervidae, q. s.

M. f. cataplasma. S. Auf die brandige Stelle zu legen.

Rec. Corticis peruviani pulverati, ℥i℔.
Camphorae, ℥i℔.
Farinae seminis lini, ℥℔.
Vini rubri, q. s.

M. f. cataplasma. S. Auf die brandige Stelle zu legen. (Berends.)

Rec. Camphorae, cum vitell. ov. subtractae, ℥j.
Corticis peruviani regii,
Carbonum pulveratorum, sing. ℥j.
Vini rubri, q. s.

M. f. cataplasma. S. Auf die Brandstelle zu legen. (Berends.)

Rec. Camphorae, ℥i℔.
Carbonum pulveratorum,

Corticis peruviani pulverati, singul. ʒj.

Olei terebinthinae rectificati, q. s.

M. f. cataplasma. S. Auf die brandige, durchgelegene Stelle zu legen.

(Berends.)

Rec. Camphorae, ʒj.

Asae foetidae, ʒi℔.

Vitellor. ovi, q. s.

Conterantur exacte; adde

Pulveris corticis peruviani, q. s.

F. cataplasma. S. Unmittelbar aufzulegen. (Gegen brandigen Dekubitus habe ich dieses und das folgende Kataplasma oft mit Nutzen angewendet.)

Rec. Asae foetidae, ʒi℔.

Mucilaginis gummi mimosae, ʒvj.

Pulveris seminis lini, ʒ℔.

Aceti saturnini, ʒj.

M. f. cataplasma. S. Auf Leinwand gestrichen, aufzulegen. (Wenn noch eine entzündliche Reizung im Dekubitus statt findet.)

Rec. Camphorae, ʒij.

Unguenti hydrargyri cinerei, ʒ℔.

Lactis calidi, ʒiiij.

Micae panis albi, q. s.

M. f. cataplasma. S. Warm über die Genitalien zu legen. (Swediaur, gegen den Tripper.)

Rec. Specierum aromaticarum, ʒj.

Ammonii muriatici, ʒ℔.

Farinae hordei, ℥iv.

Vini rubri calidi, q. s.

F. cataplasma. S. Stärkender Umschlag.
(Richard.)

Rec. Pulveris seminis sinapis, ℥iv.

— *piperis*,

— *zingiberis*, singul. ʒß.

Oxymellis simplicis, q. s.

F. cataplasma. S. Rothmachender Umschlag. (Willis, gegen Koxalgie.)

Rec. Herbae digitalis purpureae pulveratae, ʒiij.

Herbae absinthii pulveratae, ʒvj.

Pulveris seminis lini, ʒß.

Olei terebinthinae, ʒij.

Oxymellis scillitici, q. s.

F. cataplasma spissius. S. Auf Leinwand gestrichen, in der Nieren- und Lumbargegend überzulegen. (In sehr vielen Fällen habe ich mit diesem Umschlag die Diuresis befördert.)

Flüssige Arzneiformen.

Lecksaft (*linctus*), Schleim (*mucilago*).

Rec. Olei amygdalarum recentis, ʒj.

Sacchari albi, ʒß.

Gummi mimosae, ʒij.

Succi citri recentis, ʒiʒ.

M. f. linctus. S. Gut umgeschüttelt,
stündlich einen Theelöffel voll.

(J. A. Schmidt.)

Rec. Mucilaginis gummi mimosae,

Syrupi althaeae, singul. ʒiʒ.

Olei amygdalarum, ʒj.

M. S. Zweystündlich oder auch öfter
einen mässigen Theelöffel voll zu nehmen.

Rec. Tincturae opii crocatae, scrupulum dimidium (ʒʒ.)

Syrupi althaeae,

— *senegae, singul. ʒiʒ.*

M. S. Auswurf befördernder Lecksaft,
zweystündlich einen Theelöffel voll.

(Berends.)

Rec. Acidi benzoici, ʒʒ.

Gummi mimosae, ʒj.

Adde terendo

Syrupi amygdalarum, ʒij.

M. f. linct. S. Stündlich oder zwey-
stündlich, gut umgeschüttelt, einen Ess-
löffel voll.

(Berends.)

Rec. Pulveris radices salap, ʒʒ.

Aquae fontanae, ʒij.

Extracti hyoscyami, ʒʒ (scrupulum dimid.).

Aquae florum aurantii, ʒj.

Syrupi althaeae, ʒj.

M. f. linct. S. Bey Hustenreiz öfter ei-
nen Theelöffel voll.

(Hufeland.)

Rec. Balsami copaivae, ℥i℥.
Spiritus nitrico-aetherei, ℥i℥.
Syrupi senegae,
 — *althaeae, singul. ℥j.*

M. f. linct. S. Viermal täglich einen Theelöffel voll. (Schmidt, gegen Nachtripper.)

Rec. Ammoniacy, ℥j.
Sulphuris stibiati aurantiacy, gr. vj.
Syrupi althaeae, ℥iij.

M. f. linct. S. Gut umgeschüttelt, zwey-
 stündlich einen bis zwey Theelöffel voll.
 (Schmidt.)

Rec. Resinae jalappae, gr. viij (grana octo).

Syrupi amygdalarum, ℥vj.

Aquae cinnamomi, ℥j.

M. S. Auf einmal zu nehmen. (Burdach, abführend.)

Rec. Camphorae tritae, gr. ij.

Mucilaginis gummi mimosae, ℥iij.

Subige exacte, adde

Syrupi diacodion, ℥ij.

M. f. linct. S. Umgeschüttelt, zwey-
 stündlich einen Theelöffel voll.

(Herrmann.)

Rec. Olei terebinthinae rectificati, ℥ij.

Mellis rosati, ℥iv.

M. S. Drey mal täglich einen Eßlöffel
 voll. (Martinet, gegen Hüftweh.)

Pinselsaft (*litus oris*).

Rec. Acidi muriatici puri, gtt. xv.

Syrupi mororum, ℥ iij.

Tincturae catechu, ℥ j.

M. S. Pinselsaft.

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi,
grana sex (gr. vj).

Extracti conii maculati,

— *florum chamomillae,*

singul. ℥ ij.

Tincturae opii simplicis, ℥ j.

Mellis rosati, ℥ j.

Solv. S. Mittelst eines Pinsels den Tag über drey- bis viermal auf die Geschwüre zu bringen. (Rust, gegen syphilitische Halsgeschwüre.)

Rec. Oxymellis aeruginis, ℥ iij.

Tincturae catechu, ℥ j.

Mellis rosati, ℥ j.

M. S. Pinselsaft gegen Mundfäule.

Rec. Aquae oxymuriaticae, ℥ ℔.

Syrupi althaeae, ℥ j.

M. S. Pinselsaft, gegen Aphthen.

Rec. Acidi pyrolignosi, ℥ i℔.

Mellis rosati, ℥ j.

M. S. Pinselsaft, gegen Wasserkrebs.

Rec. Cupri sulphurici crystallini, gr. vj.

Aquae destillatae simplicis, ℥ j.

Mucilaginis gummi mimosae, ℥ ℔.

Solv. S. Pinselsaft gegen Merkurialgeschwüre im Munde und Halse.

Rec. Camphorae, gr. vj.
Gummi mimosae, ʒj.
Olei amygdalarum recentis,
Syrupi althaeae, singul. ʒvj.
Tincturae opii simplicis, ʒß.
M. S. Pinselsaft gegen Merkurialge-
 schwüre im Munde. (Berends.)

Rec. Aluminis, gr. x.

Solve in

Mellis rosati, ʒiß.
Tincturae catechu, ʒiß.
M. S. Pinselsaft, bey Mundfäule.

Aufgufs (*infusum, infusio*).

Kalte Aufgüsse.

Rec. Ligni quassiae, ʒß.
Aquae fontanae frigidae, ʒxviij.
Macerentur, saepius agitando, per ny-
cthemeron. Colaturae adde
Aetheris acetici, ʒj.

M. S. Dreymal täglich ein mäßiges
 Weinglas voll. (Berends.)

Rec. Radicis valerianae minoris,
Ligni quassiae,
Corticis peruviani regii, sing. ʒiij.
Aquae fontanae frigidae, ʒxviij.

Macerentur per diem et noctem. Cola.
S. Dreystündlich ein halbes Weinglas
 voll. (Berends.)

Rec. Ligni quassiae, ℥℔.

Aquae calcariae ustae, ℥xviiij.

Macerentur in lagenâ rite clausa, saepius agitando, per biduum. Colaturae adde

Aquae cinnamomi vinosae, ℥ij.

Misce, et dispone in tres lagenulas rite claudendas. S. Dreymal täglich ein gutes halbes Weinglas voll. (Diesen Aufguß habe ich mit Nutzen gegen Atonie des Nahrungskanals, aton. Schleimflüsse, besonders aus den Harnwerkzeugen, und gegen arthritische Kachexien angewendet.)

Rec. Herbae cochleariae florecentis, recentis, ℥ij.

Seminis sinapis contusi, ℥℔.

Vini gallici albi, ℥xxiv.

Macerentur per triduum. Colaturae adde

Spiritus muriatico-aetherei, ℥ij.

M. S. Dreymal täglich ein halbes Weinglas voll. (Gegen Skorbut.)

Rec. Corticis peruviani regii pulverati, ℥j.

Gummi mimosae, ℥j.

Tere exacte, et inter terendum sensim affunde:

Aquae fontanae frigidae, ℥xij.

Macerentur per duodecim horas. Cola.

S. Dreystündlich zwey Eßlöffel voll.
(Burdach.)

Warme Aufgüsse. — Auflösende
Mittel.

Rec. Ipecacuanhae radices, ℥ij.

Tartari depurati, ℥℔.

Infunde cum aquae fervid. ℥iv.

Adde

Oxymellis squillitici, ℥℔.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.
(Gianella.)

Rec. Radicis ipecacuanhae, ℥ij.

Vini hispanici, ℥iij.

Digere per xxiv horas. Zu fünf, zehn
bis funfzehn Tropfen. (Bey empfindli-
chen Individuen und Kindern statt des
Spießsglanzweins).

Rec. Herbae digitalis purpureae, ℥℔.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥iv.

Digere per quart. hor. part.

Adde

Vini stibiati, ℥j.

Syrupi althaeae, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen halben Eß-
löffel. (Wendt, gegen Skrofeln.)

Rec. Radicis rhei optimi, ℥i℔.

— *ipecacuanhae, ℥℔.*

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥iij.

Adde

Gummi mimosae, ℥j.

Syrupi althaeae, ℥j.

M. S. Stündlich einen Eßlöffel voll.

(Jahn.)

Rec. Florum chamomillae, ʒß.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ʒv.

Adde

Spiritus vini gallici, ʒij.

Kali carbonici, ʒj.

M. S. Viermal täglich einen Eßlöffel voll.
(Burdach.)

Abführende Mittel.

Rec. Foliorum sennae,

Radiciis rhei optimi,

Mannae, singul. ʒiij.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ʒij.

Adde

Tartari natronati, ʒß.

Solv. S. Auf einmal zu nehmen. (Ribke. Abführmittel für Wöchnerinnen.)

Rec. Foliorum sennae, ʒiß.

Summitatum millefolii, ʒiij.

Seminis carvi contusi, ʒij.

Infunde aqu. fervid. q. s. ad colat. ʒiij.

Solve

Natri phosphorici, ʒß.

Adde

Syrupi mannati, ʒß.

M. S. Die Hälfte auf einmal, dann stündlich einen Eßlöffel voll bis zur Wirkung. (Ich habe diesen Aufguß, welcher ohne Beschwerden abführt, oft bey empfindlichen Individuen, Hypochondristen, Hysterischen, mit Nutzen angewendet.)

(,,)

(,,)

Diuretische Mittel.

Rec. Radicis scillae recentis, ℥℔.

Vini albi generosi, ℥xxiv.

Digere per tres dies. S. Dreystündlich
einen Eßlöffel.

Rec. Herbae digitalis purpureae, ℥j.

Radicum calami aromatici, ℥iij.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥v.

Adde

Tartari boraxati, ℥℔.

Succi juniperi, ℥i℔.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel.

(Hat mir oft in asthenischen Wassersuchten gute Dienste geleistet.)

Rec. Radicis serpentariae Virginianae,

Corticis peruviani regii, sing. ℥ij.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥iv.

Adde

Tartari boraxati, ℥ij.

Spiritus nitrico-aetherei, ℥j.

Syrupi corticum aurantiorum, ℥v.

Succi juniperi, ℥iij.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel.

(K o p p.)

Rec. Radicum scillae siccatae, ℥℔.

— senegae, ℥ij.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥v.

Adde

Tincturae colocynthis, ℥j.

Syrupi corticum aurantiorum, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.
(In torpiden Wassersuchten habe ich diesen Aufguß mit Erfolg angewendet.)

Menstruationbefördernde Mittel.

Rec. Herbae sabinae, ʒj.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ʒviij.

Adde

Boracis, ʒiv.

Sacchari albi, ʒj.

M. S. Dreyimal täglich einen Eßlöffel, zur Zeit der Menstruation aber zweystündlich. (Kopp, gegen Dysmenorrhoe aus Atonie und Torpor der Gebärmutter.)

Rec. Herbae rorismarini,

— *menthae piperitae, sing. ʒiij.*

Infunde aqu. fervid. q. s. ad colat. ʒvj.

Adde

Aetheris sulphurici, ʒj.

Syrupi corticum aurantiorum, ʒj.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel.
(Hat mir gegen Menischesis aus Atonie gute Dienste geleistet.)

Narkotische Mittel.

Rec. Foliorum digitalis purpureae,

grana octo (gr. viij).

Infunde aquae fervid. q. s. ad colat. ʒiij.

Adde

Liquoris kali acetici,

Syrupi althaeae, singul. ℥℥.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.

Rec. Herbae digitalis purpureae,

℥℥ — ℥j.

Phellandrii aquatici seminis, ℥℥.

Infund. aquae fervid. q. s. ad colat. ℥iv.

Adde

Spiritus muriatico-aetherei, ℥j.

Syrupi althaeae, ℥℥.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll
zu nehmen. (Jahn.)

Rec. Herbae nicotianae, ℥j.

Infund. aquae fervid. q. s. ad colat. ℥viij.

Adde

Tincturae corticum aurantiorum,
℥℥.

M. S. Zweymal täglich dreyßsig Tropfen.
(Fowler.)

Erregende und reizende Mittel.

Rec. Florum sambuci, ℥℥.

Infunde aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥iv.

Adde

Liquoris ammonii acetici, ℥j.

Ammonii carbonici pyro-oleos.
℥j.

Sacchari, ℥℥.

Solv. S. Zweystündlich einen Eßlöffel
voll. (Burdach.)

Rec. Foliorum aurantii recentium, ℥j.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad col. ℥viii.

Adde

Tincturae valerianae aethereae, ℥j.

Syrupi corticum aurantiorum, ℥j.

M. S. Zwey- oder dreystündlich einen
Eßlöffel voll.

Rec. Radicum valerianae minoris, ℥℔.

— *senegae, ℥ij.*

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥vj.

Adde

Spiritus sulphurico-aetherei, ℥j.

Syrupi corticum aurantiorum, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.

(Berends, in asthenischen Fiebern.)

Rec. Radicis valerianae,

— *serpentariae, singul. ℥ij.*

Corticis peruviani regii, ℥℔.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥vj.

Adde

Spiritus muriatico-aetherei, ℥j.

Syrupi corticum aurantiorum, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.

(Berends, in asthenischen Fiebern.)

Rec. Florum arnicae, ℥ij.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥vj.

Adde

Gummi mimosae, ℥ij.

Syrupi corticum aurantiorum, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.

(Berends, in torpiden Nervenfebern.)

Rec. Radicis calami aromatici, ℥j.

Florum arnicae, ℥ij.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥vj.

Adde

Acidi succinici empyreumatici, ℥j.

Syrupi althaeae, ℥i℔.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.

(Diesen Aufguß habe ich in torpiden Nervenfiebern mit Erfolg angewendet.)

Rec. Radicum arnicae,

— *columbo, singul. ℥ij.*

Corticum cascarillae, ℥iij.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad col. ℥vij.

Adde

Syrupi corticum aurantiorum, ℥j.

M. S. Dreystündlich einen Eßlöffel voll.

(Berends, gegen atonische Diarrhöen.)

Rec. Herbae pulsatillae nigricantis,

℥j — ℥iij.

Infunde vini gallici albi, q. s. ad colat.

℥viij.

Adde

Syrupi cinnamomi, ℥j.

Acetheris acetici, ℥j.

M. S. Eßlöffelweise, in steigender Ga-

be. (v. Graefe, gegen Amaurose.)

Abkochungen (*decocta*) und Aufguß-
abkochungen (*infuso-decocta*).

Auflösende Mittel.

Rec. Radicis taraxaci, ℥i℔.

Coque ex aqu. font. ℥xiv ad col. ℥viij.

Adde

Kali tartarici, ℥℔.

Mellaginis graminis, ℥ij

M. S. Dreystündlich einen mäßigen Tas-
senkopf voll.

Rec. Radicis hellebori nigri, ℥ij.

Coque ex aquae libr. j ad colat. ℥viij.

Adde

Kali tartarici, ℥℔.

Mellis depurati, ℥ij.

M. S. Dreystündlich einen Eßlöffel voll.
(Burdach.)

Rec. Carbonum spongiae marinae, ℥j.

*Coque ex aquae fontan. libr. ij ad co-
lat. libr. j.*

Adde

Syrupi cinnamomi, ℥j.

M. S. Zweymal täglich zwey Eßlöffel
voll. (Burdach.)

Rec. Stipitum dulcamarae, ℥℔.

Seminis phellandrii, ℥ij.

Coque ex aqu. ℥xvj ad colat. ℥viij.

S. Den Tag über zu verbrauchen.

(Richard.)

Rec. Spongiarum marinarum,

Tartari crudi, singul. ℥iv.

Lapidis spongiae,

Aluminis crudi,

Corii russici (Juchten), sing. ℥ij.

*Combure in vase clauso, ut fiat pulvis
niger.*

*Rec. Pulveris hujusce nigri, ℥vj.
Coque ex aquae ℥xv ad colat. ℥ix.*

Adde

Aquae cinnamomi,

Syrupi florum aurantii, sing. ℥℔.

M. S. Früh und Abends einen großen
Esslöffel voll.

(Hausleutner in Warmbrunn.)

Abführende Mittel.

Rec. Radicis taraxaci, ℥j.

Coque ex aqu. ℥xviiij ad colat. ℥xij.

Adhuc fervidam infunde cum

Foliorum sennae, ℥iiij.

Cola et solve

Natri sulphurici, ℥iiij.

Mannae, ℥j.

M. S. Zweystündlich zwey bis drey Eß-
löffel.

Rec. Fructuum tamarindorum, ℥ij.

Coque ex aquae ℥xviiij ad colat. ℥ix.

Solve

Tartari natronati, ℥j.

Elaeosacchari flavedinis citri, ℥iiij.

M. S. Zweystündlich einen guten halben
Tassenkopf voll.

Diuretische Mittel.

Rec. Herbae digitalis purpureae, ℥i℔.

Corticis cascarillae, ℥℔.

Coque ex aqu. ℥x ad colat. ℥vj.

Adde

Liquoris ammonii acetici, ℥℔.

Syrupi althaeae, ℥j.

M. S. Zwey- oder dreymal täglich einen
Eßlöffel voll. (Harless.)

Rec. Colocynthis, ℥ij.

Coque ex cerevisiae ℥xxiv ad col. ℥xij.

S. Dreymal täglich einen Eßlöffel voll.
(Hufeland.)

Rec. Corticis peruviani regii, ℥iij.

Coque ex aqu. ℥xvj ad colat. ℥vj.

Adhuc fervidam infunde cum

Herbae digitalis purpureae, ℥j.

Cola et adde

Spiritus nitrico-aetherei, ℥j.

Syrupi corticum aurantiorum, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.

Rec. Radicis helenii, ℥iij.

Coque ex aqu. ℥viij ad colat. ℥iv.

Adde

Tincturae digitalis purpureae, ℥ij.

— *kalinae, gtt. xvij.*

Syrupi corticum aurantiorum, ℥j.

M. S. Dreymal täglich einen halben Eß-
löffel voll. (Fouquier.)

Erregende und reizende Mittel.

Rec. Radicis senegae, ℥ij.

Corticis cascarillae, ℥iij.

Coque ex aqu. ℥x ad colat. ℥vj.

Adde

Gummi mimosae, ℥ij.

Liquoris ammonii anisati, ℥iß.

Syrupi balsamici, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel.
(Hat mir oft gegen Atonie und atonische
Verschleimung der Lungen gute Dienste
geleistet.)

Rec. Foliorum rhododendri chrysanthi,
℥ij — ℥vj.

Coque ex aquae ℥x ad colat. ℥vj.

Adde

Syrupi balsamici, ℥j.

M. S. Drey mal täglich einen, zwey bis
drey Eßlöffel. (Berends.)

Stärkende Mittel.

Rec. Corticis cascarillae, ℥vj.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥vj.

*Residuum corticum coque ex aquae ℥x
ad colat. ℥iv.*

Misce et adde

Syrupi corticum aurantiorum, ℥j.

S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.

Rec. Corticis angusturae genuinae, ℥vj.

Coque ex aqu. ℥xij ad remanent. ℥vj.

Adde

Tincturae aromaticae, ℥ij.

Syrupi corticum aurantiorum, ℥j.

M. S. Dreystündlich einen Eßlöffel voll.
(Berends.)

Rec. Radicis polygalae amarae, ℥j.

Coque ex aqu. ℥xiv ad colat. ℥viij.

Adde

*Adde**Spiritus muriatico-aetherei, ℥j.**Syrupi althaeae, ℥j.*

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.
(Berends, besond. gegen Atonie der Lungen.)

*Rec. Radicis columbo, ℥℔.**Coque ex aqu. ℥x ad colat. ℥vj.**Sub finem coctionis adde**Corticis cascarillae, ℥ij.**Colaturae admisce**Tincturae corticum aurantiorum,*
*℥ij.**Syrupi cinnamomi, ℥j.*

M. S. Dreystündlich einen reichlichen
Eßlöffel. (Berends, gegen Atonie des
Darmkanals, gegen atonische Diarrhöen.)

*Rec. Corticis peruviani, ℥j.**Coque ex aqu. ℥xij, ad colat. ℥iv.**Adde**Succi citri recens expressi, ℥iij.**Vini rhenani optimi,**Syrupi rubi idaei, singul. ℥j.*

M. S. Stündlich einen Eßlöffel. (R. A.
Vogel, in asthenischen Faulfiebern.)

*Rec. Radicis columbo, ℥j.**Corticum aurantiorum, ℥℔.**Vini generosi, ℥x.**Digere per quatuor horas, cola.**Residuum coque ex**Aquae, ℥xij ad colat. ℥vj.*

*Adde mixtis**Tincturae cinnamomi, ℥vj.**Syrupi corticum aurantiorum, ℥j.**M. S.* Viermal täglich einen Eßlöffel voll.*Rec. Herbae salviae, ℥vj.**Coque ex aquae ℥x ad colat. ℥iv.**Adde**Vini rubri optimi, ℥ij.**Sacchari albi, ℥ß.**M. S.* Zweystündlich einen Eßlöffel voll.

(Consbruch, gegen asthen. Schweisse.)

*Rec. Radicis ratanhiaë, ℥j.**Coque ex aquae ℥xvj ad colat. ℥viij.**Adde**Syrupi cinnamomi, ℥iß.**Mixturae sulphurico-acidæ, ℥j.**M. S.* Stündlich oder zweystündlich einen Eßlöffel. (Habe ich mit Nutzen gegen atonische Blutflüsse angewendet.)*Rec. Radicis tormentillæ, ℥ß.**Coque ex aquae ℥x ad colat. ℥vj.**Adde**Tincturae cinnamomi, ℥ij.**Syrupi corticum aurantiorum, ℥j.**M. S.* Zweystündlich einen Eßlöffel.

(Berend s.)

*Rec. Radicis althææ, ℥ij.**Coque ex aqu. ℥iij ad colat. ℥ij.**Adde**Gummi mimosæ, ℥j.*

Ferri muriatici, ℥℥.

Syrupi althaeae, ℥vj.

M. S. Zweystündlich einen Theelöffel voll. (Pommer, gegen Magengrunderweichung.)

Rec. Ligni quassiae, ℥iij.

Catechu, ℥ij.

Coqu. ex aqu. libr. j, ad colat. ℥ix.

Adde

Aquae cinnamomi,

Syrupi mororum, singul. ℥ij.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.

Tisane (*ptisana*), Getränk (*potus*).

Schwächende, kühlende, erschlafende Mittel, nährende Getränke.

Rec. Hordei excorticati s. avenae, ℥i℥.

Coque ex aquae libr. iiii℥ ad colat. libr. ii j

Adde

Kali nitrici depurati, ℥iij.

Sacchari albi, ℥ij.

M. S. Zum Getränk. (In hypersthenischen Fiebern. Berends.)

Rec. Radicis althaeae, ℥i℥.

Coqu. ex aqu. libr. iiii℥ ad col. libr. ii j.

Adde

Kali nitrici depurati, ℥iij.

Oxymellis simplicis, ℥ij.

M. S. Zum gewöhnlichen Getränk. (Berends, besond. bey hypersthen. Lungenentzünd.)

Rec. Tartari depurati, ℥℔.
Aquae fontanae, libr. iiii℔.

Coque ad solutionem usque;
adde

Mellis depurati, ℥ij.

seu

Sacchari albi, ℥j.

M. S. Zum gewöhnlichen Getränk.
 (Berends.)

Rec. Decocti hordei tenuioris, libr. iij.

Succi citri, ℥iij.

Syrupi rubi idaei, ℥ij.

M. S. Zum Getränk.

Rec. Pulpae tamarindorum, ℥℔.

Pastae althaeae pulveratae, ℥ij.

Digerentur aquae fervidae libr. ij.

S. Zum gewöhnlichen Getränk. (In Gallenfiebern.)

Rec. Sacchari lactis, ℥℔.

Aquae fervidae, libr. ij.

Solve et adde

Succi citri, ℥j.

Sacchari albi, q. s. ad gratum
saporem.

S. Zum Getränk.

Rec. Pastae althaeae, ℥j.

Aquae fervidae, libr. iij.

Sacchari albi, ℥ij.

Succi citri, ℥℔.

Solv. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

Rec. Pomorum Borsdorfianorum concisorum, numer. ij.

Coque per breve tempus ex aquae, libr. iij.

Adde

Elaeosacchari flavedinis citri, ℥ij.

Sacchari albi, q. s. ad gratiam.

S. Zum gewöhnlichen Getränk.

Rec. Cerasorum nigrorum siccatorum, contusorum, ℥i℔.

Aquae fontanae, libr. iij.

Coque paulisper, cola, adde

Syrupi succi citri, q. s. ad gratiam.

M. S. Zum gewöhnlichen Getränk.

Rec. Panis albi, ℥i℔.

Coque per breve tempus ex Aquae fontanae, libr. iij.

Adde

Syrupi ribium, ℥ij.

(Succi citri, ℥℔.)

M. S. Zum Getränk.

Rec. Cornu cervi, radula comminuti,

Micae panis albi, singul. ℥iij.

Coque ex aqu. libr. v ad colat. libr. iij.

Adde

Syrupi succi citri, q. s. ad gratiam.

M. S. Zum Getränk. (Sydenham's
decoct. alb., d. Klein verbessert.)

Rec. Ichthyocollae, ℥ij.

Coqu. ex aqu. libr. iij ad colat. libr. ij.

Adde

Vini rhenani, ℥iv.

*Sacchari albi, q. s. ad gratum
saporem.*

M. S. Zum Getränk. (Berends.)

Rec. Panis nigri tosti, ℥ij.

Infunde cum

Aquae fervidae, libr. iij.

Cola et adde

Vini rubri optimi, ℥ij.

*Sacchari albi, q. s. ad gratum
saporem.*

M. S. Zum Getränk.

Abführende Mittel.

Rec. Fructuum tamarindorum, ℥i℔.

Tartari depurati, ℥℔.

Coque ex aqu. libr. iv ad colat. libr. iij.

Adde

Sacchari albi, ℥ij.

M. S. Zum Getränk.

Rec. Natri sulphurici, ℥i℔.

Aquae fontanae purae, ℥xvj.

Succi citri, ℥℔.

Sacchari albi, ℥iij.

Solv. S. Abführende Limonade.

(Berends.)

Rec. Magnesiae sulphuricae, ℥j.
Decocti malthi, ex ℥ij parati,
libr. iij.

Tartari stibiati, grana tria
(gr. iij.)

Tincturae opii crocatae, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen Tassenkopf
 voll, bis Öffnung erfolgt. (Reil.)

Rec. Tartari depurati, ℥℔.

Sacchari lactis, ℥j.

Coque ex aqu. libr. v ad remanent.

libr. iij.

Adde

Mellis depurati, ℥ij.

M. S. Zum Getränk.

Diuretische Mittel.

Rec. Radicis armoraciae recentis, ℥v.
Cerevisiae, libr. ij.

Digere, cola et adde

Syrupi communis, ℥j.

M. S. Tassenweise. (Hufeland.)

Rec. Tartari boraxati, ℥℔.

Aquae fontanae, libr. libr. ij.

Spiritus juniperi, ℥j.

Oxymellis simplicis, ℥ij.

M. S. Zum Getränk. (Ist von mir in
 Wassersuchten oft mit Erfolg gereicht
 worden.)

Rec. Baccarum juniperi,

Herbae absinthii, singul. ℥℔.

Aquae fervidae, ℥xviij.

Diger. per sex horas. Cola. S. Drey-
mal täglich ein Weinglas voll.
(Weikard.)

Diaphoretische Mittel.

Rec. Aceti crudi, ℥i℔.

Liquoris ammonii acetici, ℥℔.

Aquae fontanae decoctae, libr. iij.

Oxymellis simplicis, ℥ij.

M. S. Zum Getränk.

Rec. Corticis ligni sassafras, ℥℔.

Coque ex aquae libr. iiii℔ ad reman.

libr. iij.

Adde

Mixturae pyro-tartaricae, ℥℔.

Sacchari albi, ℥iij.

M. S. Lauwarm tassenweise zu trinken.

Diaphoretisch - diuretische oder
sogenannte blutreinigende Mit-
tel.

Rec. Radicum caricis arenariae, ℥i℔.

— saponariae, ℥℔.

Coqu. ex aqu. libr. v ad reman. libr. iij.

Colaturae adhuc fervidae adde

Herbae trifolii fibrini, ℥℔.

Stipitum dulcamarae, ℥ij.

Digere per horam. Cola. S. In vier
Portionen den Tag über zu verbrauchen.

Rec. Radicis caricis arenariae, ℥℔.

— glycyrrhizae, ℥℔.

Corticis ulmi, ℥ij.

Coque ex aqu. libr. iiiiß ad col. libr. iij.

Adde

Natri sulphurici, ʒj.

— *carbonici depurati, ʒß.*

M. S. Den Tag über zu verbrauchen.

(Heim, gegen Flechten.)

Rec. Radicis sarsaparillae, ʒiv.

Coque ex aqu. libr. xij ad col. libr. viij.

Sub finem coctionis adde

Radicis glycyrrhizae, ʒß.

Cola. Diese Quantität wird in 16 Gläsern vertheilt, und davon des Morgens nüchtern alle Viertelstunden ein Glas getrunken. (Ste. Marie, Heilung veralteter Syphilis ohne Merkur.)

Rec. Radicis sarsaparillae, ʒiij.

Ichthyocollae, ʒiß.

Gummi mimosae, ʒij.

Stibii sulphurati nigri, in nodul. ligat., ʒiv.

Coque ex aqu. fontan. libr. vj ad reman. libr. iij.

Cola. S. Die Hälfte davon den Tag über in drey Portionen zu verbrauchen.

(Fels.)

Rec. Putaminum s. corticum ligneorum nucis juglandis, ʒviij.

Radicis sarsaparillae,

— *chinae nodosae, sing. ʒß*

Stibii sulphurati nigri,

Lapidis pumicis, in petia ligatorum, singul. ʒß.

Macerentur per noctem in aquae libr. viij. Sequenti die coque vase clauso per quadrantem horae, dein remove petia, et coque residuum ad libr. v. Decanthetur liquidum. S. Morgens und Abends ein Pfund, und einen warmen Aufguß der Althäawurzel nachzutrinken. (Pollin.)

(Nach einer andern, wahrscheinlich später veränderten Vorschrift werden den Ingredienzien noch ℥iijß Guajakholz und Rinde, und der abgegossenen Abkochung Pomeranzensyrup und Zimmtwasser, von jedem ℥ß, hinzugesetzt.)

Rec. Radicis sarsaparillae, ℥xij. Digere in lebetæ stanneo per viginti quatuor horas cum

Aquae fontanae, libr. Lxxij.

Adjice sacculum, includentem;

Aluminis saccharati, ℥iß.

Hydrargyri muriatici mitis, ℥ß.

Cinnabaris antimonii, ℥j.

Coque ad remanentiam libr. xxiv.

Sub finem coctionis adde

Foliorum sennae, ℥iij.

Radicum glycyrrhizae, ℥iß.

Seminum anisi,

— foeniculi, singul. ℥ß.

Cola. S. Decoctum fortius.

Rec. Residui decocti fortioris,

Radicum sarsaparillae, ℥vi.

Coque ex aqu. fontan. libr. lxxij ad remanent. libr. xxiv.

Sub finem coctionis adde:

Corticum citri,

— *cinnamomi,*

Cardamomi minoris,

Radicum glycyrrhizae, sing. ℥ iij.

Cola. S. Decoctum mitius.

Dies ist die ächte Vorschrift zum Dekokt des Zittmann. Nachdem vorher eine Abführung genommen worden, trinkt der Kranke am andern Tage im Bett ein Pfund des gewärmten stärkern Dekokts, und wartet die (schweißtreibende und abführende) Wirkung im Bett ab. Nachmittags werden drey Pfund des schwachen und vor dem Schlafengehen wiederum ein Pfund des starken Dekokts, beide nicht gewärmt, getrunken. Auf diese Weise wird die oben angegebene Quantität verbraucht; auch, nach Umständen, das Verfahren wiederholt. Der Kranke genießt nur dünne Suppen, etwas mageres, gebratenes Fleisch, Weißbrod mit frischer Butter. Die erfolgenden häufigen Stuhlgänge sind nicht zu fürchten. (Das Zittmann'sche Dekokt wird neuerdings wiederum sehr häufig angewendet, und mag unter gewissen Umständen allerdings sehr heilsam wirken. Doch mußte ich in mehreren Fällen bald von seinem Gebrauche abstehen, weil es ungemein heftig purgir-

te, und starke Kardialgien und Koliken bewirkte.)

Rec. Radicis sarsaparillae, ℥iij.

Corticis mezerei, ℥ij.

Coque ex aqu. font. libr. iij ad colat.
libr. ij.

Sub finem coctionis adde:

Radicis glycyrrhizae, ℥j.

S. Dreymal täglich, auch wol viermal, ein halbes Pfund. (S w e d i a u r.)

(Gegen veraltete Syphilis, Knochenleiden, chronische Exantheme und Hautkrankheiten.)

Rec. Corticis mezerei,

Stipitum dulcamarae, singul. ℥i℔.

Radicis sarsaparillae,

— *bardanae, singul. ℥j.*

Coque ex aquae libr. iij ad remanent.
libr. ij.

Cola. S. Den Tag über zu verbrauchen.
(W e i k a r d.)

Rec. Corticis mezerei, ℥j — ij.

Radicis althaeae,

— *glycyrrhizae, singul. ℥i℔.*

Coque ex aqu. font. libr. v ad reman.
libr. ij.

Cola. S. Anfänglich täglich ein halbes Pfund, auf drey Portionen vertheilt, zu verbrauchen.
(B e r e n d s.)

*Rec. Corticis interioris ramulorum ac
arboris junioris ulmi campe-
stris, ℥iv.*

Aquae, libr. iv.

Coque ad remanent. libr. ij.

Col. S. Zwey- bis dreymal täglich vier
bis acht Unzen zu trinken.

(Swediaur.)

Auflösende Mittel.

Rec. Taraxaci totius, ℥iv.

Florum chamomillae, ℥ij.

*Coque ex aquae font. libr. iv ad colat.
libr. ij.*

Sub finem coctionis adde

Corticum aurantiorum,

Seminis foeniculi, singul. ℥ß.

Colaturae admisce

Kali tartarici, ℥j.

Mellis depurati, ℥ij.

M. S. In zwey Tagen tassenweise zu
verbrauchen. (Berends.)

Rec. Herbae recentis cichorei, ℥ij.

*Coque per quartam horae partem ex
Aquae fontanae, libr. ij.*

Adde

Mellis crudi, ℥j.

S. Zum Getränk. (Richard.)

Rec. Radicis helenii, ℥j.

Summitatum hyssopi,

Foliorum hederæ terrestris, singul. ʒij.

Mellis depurati, ʒj.

Coque ex aquæ font. libr. iv ad colat. libr. iij.

S. Täglich ein bis zwey Pfunde zu verbrauchen. (Richard, bey chronischen Lungenkatarrhen.)

Erregende und stärkende Mittel.

Rec. Foliorum aurantii, ʒiβ.

Coque per horas duas vel tres in vase clauso ex

Aquæ pluvialis, libr. ij.

Colaturæ adde

Vini rubri nobilioris, ʒx.

Sacchari, q. s. ad grat. sapor.

S. Zwey- bis viermal täglich ein Weinglas voll. (de Haen.)

Rec. Foliorum aurantii, ʒiβ.

Infund. aqu. fervid. libr. ij. Digere in vase clauso per xij horas. Colaturæ decanthatæ adde

Vini rhenani nobilioris, ʒxij.

Syrupi corticum aurantium, ʒiij.

M. S. Zum Getränk, weingläserweise. (Berends.)

Rec. Foliorum aurantii, ʒj.

Corticum aurantium, ʒβ.

— *cinnamomi acuti, ʒiij.*

Digere ex aquæ fervid. libr. ij per vj horas.

Colaturae adde

Vini gallici albi optimi, ℥x.

*Sacchari albi, q. s. ad gratum
saporem.*

S. Weingläserweise zum Getränk.

Rec. Summitatum centaurei minoris, ℥℔.

Infunde cum

Aquae fervidae, libr. ij.

Colaturae adde

Syrupi corticum aurantium, ℥ij.

S. Tassenweise zu trinken.

Rec. Strobulorum lupuli,

Summitatum chamaedris,

— *chamaepitis, singul.
℥ij.*

Coque per breve tempus ex

Aquae fontanae, libr. ij.

Adde

Tincturae gentianae,

Syrupi cichorei, singul. ℥j.

M. S. Tassenweise zu trinken.

(Richard.)

Rec. Radicis gentianae rubrae, ℥℔.

Coque per dimidiam horam ex

Aquae fontanae, libr. ij.

Colaturam adhuc fervidam infunde cum

Summitatum centaurei minoris,

— *absinthii,*

*Radicis calami aromatici, singul.
℥ij.*

Cola. S. Vormittags zwey bis vier Glä-
ser voll. (Montmahou.)

Rec. Malthi hordei, ℥iij.

Coqu. ex aquae libr. iij ad rem. libr. ij.

Colaturae adde

Succi citri recentis, ℥ß.

Vini rhenani, ℥iv.

Sacchari albi, q. s. ad gratiam.

S. Tassenweise zu verbrauchen. (Berends nach Macbride, gegen Skorbut.)

Rec. Succi pomorum maturorum aurantii, ℥iij.

Succi citri recentis, ℥ß.

Aquae fontanae, libr. iß.

Vini rubri optimi, ℥vj.

Sacchari albi, q. s. ad gratiam.

M. S. Zum Getränk. (Berends, gegen Skorbut.)

Rec. Vitellorum ovi, numer. iv.

Sacchari albi, ℥iv.

Aquae fontanae, ℥xxiv.

Misce et adde

Spiritus sacchari (Rum), ℥ij.

M. S. Analeptisches Getränk, weingläserweise zu nehmen. (Berends, empfiehlt es gegen Polycholie.)

Rec. Radicis symphyti officinalis,

— bistortae, singul. ℥j.

Aquae fontanae, libr. ij.

Coque per horam et adde colaturae

Syrupi cinnamomi, ℥iß.

M. S. Theetassenweise. (Montmahou, gegen atonische Schleim- u. Blutflüsse.)

Rec. Foliorum uvae ursi, ʒiʒ.

Summitatum millefolii, ʒj.

*Coque ex aqu. font. libr. iij ad reman.
libr. ij.*

Sub finem coctionis adde

Radici glycyrrhizae, ʒj.

Colaturae admisce

Syrupi cinnamomi, ʒij.

M. S. In zwey Tagen zu verbrauchen.
(Diese Tisane habe ich gegen asthenische Schleimflüsse und Blutflüsse, besonders aus der Brust und aus den Harnwerkzeugen, oft mit Nutzen angewendet.)

Rec. Radicis ratanhiaë, ʒʒ.

*Coque ex aquae communis libr. iiʒ ad
reman. libr. ij.*

Adde

Mellis rosati, ʒij.

M. S. Tassenweise zu trinken. (Montmahou, bey Metrorrhagieen.)

Rec. Ligni campechiensis, ʒiʒ.

*Coque ex aqu. font. libr. iij ad reman.
libr. ij.*

*Colaturam adhuc fervidam infunde cum
Corticum aurantiorum, ʒʒ.*

Adde

Acidi phosphorici puri, ʒij.

Syrupi cinnamomi, ʒij.

M. S. Drey- bis viermal täglich einen Tassenkopf voll. (Hat mir oft in asthe-

nischen Metrorrhagien gute Dienste geleistet.)

Emulsionen (*emulsiones*) u. Öl- oder Harzmixturen (*emulsiones spuriae*).

Schwächende, temperirende, erschlaffende, einhüllende Mittel.

Rec. Amygdalarum dulcium, cortice liberatarum, ℥j.

Aquae fontanae, ℥vj.

Conterantur exactissime, aquam sensim affundendo.

In colatura solve

Kali nitrici, ℥iij.

Syrupi althaeae, ℥ij.

M. S. Gut umgeschüttelt, zweystündlich einen Eßlöffel voll. (Berends.)

Rec. Olei amygdalarum recentis, ℥j.

Gummi mimosae, q. s.

Aquae fontanae, ℥vj.

Kali tartarici, ℥ß.

Sacchari albi, ℥vj.

F. l. a. mixtur. Signa. Umgeschüttelt, zweystündlich einen Eßlöffel voll.

(Berends.)

Rec. Olei lini recentis, ℥iß.

Vitellorum ovi, q. s.

Aquae fontanae, ℥v.

Syrupi althaeae, ℥iß.

F. l. a. mixtur. Signa. Umgeschüttelt, zweystündlich einen Eßlöffel. (Berends, bey Gallen- und Harnsteinen.)

Rec. Cerae flavae, ℥ij — ℥℔.

In mortario calefacto adde

Mucilaginis gummi mimosae calefacti, ℥j.

Aquae fervidae, ℥iij.

Syrupi althaeae, ℥j.

M. S. Gut umgeschüttelt, zweystündlich einen Eßlöffel voll.

Rec. Cerae flavae, ℥i℔.

Saponis medicati, ℥j.

Liquescant leni igne, assidue agitando. Effunde massam in mortar. lapid. et paullat. admisce:

Aquae aromaticae, ℥j.

— destillatae simpl., ℥vij.

Sacchari albi, ℥iij.

M. S. Umgeschüttelt, zweystündlich einen Eßlöffel voll. (Monro.)

Rec. Lycopodii, ℥ij — ℥vj.

Gummi arabici, ℥iij.

Sacchari albi, ℥vj.

Sensim adde

Aquae destillatae simplicis, ℥v.

M. S. Umgeschüttelt, zweystündlich einen Eßlöffel voll.

Rec. Spermatidis ceti s. cetacei, ℥vj.

Gummi mimosae, ℥iij.

Sacchari albi, ℥j.

Conterantur exactissime; adde

Aquae destillatae simplicis, ℥iv.

M. S. Gut umgeschüttelt, zweystündlich einen Eßlöffel voll. (Hufeland.)

Abführende Mittel.

Rec. Olei amygdalarum s. papaveris recentis, ℥iß.

Gummi mimosae, q. s.

Aquae fontanae, ℥viij.

F. l. a. mixtura. Solve

Magnesiae sulphuricae, ℥iß.

M. S. Zweystündlich einen mäßigen Tassenkopf voll bis zur Wirkung.

(Berends.)

Rec. Olei ricini, ℥ij.

Gummi mimosae, q. s.

Aquae fontanae, ℥iv.

Syrupi mannati, ℥iß.

F. l. a. mixtura. S. Zweystündlich einen bis zwey Eßlöffel voll.

Rec. Olei crotonis, guttulas tres (gutt. iij).

— amygdalarum recentis, ℥j.

Gummi mimosae, q. s.

Aquae foeniculi, ℥v.

Sacchari albi, ℥j.

M. S. Gut umgeschüttelt, zweystündlich einen Eßlöffel voll bis zur Wirkung. (Ich habe bemerkt, daß das Krotonöl in dieser Form am wenigsten Beschwerden erregt.)

*Rec. Resinae jalappae, gr. xv.
Olei amygdalarum, ℥j.*

*Solve leni calore, adde
Gummi mimosae, ℥v.
Aquae fontanae, ℥v.
Sacchari albi, ℥℔.*

F. l. a. mixtura. Sign. Umgeschüttelt,
zweystündlich einen Eßlöffel bis zur
Wirkung.

*Rec. Olei lini recentis, ℥ij.
Gummi mimosae, q. s.
Aquae chamomillae, ℥v.*

*Fiat l. a. mixtur. Adde
Magnesiae sulphuricae, ℥j.
Succi citri recentis, ℥vj.
Extracti opii aquosi, grana duo
(gr. ij).*

Syrupi rhoeados, ℥j.

M. S. Umgeschüttelt, alle Viertelstunden einen Eßlöffel voll bis zur Wirkung.
(Richter, gegen hartnäckige Stuhlverhaltung, bey eingeklemmten Brüchen.)

Erregende und reizende Mittel.

*Rec. Asae foetidae, ℥℔.
Vitellorum ovi, q. s.
Aquae chamomillae, ℥v.
Syrupi senegae, ℥j.*

Fiat l. a. mixtura. S. Umgeschüttelt,
zweystündlich einen Eßlöffel voll.

*Rec. Ammoniacy, ℥℔.
Vitellorum ovi, q. s.*

Aquae hyssopi, ℥iv.

Oxymellis squillitici, ℥j.

Fiat l. a. mixtura. S. Umgeschüttelt, zweystündlich einen Eßlöffel voll. (Lentin, gegen Verschleimung und beginnende Lähmung der Lungen.)

Rec. Ammoniacy, ℥j.

Vitellorum ovi, numer. j.

Oxymellis squillitici,

Misce et adde

Tartari natronati, ℥ij.

Aquae foeniculi, ℥vj.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll. (Vogel.)

Rec. Ammoniacy, ℥ij.

Vitellorum ovi, q. s.

Aquae foeniculi, ℥v.

Liquoris ammonii anisati, ℥iij.

Vini stibiati, ℥ij.

Syrupi althaeae, ℥iβ.

Fiat l. a. mixtura. S. Umgeschüttelt, zweystündlich einen Eßlöffel. (Berends, gegen Atonie der Lungen, stockenden Auswurf, Asthma, beginnenden Steckfluß.)

Rec. Aceti squillitici, ℥ij.

Satura cum kali carbonici depurati, q. s.

Adde

Olei amygdalarum recentis, ℥j.

Vitellor. ovi, q. s.

Kali nitrici, ℥iβ.

Aquae cerasorum nigrorum, ℥iv.
Syrupi althaeae, ℥ß.

M. S. Halbstündlich einen Eßlöffel voll.
 (K ä m p f.)

Rec. Asae foetidae, ℥iß.

Tere cum

Liquoris ammonii acetici, ℥j.

Adde

Aquae foeniculi, ℥v.

Liquoris ammonii anisati, ℥ij.

Syrupi althaeae, ℥j.

M. S. Gut umgeschüttelt, zwey - bis
 dreystündlich einen Eßlöffel.

Rec. Resinae guajaci nativae, ℥ij.

Gummi mimosae, ℥iij.

Aquae destillatae simpl., ℥vij.

Mellaginis dulcamarae, ℥iij.

Syrupi althaeae, ℥j.

M. S. Dreystündlich einen Eßlöffel voll.
 (B e r e n d s, gegen chronischen Rheuma-
 tismus.)

Rec. Resinae guajaci nativae, ℥j.

Gummi mimosae, q. s.

Aquae foeniculi, ℥vj.

Syrupi amygdalarum, ℥ß.

Spiritus nitrico-aetherei, gtt. xx.

M. S. Dreymal täglich zwey Eßlöffel
 voll. (H u f e l a n d, gegen aton. Gicht.)

Rec. Balsami copaivae, ℥j.

Olei amygdalarum, ℥iij.

Magnesia carbonicae, ℥ß.

Gummi mimosae, q. s.

Aquae cerasorum nigrorum, ℥viiij.
Syrupi senegae, ℥vj.

F. l. a. mixtur. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.

Rec. Terebinthinae laricinae, ℥ß.
Vitelli ovi, numer. j.

Aquae cerasorum nigrorum, ℥vj.
Syrupi diacodion, ℥vj.

F. l. a. mixtur. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll. (Selle.)

Rec. Olei amygdalarum recentis, ℥j.
Balsami indici nigri, gtt. xxx.
Mucilaginis gummi mimosae, ℥ß.
Syrupi althaeae, ℥j.
Aquae foeniculi, ℥iv.
 — *petroselini*, ℥viiij.

M. S. Gut umgeschüttelt, halbstündlich einen Eßlöffel voll. (Kämpf, gegen Nephralgie.)

Rec. Mastiches,
Pulveris gummosi, singul. ℥ij.
Ipecacuanhae, gr. ij.
Aquae destillatae simplicis, ℥iv.
Acidi sulphurici deluti, ℥j.

M. S. Umgeschüttelt, zweystündlich einen Eßlöffel. (Vogler, gegen Nachtripper.)

Rec. Camphorae, ℥ij.
Gummi mimosae, q. s.
Succi unius fructus citri,
Vini rhenani optimi, singul. ℥xij.
 M.

M. S. Stündlich einen Eßlöffel. (P. Frank. Die Dosis des Kamphers ist ungeheuer!)

Rec. Camphorae, grana sex ad duodecim (gr. vj — xij).

Olei amygdalarum recentis, ℥ß.

Vitellorum ovi, q. s.

Aquae destillatae simplicis, ℥v.

Syrupi florum aurantii, ℥ß.

M. S. Umgeschüttelt, stündlich oder zweystündlich einen Eßlöffel. (Ich wende den Kampher selten anders, als in dieser Form, an, weil es mir scheint, als ob er, mit Eygelb abgerieben, leichter aufgenommen und schneller im Organismus verbreitet werde.)

Rec. Camphorae, gr. xij.

Gummi mimosae, q. s.

Aquae menthae crispae, ℥vj.

Aceti vini crudi, ℥ß.

Sacchari albi, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.
(Berends.)

Rec. Olei ricini, ℥j.

Mucilaginis gummi mimosae, q. s.

Aquae menthae piperitae, ℥iv.

Tincturae sennae, ℥j.

— *opii crocatae, gtt. xij.*

M. S. Alle vier Stunden den vierten Theil zu nehmen. (Stevenson, gegen nicht entzündliche Nephralgie und Bleykolik.)

*Rec. Phosphori, grana duo (gr. ij).
Olei hyoscyami infusi, ℥℔.*

Solve et adde

Gummi mimosae, q. s.

Extracti chamomill., ℥iij.

Aquae menthae piperitae, ℥iv.

M. S. Gut umgeschüttelt vierstündlich einen Eßlöffel. (Handel. Die Gabe des Phosphors ist zu groß.)

Rec. Cantharidum siccatorum, scrupulum unum (℥j).

Amygdalarum dulcium excorticatarum, ℥vj.

Contundantur exactissime, adde

Aquae calcis ustae, ℥x.

Sacchari albi, ℥j.

Cola sine expressione. S. Zwey- bis dreystündlich einen halben Eßlöffel. (Beren ds, gegen pituitöse Nephralgie und Verschleimung der Harnwerkzeuge.)

Rec. Amygdalarum amararum, ℥iij.

Aquae communis, ℥iij.

Fiat l. a. emulsio, adde

Extracti centaurii minoris, ℥ij.

Solv. S. Eine Stunde vor dem Anfall des Wechselfiebers in zwey Portionen zu nehmen. (Hufeland.)

Pulvermixturen (*mixturae cum pulvere.*)

Rec. Magnesia carbonicae, ℥j.
Aquae menthae crispae, ℥iij.
Syrupi corticum aurantium, ℥ß.

M. S. Gut umgeschüttelt, zweystündlich einen Eßlöffel. (Berends, gegen Sodbrennen.)

Rec. Lapidum cancrorum praeparatorum,

Saponis medicati, singul. ℥ij.

Aquae menthae crispae,

— *foeniculi, singul. ℥iij.*

Syrupi althaeae, ℥ß.

M. S. Gut umgeschüttelt, stündlich einen Eßlöffel voll. (Boerhave.)

Brechmittel.

Rec. Pulveris radices ipecacuanhae,
℥j — ℥ij.

Aquae melissae, ℥ij.

Aetheris acetici, gtt. viij.

M. S. Gut umgeschüttelt, alle zehn Minuten einen Eßlöffel, bis zur Wirkung. (Berends.)

Rec. Tartari stibiati, gr. ij.

Pulveris radices ipecacuanhae, ℥ß.

Aquae destillatae simpl., ℥ij.

M. S. Gut umgeschüttelt, wie das Vorige. (Berends.)

Abführende Mittel.

Rec. Electuarii lenitivi s. e senna,
 ℥vj — ℥x.

Acidi tartarici, ℥ij.

Aquae florum aurantii, ℥ij.

Aetheris acetici, ℥℔.

M. S. Umgeschüttelt, zweystündlich einen Eßlöffel bis zur Wirkung.

(Heim.)

Rec. Magnesiae sulphuricae,
Pulveris radices jalappae, singul.
 gr. xv — xx.

*Maraschino *),*

Syrupi succi citri, singul. ℥ij.

Aquae cinnamomi, ℥℔.

M. S. Auf einmal zu nehmen.

(Heim.)

Rec. Tartari depurati, ℥ij.
Pulveris radices jalappae, ℥℔.
Aquae foeniculi, ℥iij.
Succi sambuci inspissati, ℥vj.

M. S. Umgeschüttelt, zweystündlich einen Eßlöffel. (Für Unbemittelte.)

Auflösende Mittel.

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci,
 gr. xij.

Succi glycyrrhizae inspissati, ℥ij.

Aquae foeniculi, ℥v.

Syrupi althaeae, ℥j.

*) Der bekannte, aus Italien gebrachte Liqueur.

M. S. Gut umgeschüttelt, zweystündlich einen Eßlöffel voll. (Berends.)

Rec. Sulphuris stibiati rubei, gr. ij.

Gummi tragacanthae, gr. xij.

Aquae hyssopi, ℥iv.

Syrupi althaeae, ℥j.

M. S. Zwey- oder dreystündlich einen Eßlöffel voll. (Montmahou.)

Rec. Kali tartarici, ℥ß.

Aquae menthae crispae, ℥v.

Sulphuris praecipitati, ℥iß.

Syrupi althaeae, ℥j.

M. S. Umgeschüttelt, zweystündlich einen Eßlöffel voll. (Berends.)

Rec. Sulphuris depurati, ℥ij.

Aquae destillatae simplicis, ℥iv.

Tincturae opii simplicis, gtt. xx.

M. S. Gut umgeschüttelt, dreymal täglich einen Eßlöffel voll. (Dzondi, gegen Merkurialkrankheit.)

Erregende Mittel.

Rec. Moschi genuini, gr. vj — xxiv.

Gummi mimosae, ℥j.

Tere exactissime et adde sensim

Aquae melissae, ℥ij.

Syrupi florum aurantii, ℥j.

Aetheris acetici, ℥ß.

M. S. Stündlich oder zweystündlich, gut umgeschüttelt, einen Eßlöffel voll. (Ich habe wahrgenommen, daß der Moschus, in dieser Formel angewendet, besonders

wenn man sich seiner als eines analeptischen Mittels, bey sinkenden Kräften, während einer mühsamen Krise, bedient, schneller wirkt.)

Rec. Pulveris radidis valerianae minoris, ℥vj.

Aquae menthae crispae, ℥iij.

Spiritus nitrico-aetherei, ℥j.

M. S. Gut umgeschüttelt, viermal täglich einen Eßlöffel. (Nach Kreysig, gegen Krampfsucht des Herzens.)

Stärkende und tonische Mittel.

Rec. Pulveris cubebae, ℥j.

Tincturae corticis peruviani, ℥℔.

Aquae destillatae simplicis, ℥iv.

Syrupi opii, ℥j.

M. S. Morgens und Abends zwey Eßlöffel voll. (Montmahou.)

Rec. Corticis peruviani regii, ℥i℔.

Coque ex aquae ℥xx ad colat. ℥xij.

Adde

Pulveris corticis peruviani regii, ℥℔.

Tincturae corticis peruviani, ℥j — ij.

Syrupi corticum aurantiorum, ℥i℔.

M. S. Gut umgeschüttelt, in der Apyrexie stündlich oder zweystündlich einen, auch zwey Eßlöffel voll. (Berends,

gegen bösertige komitirte oder verlarvte
Wechselfieber.)

Rec. Ferri sulphurici crystallini, gr.xij.

Kali carbonici, ʒß.

Myrrhae, ʒj.

Aquae aromaticae, ʒvj.

Syrupi simplicis, ʒß.

M. S. Auf viermal zu nehmen.

(Griffith.)

Auflösungen (*solutiones*), Tränke (*po-
tiones*), Tränkchen (*haustus*).

Schwächende und temperirende
Mittel.

Rec. Kali nitrici, ʒiß — ʒiij.

Gummi mimosae, ʒij.

Aquae destillatae simplicis, ʒv.

Syrupi althaeae, ʒiß.

(*Vini stibiati, ʒj — ij*).

Solv. S. Zweystündlich einen Eßlöffel
voll. (Berends.)

Rec. Kali sulphurici, ʒß — ʒvj.

Aquae fervidae, ʒviij.

Extracti graminis liquidi, ʒj.

Solv. S. Zweystündlich einen Eßlöffel
voll. (v. Siebold.)

Rec. Kali tartarici, ʒij — ʒvj.

Aquae fontanae, ʒv.

Mellaginis graminis, ʒiß.

Solv. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll. (Berends.)

*Rec. Kali carbonici depurati, ℥j — ℥ij.
sutura succ. citr. rec. express. q. s.*

Adde

Aquae melissae, ℥ij — iv.

(Syrupi althaeae, ℥j.)

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll. (Berends.)

Rec. Kali carbonici depurati, ℥j — ℥ij.

Aceti crudi q. s. ad saturationem,

Aquae destillatae simpl., ℥ij — ℥iv.

M. S. Stündlich oder zweystündlich einen bis zwey Eßlöffel. (Boerhave's *liquor digestivus*.)

Rec. Ammonii carbonici sicci, ℥j — ℥ij.

Acidi nitrici puri, q. s. ad perfect. saturat.

Aquae destillatae simpl., ℥iij — v.

Syrupi althaeae, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll. (Berends.)

(Er empfahl das salpetersaure Ammonium als ein feines schwächendes und temperirendes Mittel in Reizfiebern, exanthematischen, rheumatischen, leicht entzündlichen Fiebern, auch in erethistischen Wassersuchten.)

Brechenenerregende Mittel.

Rec. Tartari stibiati, gr. ij — iv.

Aquae chamomillae, ℥ij.

Oxymellis simplicis, ℥℔.

Solv. S. Alle 10 Minuten einen Eßlöffel bis zur Wirkung. (Berends.)

Rec. Emetinae purae, gr. j (granum unum).

Solve in pauxillo acidi nitrici, adde

Aquae florum tiliae, ℥iij.

Syrupi althaeae, ℥j.

M. S. Viertelstündlich einen Eßlöffel bis zur Wirkung. (Magendie.)

Rec. Zinci sulphurici crystallini,

℥j — ℥℔.

Aquae destillatae simplicis, ℥ij.

Solv. S. Alle zehn Minuten einen Eßlöffel bis zur Wirkung. (Berends.)

Rec. Cupri sulphurici crystallini,

grana decem (gr. x).

Aquae chamomillae, ℥iij.

Aetheris sulphurici, gtt. viij.

Solv. S. Wie das Vorige.

Abführende Mittel.

Rec. Mannae, ℥j — ℥ij.

Tartari natronati, ℥℔ — ℥vj.

Aquae foeniculi, ℥iv.

Syrupi corticum aurantiorum, ℥j.

Solv. S. Die Hälfte auf einmal, dann alle zwey Stunden einen Eßlöffel bis zur Wirkung. (Berends.)

Rec. Mannae, ℥j.

Aquae foeniculi, ℥ij.

Solve leni calore, adde

Liquoris ammonii anisati, ℥℔.

M. S. Stündlich einen Eßlöffel voll.

(Stark.)

Rec. Magnesiae sulphuricae,

Tincturae rhei aquosae, sing. ℥j.

Aquae melissae, ℥ij.

Solv. S. Zweymal täglich zwey Eßlöffel voll.

(Hildebrand.)

Rec. Aloës lucidae, gr. vj.

Natri sulphurici, ℥j.

Extracti hyoscyami, gr. ij.

Aquae foeniculi, ℥viij.

Solv. S. Zwey- bis viermal täglich einen Eßlöffel voll.

(v. Gräfe.)

Rec. Tincturae rhei aquosae,

Liquoris kali acetici, singul. ℥j.

Aquae menthae, ℥iv.

Sacchari albi, ℥℔.

M. S. Viermal täglich einen Eßlöffel voll.

Diuretische Mittel.

Rec. Tartari boraxati, ℥ij.

Boracis, ℥j.

Extracti trifolii fibrini, ℥ij.

Aquae menthae crispae, ℥vj.

Syrupi corticum aurantiorum, ℥j.

Solv. S. Zwey- oder dreystündlich zwey oder einen Eßlöffel.

(Lentin.)

Rec. Tartari boraxati, ℥ij — ℥vj.

Aquae petroselini, ℥viii.

Oxymellis scillitici, ℥j.

Spiritus muriatico-aetherei, ℥ij.

Solv. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll. (Berends.)

Rec. Liquoris kali acetici, ℥℔.

Spiritus nitrico-aetherei, ℥ij.

Oxymellis colchici, ℥v.

M. S. Zweystündlich einen mäfsigen Eßlöffel. (Kämpf.)

Rec. Infusi florum sambuci, ℥iv.

Oxymellis scillitici, ℥ij.

Liquoris kali acetici, ℥℔.

M. S. Drey mal täglich einen Eßlöffel. (Nicolai.)

Rec. Extracti scillae, gr. xvj.

Liquoris kali acetici, ℥℔.

Aquae petroselini, ℥iv.

Syrupi rhei, ℥j.

Solv. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll. (Quarin.)

Rec. Tincturae cantharidum, ℥℔ — ℥j.

Tartari boraxati, ℥j.

Aquae petroselini, ℥viii.

Syrupi althaeae, ℥ij.

Solv. S. Stündlich einen Eßlöffel. (Burdach.)

Rec. Aceti scillitici, ℥vj.

Ammonii carbonici sicci, q. s. ad saturationem.

Aquae juniperi, ℥iv.

Tincturae calami, ℥ij.

Syrupi corticum aurantiorum, ℥j.

M. S. Dreystündlich einen Eßlöffel voll.
(Berends.)

Diaphoretische Mittel.

Rec. Liquoris ammonii acetici, ℥℔.

Aquae florum sambuci, ℥iiij.

Vini stibiat, ℥ij.

Oxymellis simplicis, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.
(Berends.)

Rec. Tincturae guajaci ammoniatae,
℥ij — ℥iiij.

Aquae florum sambuci, ℥iv.

Succi sambuci inspissati, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.

Rec. Extracti cardui benedicti,
℥ij — ℥℔.

Liquoris ammonii acetici, ℥℔.

Aquae foeniculi, ℥v.

Solv. S. Zweystündlich einen Eßlöffel
voll. (Berends.)

Rec. Mixturae pyro-tartaricae,
℥ij — ℥℔.

Aquae florum sambuci, ℥iv.

Syrupi althaeae, ℥ii℔.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.
(Ungnad.)

Rec. Ammonii carbonici pyro-oleosi,
℥ij.

Aquae sambuci, ℥vj.

Adde

Aceti camphorati, q. s. ad saturationem.

Succi sambuci inspissati, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel.
(Consbruch.)

Auflösende Mittel.

Rec. Kali tartarici, ℥℔ — ℥j.

Extracti taraxaci liquidi, ℥j — ℥ij.

— *gratiolae, ℥j — ℥iij.*

Aquae foliorum laurocerasi, ℥℔.

— *menthae crispae, ℥v.*

Vini stibiati, ℥ij.

Solv. S. Zwey- oder dreystündlich einen Eßlöffel voll. (Ich habe diese Verbindung in hartnäckigen Abdominalstockungen, besonders in sogenannten materiellen Melancholien, nicht selten mit grossem Nutzen angewendet.)

Rec. Kali carbonici depurati, ℥j — ℥i℔.

Aquae menthae crispae, ℥v.

Syrupi corticum aurantiorum, ℥i℔.

Solv. M. S. Zwey- oder dreystündlich einen Eßlöffel voll. (Nicht nur als säuretilgendes und auflösendes, sondern auch als krampfstillendes Mittel hat mir obige Mischung oft gute Dienste geleistet.)

Rec. Natri carbonici aciduli, ℥ij — ℥iij.

Aquae menthae piperitae,

— *destillatae simpl., sing. ℥ij.*

Extracti corticum aurantiorum, ʒiß.

Solv. S. Dreymal täglich einen Eßlöffel voll. (Hufeland, gegen den Kropf.)

Rec. Fellis tauri recentis, ʒß.

Aquae cinnamomi, ʒiiiß.

M. S. In getheilten Gaben den Tag über zu verbrauchen. (Reil.)

Rec. Extracti marrubii albi, ʒij.

— *dulcamarae,* ʒiß.

Aquae foeniculi, ʒv.

Liquoris ammonii anisati, ʒij.

Syrupi althaeae, ʒiß.

Solv. M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel. (Berends.)

Rec. Extracti chelidonii, ʒij.

Aquae menthae crispae, ʒvj.

Spiritus muriatico-aetherei, ʒij.

Syrupi mannati, ʒj.

Solv. S. Viermal täglich einen Eßlöffel voll.

Rec. Extracti myrrhae aquosi, ʒij.

Succi glycyrrhizae inspissati, ʒj.

Aquae hyssopi, ʒviij.

Oxymellis squillitici,

Syrupi althaeae, singul. ʒvj.

Solv. S. Zweystündlich zwey Eßlöffel. (Vogel.)

Umstimmende, narkotische und
metallische Mittel.

Rec. Gummi mimosae, ℥ij.

Solve in

Aquae destillatae simplicis, ℥iij.

— *florum aurantii, ℥j.*

Adde

Tincturae opii crocatae, ℥ß—℥j.

Aetheris acetici, ℥ß.

Syrupi simplicis, ℥j.

M. S. Zweystündlich, oder auch stündlich einen Eßlöffel voll. (Berends, analeptisches Mittel.)

Rec. Tincturae opii simplicis, gtt. xx.

Spiritus nitrico-aetherei, ℥j.

Aquae florum aurantii, ℥vj.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel. (Formey, gegen Nachwehen.)

Rec. Kali carbonici depurati, ℥iij.

Aquae florum chamomillae,

— *cinnamomi simplicis, singul. ℥iv.*

Syrupi papaveris albi, ℥j.

Solv. S. Alle halbe bis ganze Stunden abwechselnd mit dem Folgenden einen Eßlöffel voll zu geben.

Rec. Tincturae opii simplicis, ℥iij.

S. Abwechselnd mit obiger Mixtur alle halbe bis ganze Stunden fünf bis funfzehn Tropfen. (Stütz, gegen den Wundstarrkrampf.)

*Rec. Extracti nucis vomicae aquosi, ʒß.
 Mucilaginis gummi arabici, ʒß.
 Aquae menthae crispae, ʒvj.
 Syrupi althaeae, ʒj.*

Solv. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll. (Hufeland, gegen Ruhr.)

*Rec. Extracti conii maculati,
 — hyoscyami, singul. scrupulos duos (ʒij).
 Mucilaginis gummi mimosae, ʒij.
 Liquoris ammonii acetici, ʒj.
 Aquae destillatae simplicis, ʒiv.
 Vini ipecacuanhae, ʒj.
 Syrupi rhoeados, ʒß.*

Solv. S. Dreymal täglich einen Eßlöffel. (Paris, gegen Lungenschwindsucht.)

Rec. Cupri carbonici (ex solutione cupri sulphurici ope kali carbonici praecipitati), gr. xliij.

Solve in

Acidi muriatici puri, q. s.

Adde

*Ammonii muriatici depurati,
 ʒixß, gr. vj.*

Aquae destillatae simpl., q. s.

ut fiant liquoris unciae sex. Signa.

Kupfersalmiakliquor. Zum Gebrauch werden sechs Drachmen dieses Liquors mit zwanzig Unzen Wasser verdünnt, u. davon täglich ein- oder zweymal ein ganzer oder halber Eßlöffel ge-

geben. (Beisser, gegen eingewurzelte Syphilis, chronische Krampfkrankheiten.)

Rec. Arsenici albi,
Kali carbonici depurati, singul.
grana sexaginta quatuor
(gr. Lxiv).

Coque ad solutionem usque cum
Aquae destillatae simplicis, un-
ciis sex (℥vj).

Filtra caute et adde
Spiritus lavandulae, ℥℔.

Aquae destillatae, q. s.

ad librae unius pondus. S. Fow-
ler's Arseniksolution. Die Gabe ist vier
bis acht Tropfen.

Rec. Arsenici albi,
Natri carbonici depurati, singul.
drachmam dimidiam (℥℔).

Coque cum
Aquae destillatae, unciis sex
(℥vj).

Solutioni filtratae adde
Aquae cinnamomi simplicis, q. s.
ut pondus totius liquoris sit unc.
octo (℥viij). S. Harlefs's Arsenik-
solution. Gabe sechs bis zwölf Tro-
pfen.

Reizende Mittel.

Rec. Liquoris ammonii caustici, ℥j.
Aquae chamomillae, ℥iv.
Syrupi althaeae, ℥℔.

M. S. Stündlich einen Eßlöffel voll.
(Burdach.)

Rec. Tincturae colocynthis, guttu-
las sex vel duodecim
(gtt. vj — xij).

Aquae cinnamomi simplicis,
— *menthae crispae, sing. ℥iij.*

Spiritus muriatico-aetherei, ℥j.

M. S. Zwey- oder dreystündlich einen
Eßlöffel voll. (Berends, gegen Tor-
por des Darmkanals, gegen Lähmungen.)

Erregende Mittel.

Rec. Natri carbonici aciduli, ℥j — ℥iij.
Aquae destillatae simplicis, ℥iv.

Solv. S. Nro. I. Eßlöffelweise.

Rec. Succu citri recens expressi, ℥ij.
Syrupi simplicis, ℥j.

M. S. Nro. II. Stündlich oder zwey-
stündlich einen reichlichen Theelöffel
voll mit einem Eßlöffel von Nr. I. unter
dem Aufbrausen zu nehmen. (Rivière's
Brausetränkchen, von Berends verbes-
sert.)

Rec. Aceti concentrati, ℥ij — ℥iij.
Aquae rubi idaei, ℥v.
Syrupi rubi idaei, ℥ij.
Aetheris acetici, ℥ß.

M. S. Stündlich oder zweystündlich ei-
nen Eßlöffel voll. (In erethistischen
Nervenfiebern habe ich diese Verbindung
oft mit Nutzen gegeben.)

Rec. Ammonii carbonici pyro-oleosi,
 ℥℥.

Succi citri recentis, ℥iij.

Tincturae croci,

Spiritus lavandulae compositi,
singul. ℥j.

Syrupi corticum aurantiorum.

M. S. Tränkchen, auf zweymal zu nehmen.
 (Weikard.)

Rec. Fuliginis splendidi, ℥j.

Asae foetidae, ℥℥.

Spiritus vini gallici, ℥xviij.

Digere per tres dies. S. Viermal täglich einen Thee- oder Eßlöffel zu nehmen.
 (Reil.)

Stärkende, tonische und adstringirende Mittel.

Rec. Extracti corticis peruviani frigide parati, ℥ij.

Gummi mimosae, ℥i℥.

Aquae destillatae simplicis, ℥iij.

— *cinnamomi,* ℥j.

Aetheris sulphurici, ℥℥.

Syrupi florum aurantii, ℥j.

Solv. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.
 (Berends.)

Rec. Extracti corticis peruviani frigide parati, ℥j.

Gummi mimosae, ℥ij.

Aquae destillatae, ℥iij.

Spiritus muriatico-aetherei, ʒß.
Syrupi corticum aurantiorum, ʒj.
Solv. S. Stündlich zwey Theelöffel voll.
 (Lentin, gegen brandige Aphthen.)

Rec. Extracti ligni quassiae, ʒij.
Vini hispanici, ʒvj.
Syrupi cinnamomi, ʒiß.
Solv. S. Viermal täglich einen Eßlöffel voll.
 (Berends.)

Rec. Extracti gentianae rubrae, ʒij.
Kali carbonici, ʒij.
Aquae menthae crispae, ʒv.
Tincturae corticum aurantiorum, ʒß.

Sacchari albi, ʒj.
Solv. S. Dreymal täglich einen Eßlöffel voll.
 (Berends.)

Rec. Extracti hellebori nigri, ʒj.
Ferri sulphurici crystallini, ʒß.
Tincturae amarae, ʒß.
Aquae menthae crispae, ʒiv.
Solv. S. Dreymal täglich einen Eßlöffel voll.
 (Ungnad.)

Rec. Extracti corticis peruviani, ʒij.
Aquae communis, ʒvj.
Syrupi balsamici, ʒij.
Aetheris sulphurici, ʒj.
Solv. S. Zweystündlich einen Eßlöffel.
 (Dubois.)

Rec. Extracti myrrhae aquosi, ʒj.
 — *gentianae*, ʒß.

Vini hispanici s. ungarici, ℥vj.

Tincturae aromaticae, ℥ij.

Solv. *M. S.* Drey mal täglich einen Eßlöffel voll. (Berends.)

Rec. Extracti gentianae, ℥℔.

— *nucum juglandis*, ℥ij.

Aquae menthae piperitae, ℥v.

Spiritus vini rectificati, ℥j.

Solv. *S.* Drey mal täglich einen Eßlöffel voll. (Für Unbemittelte.)

Rec. Acidi pyrolignosi, ℥j.

Aquae florum aurantii, ℥ij.

Syrupi amygdalarum, ℥j.

M. S. Stündlich einen halben Eßlöffel voll. (Pittschafft empfiehlt diese Mischung gegen die Magengrunderweichung, und läßt Gerstenabkochung, Zuckerwasser, Fenchelthee nachtrinken.)

Rec. Aluminis crudi, ℥℔.

Mucilaginis gummi mimosae, ℥iij.

Vini rhenani, ℥j.

Solv. *S.* Zweystündlich einen Theelöffel. (Herz, gegen asthenische Haemorrhagien.)

Rec. Aluminis crudi, ℥ij.

Tragacanthae,

Catechu, singul. ℥j.

Vini rhenani, ℥iv.

Aquae menthae piperitae, ℥viij.

Solv. *S.* Stündlich zwey Eßlöffel.

(Grashuis.)

Rec. Aluminis crudi, gr. xv.

Aquae menthae crispae, ℥iv.

Tincturae cinnamomi, ℥iij.

Syrupi papaveris albi, ℥j.

Solv. S. Viertel-, halbstündlich, oder alle Stunden einen Eßlöffel. (Rust, gegen Metrorrhagie.)

Rec. Aluminis crudi, ℥ij.

Tincturae cinnamomi,

Syrupi diacodion, singul. ℥j.

Aquae menthae piperitae, ℥ij.

Solv. S. Stündlich oder zweystündlich einen bis zwey Eßlöffel. (Plenk, gegen Metrorrhagie.)

Rec. Extracti ratanhia, ℥vj.

Aquae cinnamomi simplicis, ℥v.

Mixturae sulphurico-acidae, ℥iß.

Syrupi corticum aurantiorum, ℥iß.

Solv. S. Stündlich einen Eßlöffel voll. (Mit dieser Mischung stillte ich eine allen andern Mitteln widerstehende Stymatose.)

Tropfenmixturen (*guttae*).

Auflösende Mittel.

Rec. Extracti dulcamarae, ℥iß.

— *senegae, ℥j.*

— *conii, ℥ß.*

Vini stibiati,

Aquae cinnamomi, singul. ʒß.

Solv. S. Viermal täglich 60 bis 80 Tropfen. (Hufeland, besonders gegen Kniegeschwulst.)

Rec. Saponis stibiati,

Extracti taraxaci, singul. ʒiß.

Liquoris kali acetici, ʒj.

Solv. S. Dreystündlich 50 Tropfen.

(Kämpf.)

Rec. Tincturae colocynthidis, ʒij.

Liquoris saponis stibiati, ʒvj.

M. S. Zehn bis sechszig Tropfen dreymal täglich. (Heim, gegen Flechten.)

Rec. Jodii, ʒij.

Spiritus vini rectificatissimi, ʒj.

Solv. digerendo. S. Dreymal täglich 3 — 5 — 10 Tropfen. (Magen die.)

Rec. Hydrargyri jodici, ʒj.

Spiritus vini rectificatissimi, ʒiß.

Solv. S. Zehn bis zwanzig Tropfen in einer Tasse Wasser zweymal täglich. (Magen die, bey Syphilis mit Skrofeln.)

Rec. Calcariae muriaticae, ʒj.

Aquae foeniculi, ʒß.

Solv. S. Zweymal täglich 5 bis 50 Tropfen in Haferschleim. (Berends.)

Rec. Barytae muriaticae, ʒß.

Extracti absinthii, ʒiß.

Aquae menthae piperitae, ʒiß.

Solv. S. Zweymal täglich 12 bis 60 Tropfen. (Berends.)

Rec. Kali sulphurati, ʒiʒ.

Aquae cinnamomi,

Syrupi althaeae, singul. ʒʒ.

Solv. S. Dreyimal täglich 10 — 30 Tropfen.
(Berends.)

Diuretische Mittel.

Rec. Kali acetici, ʒij.

Tincturae pimpinellae, ʒʒ.

Solv. S. Viermal täglich 20 — 80 Tropfen.
(Burdach.)

Rec. Extracti lactucae virosae, ʒij.

Tincturae digitalis purpureae, ʒʒ.

Aquae cinnamomi vinosae, ʒiʒ.

Solv. S. Zweystündlich dreyßsig bis fünfzig Tropfen.
(Schneider.)

Rec. Vini stibiati, ʒj.

Aceti squillitici, ʒiiij.

M. S. Zweystündlich 50 Tropfen.

(Lentin.)

Rec. Tincturae digitalis purpureae, ʒiiij.

— *scillae, ʒj.*

M. S. Zweystündlich 30 Tropfen.

(Horn.)

Rec. Extracti trifolii fibrini, ʒʒ.

Acetici scillitici, ʒvj.

Spiritus muriatico-aetherei, ʒʒ.

Solv. S. Dreyimal täglich 60 Tropfen.

(Tode.)

Rec. Liquor ammonii pyro-oleosi, ʒij.

Aceti scillitici, ʒʒ.

Syrupi

Syrupi cerasorum, ʒij.

Tincturae opii crocatae, gtt. viij.

M. S. Zweystündlich 25 — 50 Tropfen.
(K ä m p f.)

Rec. Tincturae digitalis, ʒij.

— *chinae Huxhami*, ʒvj.

M. S. Drey mal täglich 15 — 30 Tropfen. (Berends, gegen Wassersucht, besonders gegen Brustwassersucht bey bejahrten Individuen.)

Rec. Gutti, ʒß.

Liquoris kali carbonici, ʒß.

Solv. S. Drey- bis viermal täglich dreysig Tropfen. (Richter.)

Rec. Radicis squillae recentis, ʒj.

Kali acetici, ʒij.

Spiritus vini rectificati,

Aquae destillatae simplicis, sing.
ʒiß.

Digere per tres dies. S. Zwey- bis drey mal täglich 20 — 40 Tropfen.
(Berends.)

Abführende Mittel.

Rec. Extracti pauchymagogi Crollii,
ʒij.

Mixturae pyro-tartaricae, ʒß.

Solv. S. Stündlich 40 — 60 Tropfen.
(Berends.)

Rec. Granorum tigllii rite excorticatorum, ʒj.

Spiritus vini rectificatissimi, ʒvj.

Digere per sex dies. S. Zu 20 — 40 Tropfen in einem schleimigen Vehikel.

Narkotische Mittel.

Rec. Morphii acetici, gr. xvj.

Aquae destillatae simplicis, ℥j.

Solv. S. Magendie's *tinctura sedativa*. Gabe sechs bis vier und zwanzig Tropfen.

Rec. Strychninii, grana tria (gr. iij).

Spiritus vini rectificati, ℥j.

Solv. S. Sechs bis acht Tropfen zweymal täglich. (Erfordert grofse Vorsicht.)
(Magendie.)

Rec. Extracti nucis vomicae spirituosus, grana tria (gr. iij).

Spiritus vini rectificatissimi, ℥j.

Solv. S. Anfänglich 20 — 30 Tropfen zweymal täglich. (Sicherer.)
(Magendie.)

Rec. Extracti aconiti, ℥ß — ℥j.

Vini stibiati, ℥j.

Solv. S. Dreymal täglich 15 — 30 Tropfen.
(Richter.)

Rec. Extracti lactucae virosae, gr. xvj.

Aquae cinnamomi, ℥ij.

Solv. S. Zweystündlich 15 Tropfen.
(Gegen Brustbräune?)

Rec. Extracti digitalis purpureae, gr. x.

Aquae lauro-cerasi, ℥ß.

Solv. S. Zwey- bis dreymal täglich 20 — 30 Tropfen. (Gegen Brustbräune empfohlen.)

Rec. Opii crudi, grana quatuor
(gr. iv).

Solve in

Liquoris ammonii succinici, ʒiij.

Adde

Extracti hyoscyami, gr. viij.

Solv. S. Dreymal täglich 30 Tropfen.
(Richter, gegen die Ruhr.)

Rec. Tincturae opii crocatae, ʒj.

— *castorei, ʒj.*

— *valerianae aethereae,*
3 iij.

M. S. Stündlich oder zweystündlich 10, 15 bis 30 Tropfen. (Berends.)

Rec. Extracti pulsatillae, ʒß.

Vini stibiati, ʒß.

Solv. S. Dreymal täglich 20 — 60 Tropfen. (Rust, gegen Amaurose.)

Metallische Mittel.

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi,
grana duo (gr. ij).

Tincturae aromaticae, ʒj.

Solv. S. Morgens und Abends funfzehn Tropfen. (Helling, gegen Amaurose und Staar.)

Rec. Cupri limati, ʒj.

Liquoris ammonii caustici, ʒiß.

Digere leni calore in vase amplo clauso, per tres dies.

S. Flüchtige Kupfertinktur, zu drey, fünf bis zehn Tropfen einigemal täglich. (Boerhave, als diuretisches und Nervenmittel.)

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi, granum unum (gr. j). Spiritus sulphurico-aetherei martiati, ℥iij.

Solv. S. Dreyimal täglich zehn bis dreysig Tropfen in einem schleimigen Dekokt. (Diese Verbindung habe ich mit Nutzen in chronischen, hartnäckigen Hautkrankheiten und bey veralteten Skrofeln gebraucht.)

Reizende Mittel.

Rec. Seminis colchici autumnalis recentis,

Spiritus vini rectificati, sing. ℥ij.

Vini hispanici generosi, ℥xij.

Digere per octo dies. S. Täglich dreymal viermal zehn bis dreysig Tropfen.

Rec. Tincturae capsici annui, ℥ij.

Spiritus camphorati, ℥vj.

Liquoris ammonii anisati, ℥j.

M. S. Dreyimal täglich 15 — 60 Tropfen. (Ich habe diese Mischung mit Nutzen gegen torpide Lähmungen angewendet.)

Rec. Phosphori, grana tria (gr. iij).
Aetheris sulphurici purissimi, ℥℥.
Olei valerianae aetherei, ℥℥.

Solv. S. Drey- bis viermal täglich fünf,
 zehn bis dreyßsig Tropfen.

Erregende Mittel.

Rec. Olei chamomillae aetherei, gtt. xvj.
Spiritus nitrico-aetherei, ℥iij.

M. S. Zweystündlich 15 — 20 Tropfen.
 (Heim.)

Rec. Liquoris ammonii succinici,
Spiritus sulphurico-aetherei, sin-
gul. ℥ij.

M. S. Zweystündlich 10 — 50 Tropfen.
 (Eller's sogenannter liquor antarthriticus).

Rec. Camphorae, ℥j.
Aetheris sulphurici, ℥ij.
Tincturae opii crocatae,
Mixturae oleoso-balsamicae, sin-
gul. ℥j.

M. S. Zweystündlich 20 Tropfen.
 (Hufeland.)

Rec. Tincturae ambrae, ℥j.
 — *aromaticae acidae, ℥ij.*

M. S. Drey- bis viermal täglich 20 Tro-
 pfen. (Waiz, gegen das Erbrechen der
 Schwangeren).

Rec. Olei caryophyllorum aetherei,
Aetheris sulphurici, ℥j.
gtt. x.

M. S. Viertel- oder halbstündlich 10 bis 15 Tropfen. (Thilenius, gegen asthenische Metrorrhagie.)

Rec. Tincturae asae foetidae, ℥vj.
Petrolei, ℥℔.

M. S. Viermal täglich 40 Tropfen, am dritten Tage dreystündlich einen Theelöffel voll. (Schwarz, gegen den Bandwurm.)

Rec. Olei terebinthinae rectificati, ℥ij.
Aetheris sulphurici, ℥vj.

M. S. Alle Morgen ein Quentchen, bis ein Pfund verbraucht worden; sicherer zu 20 bis 30 Tropfen einigemal täglich. (Durande's Mittel gegen Gallensteine.)

Rec. Olei terebinthinae, ℥iij.
— *animalis foetidi, ℥j.*

Destillatione e retorta eliciatur tertia pars. S. Zweymal täglich einen Theelöffel voll. (Chaberi's Mittel gegen den Bandwurm.)

Rec. Herbae sabinae recentis, ℥j.
Tincturae kalinae, ℥vj.

Digere per quatuor dies. S. Dreymal täglich 10 bis 15 Tropfen. (Gegen atonische Gicht.)

Stärkende und tonische Mittel.

Rec. Extracti radices columbo, ℥iij.
Aquae cinnamomi, ℥j.

Solv. S. Dreymal täglich 30 — 80 Tropfen. (Berends.)

Rec. Tincturae kalinae, ʒij.

— *quassiae, ʒiij.*

— *cinnamomi, ʒiß.*

M. S. Viermal täglich 20 bis 60 Tropfen. (Hat mir oft gegen Atonie des Magens mit Säurebildung gute Dienste geleistet.)

Rec. Extracti corticis peruviani,

Aquae cinnamomi vinosae, sing. ʒj.

Tincturae rhei aquosae, ʒvj.

Solv. S. Zweymal täglich 70 Tropfen. (T o d e.)

Rec. Tincturae cinnamomi,

Mixturae sulphurico-acidae, singul. ʒij.

Tincturae opii simplicis, ʒj.

M. S. Zweystündlich 20 bis 25 Tropfen. (Gegen asthenische Metrorrhagie.)

Rec. Extracti corticis peruviani frigide parati, ʒij.

Aquae florum aurantii, ʒj.

Aetheris sulphurici, ʒj.

M. S. Dreystündlich 20 bis 60 Tropfen. (B e r e n d s analeptische Tropfen.)

Rec. Extracti belladonnae, ʒj.

Tincturae ferri muriatici, ʒiij.

— *aloës, ʒj.*

— *cinnamomi, ʒß.*

M. S. Dreymal täglich 20 — 30 Tropfen. (In der atonischen Bleichsucht und Menischesis.)

Künstliche Mineralwasser zum innerlichen Gebrauch.

Diese sind zwar, so wie der größte Theil der natürlichen, in größeren Städten stets zu haben, und in neuerer Zeit werden die künstlichen von dem verdienten *Struve* mit großer Genauigkeit dargestellt. Doch will ich einige Vorschriften zu den einfacheren Wassern, nach welchen sie, freylich unvollkommen, auf der Stelle bereitet werden können, hier anführen.

Abführendes Mineralwasser.

Rec. Magnesiae sulphuricae, ℥i℔.

Solve in

Aquae selteranae nativae s. factitiae, libr. iij.

M. D. in lagena rite clausa. Signa.

Weingläser- oder tassenweise zu trinken.

Oder:

Rec. Magnesiae sulphuricae, ℥i℔.

Natri carbonici aciduli, ℥ij.

Aquae fontanae frigidae, libr. iij.

Immitte in lagena haud plane replenda, adde

Acidi sulphurici diluti, ℥iij.

Lagena statim rite claudenda. S. Wie das Vorige.

Oder :

Rec. Aquae fontanae frigidae, libr. iiiß.

Magnesia carbonicae, ʒij.

Acidi sulphurici deluti, ʒj, ʒij.

M. in lagena rite claudenda. S. Wie das Vorige. (Das Verhältniß der Säure zur Magnesia ist hier viel zu groß) (*Aqua magnesia aërea* der französischen Spitäler.)

Auflösendes Mineralwasser.

Rec. Natri sulphurici crystallini,
gr. cxcj (191).

Natri carbonici crystallini,
gr. cxxvij (127).

Natri muriatici, gr. xxxix (39).

Aquae fervidae, libr. iij.

Misceantur in lagena, plus libr. vj continente. Solutione peracta adde

Aquae selteranae nativae, libr. iij.

Rite claudatur lagena. S. Künstliches Karlsbader Wasser. (Klaproth.)

Erregendes, kohlenstoffsaures Mineralwasser.

Rec. Natri carbonici aciduli, ʒiiiß.

Aquae fontanae frigidae, libr. iij.

Acidi muriatici puri, q. s. ad saturat. ʒiiiß natri carbonici aciduli.

M. Det. in lagena, statim rite claudenda. S. Weingläserweise.

*Rec. Kali carbonici depurati, ℥j — ℥iij.
Aquae selteranae nativae s. factitiae, libr. iij.*

Solv. S. Dreymal täglich zwey bis drey Weingläser. (Die sogenannt. aqua mephytica alcalina.)

Stärkendes, eisenhaltiges Mineralwasser.

(Die Auflösung des Eisenoxydulats in freyer Kohlenstoffsäure, wie sie in den natürlichen Mineralwassern statt findet, erheischt besondere Kunstgriffe.)

Rec. Ferri tartarici puri, ℥i℔.

Aquae selteranae nativae s. factitiae, libr. ij.

S. Weingläserweise.

Waschwasser (*lavacra*) und Bähungen (*fomenta*).

Rec. Natri muriatici, ℥j.

Aquae fontanae, libr. iij.

Aceti vini crudi, ℥iv.

Solv. S. Einigemal täglich damit Hals, Brust und Ärme zu waschen; nach Umständen auch die ganze Oberfläche. (Berends, in Fiebern, zur Beförderung der Hautausdünstung.)

Rec. Spiritus vini rectificati,
Aceti vini crudi, singul. ℥iv.
Aquae fontanae, libr. iv.

M. S. Wie das Vorige. (Berends, in Fiebern.)

Rec. Spiritus camphorati, ℥ij.
Aceti crudi, ℥vj.
Infusi specierum aromaticarum,
ex ℥iij parati, libr. iij.

M. S. Wie das Vorige. (Berends, in hochasthenischen u. faulichten Fiebern.)

Rec. Acidi nitrici puri,
— muriatici puri, sing. ℥℔.
Aquae destillatae, ℥xvj.

M. S. Zweymal täglich die ganze Oberfläche damit vermittelt eines Schwammes zu waschen. (Bernhardt, gegen venöse Plethora, Leberanschwellungen u. d. m.)

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi,
grana duo (gr. ij).
Aquae rosarum, ℥viij.

M. S. Waschwasser. (Herrmann.)

Rec. Amygdalarum dulcium, ℥j.

F. l. a. emulsio cum
Aquae destillatae, ℥viij.

Solve

Ammonii muriatici depurati, ℥j.

Tincturae benzoës, ℥ij.

Aquae florum aurantii, ℥ij.

M. S. Waschwasser, ein Schönheitsmittel. (Herrmann.)

Rec. Kali carbonici depurati, ℥ iij.

Natri muriatici, ℥ ij.

Aquae rosarum, ℥ viij.

— *florum aurantii, ℥ ij.*

Solv. S. Waschwasser. (Ich habe es mit Nutzen gegen Sommerflecken, *aspre-dines*, angewendet.)

Rec. Calcariae muriaticae, ℥ j.

Aquae rosarum, ℥ viij.

Solv. S. Waschwasser. (Ich habe es gegen Flechten wirksam befunden.)

Rec. Kali sulphurati, ℥ iij.

Saponis hispanici, ℥ j.

Aquae calcariae ustae, ℥ viij.

Spiritus vini rectificati, ℥ ij.

M. f. cotio. S. Die kranke Stelle Morgens und Abends damit zu waschen. (Barlow, gegen Grind.)

Rec. Foliorum althaeae,

— *hyoscyami,*

Capitum papaveris albi, sing. ℥ j.

Coque ex aquae libr. iv ad col. libr. iij.

S. Flanell- oder Leinwandlappen eingetaucht und ausgedrückt, mäßig warm aufzulegen. (J. A. Schmidt.)

Rec. Herbae et florum malvae, ℥ ij.

Coque ex aquae libr. iij ad col. libr. ij.

Adde

Aceti saturnini, ℥ ℔.

M. S. Mit leinenen Kompressen lauwarm aufzulegen. (Herrmann.)

Rec. Ammonii muriatici depurati, ℥℔.
Spiritus frumenti, ℥ij.
Aquae fontanae, ℥xvj — xx.

Solv. S. Mittelst Kompressen hiermit die kranken Theile zu bähen. (Vogler's zertheilendes Wasser.)

Rec. Kali nitrici,
Aluminis crudi, singul. ℥ij.
Aquae fontanae, ℥x — xvj.

Solv. S. Wie das Vorige. (Vogler.)

Rec. Liquoris ammonii acetici, ℥i℔.
Decocti herbae malvae, ex ℥ij parati, libr. j.

Tincturae opii crocatae, ℥iij.
M. S. Vermittelst Kompressen lauwarm überzulegen. (Berends.)

Rec. Specierum aromaticarum, ℥j.
Infunde cum aquae fervidae, libr. j.
Colaturae adde
Ammonii muriatici depurati, ℥vj.
Kali nitrici, ℥ij.

Solv. M. S. Wie das Vorige.

Rec. Herbae conii maculati,
— hyoscyami, singul. ℥iv.

Infunde cum aquae fervid. q. s. ad colat. libr. ij.

Solve
Saponis domestici, ℥ij.

S. Flanell damit stark anzufeuchten und warm überzulegen. (Berends schmerz-

lindernde und krampfstillende Fomenta-
tion.)

Rec. Lythargyri, ℥vj.

Boli armenae, ℥j.

Mastichis,

Myrrhae, singul. ℥℔.

Aceti vini crudi, libr. j.

Coque per horae quartam partem. S.

Ein sechs- bis achtfach zusammengeleg-
tes Tuch damit zu befeuchten, und lau-
warm überzulegen. (Heister's Foment
gegen *hygroma patellae*.)

Rec. Ferri acetici, ℥℔.

Aquae fontanae, ℥viij.

Solv. S. Zu Fomentationen.

(Rust.)

Rec. Corticis quercus, ℥℔.

Coque ex aquae libr. ij, ad col. libr. j.

Sub finem coctionis adde

Florum chamomillae, ℥j.

Colaturae admisce:

Aceti vini crudi, ℥j.

M. S. Zu Fomentationen.

Rec. Seminum sinapis contusorum, ℥ij.

Infunde aquae fervid. q. s. ad colat.

℥xvj.

Solve

Saponis domestici, ℥j.

S. Lauwarm mit Kompressen überzulegen.

(Ich habe sie bisweilen mit Nutzen auf die
Brüste gelegt, wenn die Milch zurückge-
treten war.)

Rec. Kali sulphurati, ℥iv.
Aquae fontanae, libr. ij.
Solve et adde

Acidi sulphurici diluti, ℥j.
M. S. Die mit Psora behafteten Theile
 zwey- bis dreymal täglich damit zu wa-
 schen.

Augenwasser (*collyria*).

Rec. Mucilaginis seminis cydoniorum,
 ℥℔.

Aquae rosarum, ℥iij.
M. S. Augenwasser.

Rec. Zinci sulphurici, gr. iij.
Aquae rosarum, ℥iij.
Mucilaginis seminis cydoniorum,
 ℥j.

Tincturae opii crocatae, ℥℔.
M. S. Täglich ein- bis zweymal einen
 Tropfen in das Auge fallen zu lassen.
 (v. Gräfe, *aqua ophthalmica robo-*
rans.)

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi,
granis sextam partem (gr. $\frac{1}{6}$).
Tincturae opii crocatae, ℥℔.

Aquae rosarum, ℥j.
Solv. S. Ins Auge zu tröpfeln.
 (Conradi.)

Rec. Croci orientalis, ℥j.
Aquae fervidae, ℥iv.

*Digere per quartam horae partem, co-
laturae adde*

Tincturae opii crocatae.

M. S. Schmerzstillendes Augenwasser.
(J a d e l o t.)

Rec. Extracti opii aquosi, gr. viij.

Camphorae, gr. vj.

*Conterantur exactissime, sensim sen-
simque admisceantur:*

Aquae destillatae fervidae, ℥ xij.

Solv. S. Augenwasser.
(L a w r e n c e.)

Rec. Aquae saturninae,

— rosarum, singul. ℥ ij.

Opii crudi, gr. viij.

Solv. S. Mit Kompressen über das Auge
zu legen. (C o n r a d i.)

Rec. Aceti destillati, ℥ j.

Spiritus vini rectificati, ℥ ℞.

Aquae rosarum, ℥ viij.

M. S. Zum Überschlagen.
(S c a r p a.)

Rec. Aceti destillati, ℥ ℞.

Aquae florum sambuci, ℥ vj.

Spiritus rorismarini, ℥ iij.

M. S. Mit Kompressen überzulegen.
(W a r e.)

Rec. Plumbi acetici crystallini, gr. iij.

Aquae destillatae simplicis, ℥ vj.

Mucilaginis gummi tragacanthae,
℥℔.

Spiritus camphorati, gtt. vj.

M. S. Augenwasser. (Scarpa.)

Rec. Hydrargyri muriatici mitis, ℥j.

Aquae rosarum, ℥j.

Aquae calcariae ustae, ℥vj.

Extracti hyoscyami, ℥℔.

M. S. Umschlag über das Auge.

(Gräfe.)

Rec. Foliorum belladonnae, ℥ij.

Infunde aquae fervidae q. s. ad colat.
℥vij.

S. Mit Kompressen lauwarm über die Augen zu legen. (v. Gräfe, gegen heftige und schmerzhaftes Blennorrhöen.)

Rec. Florum arnicae, ℥vj.

Herbae rutae, ℥j.

Infund. aquae fervid. q. s. ad col. ℥xij.

S. Als Umschlag zu gebrauchen. (v. Gräfe, gegen Kontusionen und Blutaustretungen im Auge.)

Rec. Cupri acetici crystallini, gr. iv.

Aquae rosarum, ℥vj.

Tincturae opii crocatae, ℥i℔.

Solv. S. Zwey- bis dreymal täglich die Augen damit zu baden.

(Montmahon.)

Rec. Zinci hydriodici, gr. iv.

Aquae destillatae simpl. ℥vj.

Solv. S. Augenwasser. (Gegen skrofulöse Ophthalmien. Mannoir.)

Rec. Zinci acetici, ℥℔.

Aquae destillatae simpl., ℥xij.

Solv. S. Augenwasser zum Waschen der Augen. (Ware.)

*Rec. Cupri sulphurici crystallini,
Boli armenae, singul. gr. viij.
Camphorae, gr. ij.*

Aquae fervidae, ℥viij.

Misce exactissime, decanthur liquor limpidus. S. Öfters etwas davon, etwa stündlich, zwischen die Augenlider zu spritzen. (Guthrie, bey Verdunkelung der Linse.)

*Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi,
grani quartam partem,
(gr. $\frac{1}{4}$).*

Aquae rosarum, ℥j.

*Mucilaginis seminis cydoniorum,
℥ij.*

Tincturae opii crocatae, ℥ij.

Solv. M. S. Augenwasser.

(v. Gräfe.)

*Rec. Lapidis divini s. cupri aluminati,
gr. viij — xij.*

Aquae destillatae, ℥℔.

Aceti saturnini, gtt. xij — xx.

Tincturae opii crocatae, ℥j — ℥j.

Aquae communis, ℥iv.

Solv. S. Augenwasser, mit Läppchen überzulegen. (Benedict.)

Rec. Cupri aluminati, gr. ij,

Aquae rosarum, ℥viij.

Mucilaginis seminis cydoniorum,
3j.

Tincturae opii crocatae, 3ß.

Solv. M. S. Mit Läppchen überzulegen. (v. Gräfe, gegen asthenische Entzündung der Bindehaut und Blennorrhöe.)

Rec. Herbae hyoscyami,

— *conii maculati,*

Seminis lini, singul. 3j.

Coque ad consistent. cataplasmat. S.
Lauwarm überzulegen. (v. Gräfe, gegen Schwielen der Augenlider und Gerstenkörner.)

Rec. Sacchari candi, 3j.

Aquae rosarum, 3iv.

Solv. S. Augenwasser. (Richard.)

Rec. Foliorum belladonnae, 3ij.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. 3vij.

Adde

Aquae calcariae ustae, 3viiij.

Hydrargyri muriatici mitis, ʒij.

M. Signa. Als Umschlag anzuwenden. (v. Gräfe, gegen heftige Blennorrhöen, bey Nachlaß der Schmerzen und starkem Ausflusse.)

Rec. Kali carbonici depurati, gr. ij—vj.

Aquae destillatae, 3j.

Solv. S. Vierstündlich, dann zweystündlich einzuträufeln. (Himly, gegen Verdunkelungen der Hornhaut.)

Rec. Tincturae stramonii, ℥ij.

Aquae destillatae simplicis, ℥vj.

M. S. Als Umschlag anzuwenden. (Hufeland, gegen krampfhaftes Verschließung der Augenlider.)

Rec. Extracti opii aquosi,

Kali carbonici depurati, singul. gr. iv.

Aquae florum sambuci, ℥viij.

Solv. Signa. Als Umschlag anzuwenden. (Hat mir gegen krampfhaftes Verschließung der Augenlider stets gute Dienste geleistet.)

Rec. Extracti belladonnae, ℥ij.

Aquae destillatae simplicis, ℥ß.

Solv. S. Einige Tropfen einzuträufeln, zur Erweiterung der Pupille bey Staaroperationen. (Langenbeck.)

Rec. Foliorum nicotianae virginianae, ℥iß.

Liquoris ammonii acetici, ℥iij.

Aquae fervidae, ℥iß.

Digere per quartam horae partem.

Cola. S. Zu einigen Tropfen einzuträufeln. (Der Tabak verengt die Pupille; daher habe ich dieses Mittel gegen Mydriasis in einem Falle mit Erfolg versucht.)

Rec. Zinci sulphurici crystallini, gr. ij.

Aquae destillatae simplicis, ℥ij.

Solv. S. Die Augenlider öfter damit zu befeuchten. (A. G. Richter gegen

Jucken der Augenlider, Erschlaffung d. Bindehaut der Kornea.)

Rec. Boracis,

Sacchari albi, singul. ℥j.

Extracti aloës aquosi,

— *opii aquosi, sing. gr.xij.*

Aquae rosarum, ℥iv.

Solv. Signa. Gegen Verdunkelungen der Hornhaut. (Richter.)

Rec. Cupri aluminati, gr.x.

Ammonii muriatici depurati, gr.v.

Aquae destillatae simplicis, ℥ij.

Solv. Sign. Mit Läppchen überzulegen. (A. G. Richter, gegen rheumatische Ophthalmie bei schwächlichen und torpiden Individuen.)

Rec. Boracis, ℥j.

Aquae florum sambuci, ℥iv.

Solv. Sign. Mit Läppchen überzulegen. (Erhard, gegen skrofulöse Lichtscheu.)

Rec. Acidi sulphurici concentrati rectificati, gtt. iij.

Aquae destillatae simplicis, ℥j.

M. S. Einzutröpfeln. (Rust, gegen ägyptische Ophthalmie.)

Rec. Argenti nitrici crystallini, gr.j—ij.

Aquae destillatae simplicis, ℥ij.

Solutio filtrata detur in vitro, charta nigra obducto. S. Augentropfwasser. (Rust, bey Wucherungen der Augen-gebilde.)

Rec. Aceti saturnini,
Spiritus camphorati, singul. ℥ij.
Aquae chamomillae, ℥viiij.
Vitrioli albi s. zinci sulphurici,
 ℥j.

Solv. Sign. Mit Läppchen überzulegen.
 (Selle, gegen *epiphora* u. *lippitudo*.)

Rec. Zinci sulphurici crystallini, ℥j.
Aceti saturnini, ℥℔.
Aquae destillatae simplicis, ℥x.
Spiritus camphorati, ℥ij.

Solv. S. Zwey - bis viermal täglich die Augen damit auszuwaschen. (A. Schmidt, gegen die Ophthalmie der Neugeborenen, im 2. Stadium.)

Rec. Zinci sulphurici crystallini, ℥j.
Aceti saturnini, ℥℔.
Aquae destillatae simplicis, ℥x.
Spiritus camphorati, ℥ij.
Aluminis crudi, ℥j.

Solv. S. Wie das Vorige. (A. Schmidt, im weitem Verlauf der Ophthalmie der Neugeborenen.)

Rec. Aquae rosarum, ℥iv.
Tincturae opii crocatae, ℥℔.

M. S. Augenwasser zum Auswaschen, lauwarm anzuwenden. (Berends, gegen katarrhalische Ophthalmie.)

Rec. Extracti hyoscyami, ℥j.
Aquae destillatae simplicis, ℥j.

Solv. S. Vierstündlich lauwarm ins Auge zu tröpfeln. (A. Schmidt, gegen Iritis.)

Rec. Aquae rutae,
— *rosarum, singul. ℥ij.*
Liquoris myrrhae, ℥ij.
Mucilaginis seminis cydoniorum,
℥℥.

M. S. Mit Bäuschchen aufzulegen.
(Stark.)

Rec. Extracti aconiti, ℥℥.
Aquae florum chamomillae, ℥v.

Solv. *S.* Augenwasser. (Berend's, gegen rheumatische Ophthalmie.)

Rec. Olei menthae piperitae, ℥ij.
Liquoris ammonii caustici, ℥ij.
Aetheris sulphurici, ℥j.

M. S. In die Umgegend des Auges tropfenweise einzureiben, auch auf der Hand gegen das Auge verdunsten zu lassen. (v. Gräfe, gegen asthenische Amblyopie und Amaurosis.)

Rec. Spiritus menthae,
 — *serpylli,*
 — *rorismarini,*
 — *lavandulae, singul. ʒ℥.*

Liquoris ammonii anisati, ℥j.
Mixturae oleoso-balsamicae, ℥ij.

M. S. Wie das Vorige. (v. Gräfe.)

Rec. Olei lauri aetherei, ʒ℥.
— macidis aetherei, ʒj.

Olei caryophyllorum, ʒß.

Balsami indici nigri, ʒj.

M. S. In die Schläfen und Augenlider einzureiben. (Reil, gegen *ptosis palpebrar.*)

Rec. Tincturae cantharidum,

Spiritus serpylli, singul. ʒiij.

M. S. In die äußere Fläche der Augenlider und in die Augenbrauen einzureiben. (A. G. Richter, gegen *Ptosis, amaurosis.*)

Rec. Liquoris ammonii caustici,

Tincturae castorei aethereae, singul. ʒij.

M. S. In das obere Augenlid und in die Augenbrauengegend einzureiben. (Richter, gegen *Amaurosis.*)

Rec. Fellis tauri inspissati, ʒß.

Boracis,

Sacchari albi, singul. ʒj.

Aquae rosarum,

— *foeniculi, singul. ʒij.*

Extracti aloës aquosi, gr. xij.

Solv. S. Augenwasser, mit Läppchen überzulegen und einzutröpfeln. (Reil, gegen Hornhautflecken.)

Rec. Olei succini rectificati, ʒß.

Liquoris ammonii caustici, ʒß.

Spiritus rorismarini, ʒj.

M. S. Auf der Hand gegen das Auge verdunsten zu lassen. (Berends.)

Mund-

Mundwasser (*collutoria*) und Gurgelwasser (*gargarismata*).

Rec. Decocti radicum althaeae, ex ℥iij parati, ℥iv.

Lactis vaccini, ℥ij.

Mellis depurati, ℥ß.

M. S. Lauwarm anzuwenden.

(Montmahou.)

Rec. Decocti avenae, ℥iv.

Syrupi diacodion, ℥j.

M. S. Schmerzlinderndes Gurgelwasser.

(Montmahou.)

Rec. Florum sambuci, ℥iß.

Caricarum, ℥j.

Infunde cum lactis fervidi, q. s. ad col. libr. j,

S. Gurgelwasser, lauwarm zu brauchen.

(Berends.)

Rec. Decocti hordei, ℥iv.

Syrupi mororum, ℥j.

Kali nitrici depurati, gr. xv.

Solv. S. Gurgelwasser.

(Montmahou.)

Rec. Decocti avenae, ℥vj.

Mellis rosati, ℥iß.

Acidi sulphurici diluti, gtt. xvij.

M. S. Gurgelwasser.

(Montmahou.)

Rec. Decocti hordei, ℥vj.

Oxymellis simplicis, ℥j.

M. S. Gurgelwasser. (Richard.)

Rec. Decocti cydoniorum, ex ℥i fructuum recentium parati, ℥viij.

Syrupi mororum, ℥j.

Acidi muriatici puri, gtt xx — xxx.

M. S. Gurgelwasser. (Connell.)

Rec. Boracis, ℥ij.

Aquae rosarum, ℥viij.

Mellis rosati, ℥j.

Solv. S. Gurgelwasser, bey Halsentzündungen mit Eiterung.

(Montmahou.)

Rec. Aquae calcis purae s. ustae,

Lactis vaccinae, singul. ℥iv.

Mellis rosati, ℥ij.

M. S. Gurgelwasser. (Bey asthenischen Schleimflüssen habe ich es nützlich gefunden.)

Rec. Liquoris ammonii acetici, ℥ß.

Aquae destillatae simplicis,

Syrupi althaeae, singul. ℥j.

Ammonii muriatici depurati, ℥j.

Solv. S. Theelöffelweise langsam zu verschlucken. (Reil)

Rec. Tincturae pimpinellae, ℥ij.

Oxymellis squillitici,

Syrupi althaeae, singul. ℥j.

M. S. Theelöffelweise langsam zu verschlucken. (Reil.)

Rec. Ammonii carbonici sicci, ℥j.

Spiritus vini rectificati, ℥ij.

Decocti hordei, ℥xij.

M. S. Reizendes Gurgelwasser.

(Montmahou.)

Rec. Foliorum sabinae, ℥vj — ℥j.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥vj.

Adde

Hydrargyri muriatici corrosivi,

gr. j.

Solv. S. Gurgelwasser gegen chronische

Bräune.

(Kopp.)

Rec. Cupri sulphurico-ammoniat,

gr. viij.

Aquae destillatae sabinae, ℥vj.

Solv. S. Wie das Vorige. (Kopp.)

Rec. Acidi muriatici puri, ℥iij.

Syrupi mororum, ℥iij.

M. S. Bis zur angenehmen Säure in Sal-

beyaufguß, zum Mund- und Gurgelwas-

ser. (Kopp.)

Rec. Hordei excorticati, ℥j.

Coque ex aquae ℥xxiv *ad colat.* ℥xij.

Sub finem coctionis adde:

Radici contrajervae, ℥ß.

Colaturae admisce:

Aceti destillati,

Tincturae myrrhae, singul. ℥j.

Mellis crudi, ℥vj.

Solv. S. Gurgelwasser gegen brandige

Bräune.

(Fothergill.)

Rec. Cupri sulphurici crystallini,

Tincturae myrrhae,

— *catechu*,

— *kino, singul.* ℥j.

Tincturae pimpinellae, ℥v.

Infusi salviae, ex ℥℔ parati, ℥vj.

Mellis crudi, ℥vj.

M. S. Stündlich den Mund damit auszuspiülen. (K o p p, gegen hartnäckigen Speichelfluss.)

Rec. Infusi herbae centaurei minoris, ex ℥℔ parati, ℥iv.

Spiritus cochleariae, ℥iij.

Mellis rosati, ℥j.

M. S. Antiskorbutisches Mundwasser.
(M o n t m a h o u.)

Rec. Decocti florum malvae, ex ℥℔ parati, ℥v.

Lactis vaccini, ℥j.

Hydrargyri muriatici corrosivi,
gr. j — ij.

Solv. S. Antisymphilitisches Mund- und Gurgelwasser. (*Hôpital des vénériens.*)

Rec. Corticis peruviani regii, ℥℔.

Coque ex aquae ℥xij ad colatur. ℥vj;
in qua solve

Hydrargyri muriatici corrosivi,
gr. iv.

Tincturae myrrhae,

Mellis rosati, singul. ℥℔.

M. S. Antisymphilitisches Mund- u. Gurgelwasser. (H e n n e n.)

Rec. Corticis peruviani rubri, ℥℔.

Coque ex aqu. ℥x ad colat. ℥vj.

Solve

Camphorae, gummi mimosae sub-
actae, gr. xij.

Adde

Tincturae pimpinellae,
— chinae simplicis, sing.
℥℔.

Mellis rosati, ℥i℔.

M. S. Mund- und Gurgelwasser bey
böartigen Aphthen und brandiger Bräu-
ne. (Berends.)

Rec. Camphorae, gr. x.

Gummi mimosae, q. s.

Aquae salviae, ℥vj.

Tincturae ratanhiaë, ℥iij.

Mellis rosati, ℥i℔.

F. l. a. mixtura. Signa. Mundwasser.
(Ich habe es mit Nutzen gegen schlaaffe
Mercurialgeschwüre angewendet.)

Rec. Corticis peruviani, ℥j.

Coque ex aqu. ℥xviij ad colat. ℥xij.

Solve

Aluminis puri, ℥j.

Mellis rosati, ℥i℔.

M. S. Bey Erschlaffung des Zäpfchens
und der Umgegend.

(Montmahou.)

Rec. Florum rosarum rubrarum, ℥℔.

Coque ex sufficiente quantitate aquae
ad colat. ℥iv.

*Adde**Aluminis crudi, ℥j.**Mellis rosati, ℥j.**Solv. S.* Tonisches Mund- und Gurgelwasser. (Montmahou.)*Rec. Oxymellis aeruginis, ℥℔.**Mellis rosati, ℥ij.**Decocti hordei, ℥viij.**M. S.* Mund- und Gurgelwasser. (Currie.)*Rec. Herbae rutae,**— salviae, singul. ℥ij.**Infund. cum aquae fervid. ℥xij.**Colaturae refrigeratae adde:**Spiritus cochleariae, ℥ij.**Tincturae laccae, ℥j.**M. S.* Mundwasser. (A. Schmidt.)*Rec. Florum arnicae, ℥ij.**Infund. c. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥viij.**Adde**Mellis rosati, ℥i℔.**M. S.* Mund- und Gurgelwasser. (Berends.)*Rec. Corticis quercus junioris, ℥vj.**Coque ex aquae ℥xviij ad colat. ℥xij.**Adde**Aluminis crudi, ℥℔.**Spiritus vini rectificati, ℥i℔.**M. S.* Stärkendes Mundwasser. (P. Frank.)

Einspritzungen (*injectiones*).

Rec. Kali caustici sicci, gr. j — iv.
Mucilaginis seminis cydoniorum,
Aquae destillatae simplicis, sing.
 ℥i℔.

M. S. Zu Injektionen in die Harnröhre
 beym Tripper.

Rec. Plumbi acetici, gr. x.
Aquae destillatae simplicis, ℥iij.
Aquae rosarum, ℥j.

M. S. Zu Einspritzungen.
 (Herrmann.)

Rec. Opii crudi, gr. vj.
Solve in
Aquae fontanae, ℥iij.
Cola et adde
Emulsionis amygdalarum, ℥j.

M. S. Zu Einspritzungen. (Lagneau,
 gegen Tripper.)

Rec. Plumbi acetici, ℥ij.
Aquae rosarum, ℥xviij.
Aceti, ℥vj.

Solv. S. Zu Einspritzungen in die Schei-
 de, beym syphilitischen weissen Fluß.
 (Swediaur.)

Rec. Balsami copaivae, ℥ij.
Mucilaginis gummi mimosae, ℥℔.
Misce et adde
Aquae calcariae ustae, ℥vj.

M. S. Einspritzung bey Vereiterung des Mastdarms, der Scheide und der Harnröhre. (Abernethy.)

Rec. Vini rubri calidi, ℥xij.

Spiritus vini rectificati, ℥℔ — ℥j.

M. S. Einspritzung zur Erregung einer adhäsiven Entzündung in fistulösen Gängen, und bey der Operation der Hydrocele. (Richard.)

Rec. Zinci sulphurici crystallini, gr.viij.

Aquae rosarum, ℥vj.

Tincturae opii crocatae, gutt.xij.

M. S. Einspritzung gegen chronische Schleimflüsse. (Richard.)

Rec. Balsami indici nigri, ℥ij.

Tincturae moschi, gutt.iv.

Olei aetherei rosarum, gtt.j.

Infusi hyperici tenuioris, ℥i℔.

M. S. Einspritzung gegen atonische Ohrenflüsse. (Richard.)

Rec. Summitatum millefolii, ℥iij.

Infunde aquae fervidae q. s. ad colat. ℥iij.

Adde

Liquoris myrrhae, ℥j.

M. S. Mit einem Theelöffel drey- bis viermal täglich einzufüllen. (Berends, gegen atonische Otorrhöe.)

Rec. Cupri sulphurico-ammoniati, gr.v.

Aquae rosarum, ℥v.

Solv. S. Zu Injektionen. (Lagneau, gegen Tripper.)

Rec. Aquae destillatae, ℥iv.

Acidi muriatici puri, gtt. iv.

M. S. Zu Injektionen. (Wyatt, gegen Gonorrhöe.)

Rec. Decocti quercus, ex ℥iß parati, ℥xij.

Aluminis crudi, ℥ß.

Solv. S. Zu Einspritzungen. (Cooper, gegen atonische Metrorrhagie, Leukorrhöe.)

Rec. Zinci oxydati albi, q. pl.

Aceti destillati, q. s. ad perfect. solutionem.

Hujus solutionis gtt. xx misce cum

Aquae destillatae, ℥iv.

S. Zu Einspritzungen beym Tripper.

(Swediaur.)

Rec. Infusi seminis lini,

Olei olivarum, singul. ℥iv.

Opii crudi, ℥j.

Unguenti hydrargyri cinerei, ℥iß.

Solv. M. S. Viermal täglich, nach dem Urinlassen, zu injiziren. (Swediaur, gegen Tripper und syphilitische Leukorrhöe.)

Rec. Plumbi acetici, ℥j.

Aluminis, ℥ß.

Zinci sulphurici,

Ammonii muriatici, sing. gr. xvij.

Aquae destillatae, ℥xvj.

Solv. S. Zu Injektionen. (Trotz der unchemischen Zusammensetzung doch sehr wirksam. (S w e d i a u r.)

Rec. Plumbi acetici, ℥j — ʒj.

Extracti opii aquosi, ʒj.

Aquae destillatae, ʒiv.

Solv. S. Zu Injektionen.

(S w e d i a u r.)

Rec. Cupri sulphurici crystallini, q. p.

Solve in aqu. destillat. q. s.

Adde

Liquoris kali carbonici, q. s. ad praecipitationem.

Praecipitatum exacte ablutum solve in Liquoris ammonii pyro - oleosi, q. s.

Von dieser blauen Auflösung werden 3 oder 4 Tropfen, mit einer Unze destillirten Wassers vermischt, und davon jedesmal nach dem Urinlassen eingespritzt.

(S w e d i a u r.)

Rec. Kino, gr. xx — xxx.

Infunde aquae fervid. ʒxij.

Cola. S. Zu Injektionen gegen den Nachtripper. (S w e d i a u r.)

Rec. Zinci sulphurici, ʒß.

Camphorae tritae, gr. viij.

Plumbi acetici, ℥j.

Extracti opii aquosi, gr. v.

Aquae rosarum, ʒxij.

Solv. S. Einspritzung gegen Nachtripper. (J u s t a m o n d.)

(Nach Umständen läßt man den Bleyzucker hinweg, und mischt statt desselben vier Grane ätzenden Quecksilbersublimats hinzu.)

Rec. Cupri sulphurici crystallini, gr.vj.
Aquae destillatae, ℥iv.
Aceti saturnini, gtt.xx.

Solv. S. Injektion gegen Phymosis.
 (Swediaur.)

Rec. Corticis salicis fragilis, ℥j.
Coqu. ex aqu. ℥xiv ad colat. ℥viij.
Sub finem coctionis adde:

Florum chamomillae, ℥j.
Colaturae refrigeratae admisce:
Liquoris myrrhae, ℥j.

M. S. Zu Injektionen gegen atonische Metrorrhagie und Leukorrhöe.
 (Schubarth.)

Rec. Olei chamomillae infusi, ℥℔.
Balsami indici nigri, ℥j.
Olei terebinthinae sulphurati,
— succini rectificati,
Tincturae asae foetidae,
— castorei, singul. gtt.xij.

M. S. Injektion gegen chronische Otitis (?), gegen Taubheit aus Schwäche des Gehörganges. (Montmahou.)

Rec. Aluminis crudi, ℥j.
Aquae rosarum, ℥ij.

Solv. S. Injektion gegen Nachtripper.
 (Hunter.)

Rec. Liquoris ammonii caustici, gtt.xij.
Lactis tepidi, ℥i℔.

M. S. Einspritzung in die Scheide, gegen Menischesis. (Lavagna.)

Rec. Radicis ratanhiaë, ℥j.
Coque ex aquae ℥xij ad colat. ℥vj.
Adde

Aceti crudi, ℥ij.

M. S. Einspritzung bey Blutflüssen (atonischen) aus der Nase oder Gebärmutter; auch bey der Stymatosis).

Rec. Ferri sulphurici crystallini,
℥℔ — ℥i℔.

Aquae salviae, ℥iv.

Mucilaginis gummi mimosae, ℥℔.

Solv. S. Einspritzung bey Epistaxis und Metrorrhagie. (Berends.)

Rec. Ichthyocollae, ℥ij.

Coqu. ex aqu. ℥xvj ad remanent. ℥ix.

S. Lauwarm einzuspritzen, bey Nasen-, Gebärmutter-, Harnröhrenblutfluss. (Berends.)

Klystiere (*enemata*).

Schwächende und ableitende.

Rec. Kali nitrici depurati, ℥℔ — ℥i℔.
Decocti avenae, ℥v.
Oxymellis simplicis, ℥j.

Solv. S. Lauwarm beyzubringen.
(Berends.)

Rec. Decocti avenae, ℥vj.

Aceti vini crudi, ℥ij.

M. S. Zum Klystier. (Reil.)

Rec. Aceti crudi, ℥ij.

Aquae communis, ℥iij.

M. S. Ableitendes Essigklystier.

Ausleerende.

Rec. Decocti avenae, ℥vj.

Oxymellis simplicis,

Olei lini recentis, singul. ℥j.

Magnesia sulphuricae, ℥vj.

Solv. M. S. Zu einem Klystier.
(Berends.)

Rec. Florum chamomillae, ℥i℔.

Seminis lini, ℥j.

Coque ex aqu. q. s. ad colat. ℥vj.

Adde

Magnesia sulphuricae, ℥℔.

Olei lini, ℥i℔.

M. S. Leiberöffnendes Klystier.
(Reil.)

Rec. Decocti avenae, ℥iv.

Natri sulphurici,

Aceti crudi,

Olei olivarum, singul. ℥j.

Solv. M. S. Schnell wirkendes, abführendes Klystier. (Ich habe es oft mit Erfolg bey Hirnentzündungen, Schlagflüssen angewendet.)

Rec. Olei ricini, ℥j — ℥iß.

Vitellorum ovi, nro. ij.

Infusi chamomillae, ℥vj.

M. S. Ausleerendes Klystier.

(Berends.)

Rec. Infusi chamomillae fortioris, ℥v.

Natri muriatici, ℥ij.

Olei lini, ℥ij.

Solv. M. S. Ausleerendes Klystier.

(Berends.)

Rec. Infusi chamomillae fortioris, ℥v.

Saponis domestici, ℥iij.

Olei lini, ℥iß.

Solv. M. S. Ausleerendes Klystier.

(Berends.)

Rec. Infusi chamomillae, ℥iv.

Vitellorum ovi, numero ij.

Olei olivacearum, ℥ij.

Sacchari albi, ℥iß.

Solv. M. S. Ausleerendes Klystier für sensible Individuen.

(Berends.)

Rec. Infusi chamomillae, ℥v.

Mellis crudi, ℥iß.

Olei lini, ℥ij.

Solv. S. Ausleerendes Klystier.

(Berends.)

Rec. Infusi chamomillae, ℥v.

Pulpae tamarindorum, ℥iß.

Olei lini, ℥ij.

M. S. Ausleerendes und kühlendes Klystier. (In gallichten, und im Anfange der Faulfieber.)

(Berends.)

Rec. Olei crotonis, gtt. ij — iv.
— lini, ℥ ij.

Decocti avenae, ℥ iv.

M. S. Ausleerendes Klystier. (Wirkt sicher und kräftig.)

Rec. Terebinthinae laricinae, ℥ ij — ℥ ℔.

Mellis crudi, ℥ j.

Vitellorum ovi, numer. ij.

Infusi chamomillae, ℥ iv.

M. S. Ausleerendes Klystier.

(Cullen.)

Rec. Foliorum sennae, ℥ ij.

Seminis lini, ℥ ℔.

Coque ex aquae ℥ x ad remanent. ℥ vj.

Solve

Natri sulphurici, ℥ ij.

Adde

Olei lini, ℥ j.

M. S. Abführendes Klystier.

(Richard.)

Rec. Extracti colocynthidis, ℥ j.

Natri muriatici, ℥ iiij.

Infusi chamomillae, ℥ v.

Mellaginis graminis, ℥ i℔.

Solv. S. Heftig reizendes, ausleerendes Klystier (bey Koma, Stupor und anderen Gehirnaffektionen von örtlichen Verletzungen; auch bey der sogenannten serösen Apoplexie.) (Nach Abernethy verbessert.)

Rec. Decocti althaeae (ex ℥ ℔ parati),
℥ viij.

Natri sulphurici,

Electuarii e senna, singul. ℥j.

Solv. M. S. Zu zwey Klystieren.

(Herrmann.)

Erweichende, erschlaffende, anhaltende, ernährende.

Rec. Vitellorum ovi, nro. ij.

Aquae chamomillae, ℥viij.

M. S. Zu zwey Klystieren.

(v. Hildebrand.)

Rec. Seminis lini, ℥ß.

Coque ex aquae ℥x ad remanent. ℥v.

Adde

Olei lini, ℥j.

M. S. Zu einem Klystier.

(Berends.)

Rec. Amyli, ℥ij.

Aquae, ℥iv.

Coque ad solutionem. S. Zu einem Klystier.

(Vogler.)

Rec. Pedis vitulini, nr. j.

Coque ex aquae ℥x ad remanent. ℥iv.

Cola. S. Zu einem Klystier.

(Berends.)

Rec. Jusculi carni bovinæ fortioris sine sale, ℥iv.

Radici salep, ℥j.

Vitelli ovi, nr. j.

Solv. S. Zu einem Klystier.

Krampfstillende, erregende.

Rec. Florum chamomillae, ℥j.

Radicis valerianae,

Herbae menthae crispae, singul. ℥ß.

Infunde aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥x.

Adde

Olei lini, ℥j.

M. S. Zu zwey Klystieren.

(Berends.)

Rec. Asae foetidae, ℥j — ℥ij.

Vitelli ovi, nro. j.

Aquae chamomillae, ℥iv.

Misce exacte. S. Zu einem Klystier.

Rec. Camphorae, gr. x.

Vitellorum ovi, numer. ij.

Infusi chamomillae, ℥x.

M. S. Zu zwey Klystieren.

(Richard.)

Rec. Foliorum sabinae,

— *rutae,*

— *absinthii, singul. ℥iij.*

Coque ex aqu. ℥xvj ad colat, ℥x.

Adde

Olei ricini, ℥ß.

M. S. Zu zwey Klystieren, gegen Askariden.

(Duncan.)

Rec. Terebinthinae laricinae, ℥ß.

Vitelli ovi, nro. j.

Infusi seminis lini, ℥x.

M. S. Zu zwey Klystieren. (Clive, gegen Steinschmerzen, Ischurie.)

Narkotische.

Rec. Amyli, ʒiß.

Solve in aquae fervidae, ʒiv.

Adde

Tincturae opii crocatae, gtt.v—x.

M. S. Anhaltendes und schmerz lindern-
des Klystier; auch gegen kolliquative
Durchfälle. (Berends.)

Rec. Decocti salep (ex ʒj parati),
ʒvj.

Vitelli ovi, nro.j.

Tincturae opii simplicis, ʒj.

M. S. Zu drey Klystieren.

Rec. Terebinthinae laricinae, ʒß.

Vitelli ovi, numer.j.

Electuarii theriacae, ʒß.

Lactis vaccini, ʒiv.

M. S. Lauwarm zu geben.

(van Swieten.)

Rec. Foliorum nicotianae virginianae,
ʒj — ʒj).*

Infunde aquae fervid. q. s. ad colatur.
ʒvij.

Adde

Olei lini, ʒj.

M. S. Zu zwey Klystieren. (Bey ein-
geklemmten Brüchen, heftigen Kräm-
pfen.)

*) Größere Quantitäten des Tabaks, wie sie in
den meisten Handbüchern angegeben werden,
sind gefährlich.

Rec. Foliorum siccatorum belladonnae,
gr. xij.

Infund. aqu. fervid. ℥vj.

Cola. S. Zum Klystier. (Bey Krämpfen der Urethra, welche das Einbringen des Katheters verhindern.) (Ratier.)

Rec. Foliorum nicotianae, ℥ß.

Radicum valerianae minoris, ℥ß.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥v.

Adde

Aceti crudi,

Mucilaginis gummi mimosae, sin-
gul. ℥vj.

M. S. Zu einem Klystier, bey Ohnmachten, Scheintod *).

A u f l ö s e n d e.

Rec. Furfuris triticei, ℥j.

Taraxaci totius, ℥iij.

Coque ex aqu. font. ℥xvj ad col. ℥viij.

Sub finem coctionis adde

Flor. chamomill.,

Rad. valerianae minoris.

Cola. S. Zu zwey Klystieren.

(Kämpf's Visperalklystiere, von Berends verbessert. Nach Erforderniß setzt man diesen Klystieren Seife, Asand, Galbanum, mit Eygelb abgerieben, hinzu.)

Rec. Hydrargyri muriatici mitis,

gr. j — gr. iv.

*) Beym Scheintode kann ein stärkerer Tabaksaufguß unmittelbar den Tod herbeyführen.

Pulveris gummi mimosae, ℥ß.

Aquae valerianae, ℥ij.

M. S. Das Glas in warmes Wasser zu setzen, wenn der Inhalt lau geworden ist, in die Spritze gegossen, und derselbe als Klystier beygebracht. (K o p p, gegen schmerzhaftes Hämorrhoidalbeschw., Verdickung des Mastdarms und Askariiden.)

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi, grani sextam, sive tertiam partem ($\text{gr. } \frac{1}{6} - \frac{1}{3}$).

Aquae destillatae, ℥j.

Mucilaginis gummi mimosae, ℥iß.

Opii crudi, gr. j.

Solv. S. Erwärmt als Klystier beyzubringen. (K o p p, gegen heftige Dysenterien, chronische Diarrhöen.)

Stärkende und adstringirende.

Rec. Decocti corticis peruviani (ex ℥ß parati), ℥iv.

Asae foetidae, cum vitello ovi subactae, ℥j.

Camphorae,

Tincturae opii crocatae, sing. ℥j.

M. S. Zum Klystier. (R e i l.)

Rec. Extracti corticis peruviani, ℥ij.

Solve in

Aquae destillatae, ℥iv.

*Adde**Olei olivarum, ℥ß.**Tincturae opii simplicis, gtt. xij.*

M. S. Klystier, gegen Wechselfieber, wenn der Kranke keine Chinarinde nehmen kann. (Lind.)

Rec. Decocti corticis peruviani (ex ℥iß parati), ℥xij.

Camphorae, vitello ovi subactae, ℥j.

M. S. Zu drey Klystieren, gegen Wechselfieber. (Richard.)

Rec. Decocti corticis peruviani (ex ℥ß parati), ℥iv.

Vitelli ovi, nro. j.

Pulveris corticis peruviani regii subtilissimi, ℥iij.

Tincturae opii crocatae, gtt. xij.

M. S. Klystier, gegen bösertige, larvirte oder komitirte Wechselfieber.

(Berends.)

Rec. Radicis bistortae, ℥iij.

Capitum papaveris, ℥ij.

Coque ex aquae ℥xij ad colat. ℥v.

S. Zu einem Klystier. (Richard.)

Bäder (*balnea*).

Örtliche Bäder.

Rec. Florum chamomillae,

— *sambuci, singul. ℥iß.*

Concisa misce. S. Mit Wasser angebrüht, zum Insessus. (Beren d s.)

Rec. Furfurum tritici,
Seminis sinapis contusi, sing. ℥ij.

M. S. Zum Fußbade.

Rec. Seminis sinapis contusi, ℥ij.
Natri carbonici crudi, ℥i℔.

M. S. Zu einem Fußbade.

Rec. Acidi nitrici venalis, ℥iij.
 — *muriatici venalis, ℥j.*

M. S. So viel davon in das Fußbad zu gießen, daß es dem Geschmacke nach einem schwachen Essig gleichkommt. Die Dauer des einzelnen Fußbades beträgt eine halbe bis ganze Stunde. Man wiederholt die Bäder täglich oder einen Tag um den andern. Wenn sie heftig wirken oder Exkorationen hervorbringen, setzt man sie einige Zeit aus. (Von Scott gegen Leberkrankheiten, chronische Gelbsuchten, Gallenkrankheiten, eingewurzelte und depravirte Syphilis empfohlen. Lavagna benutzte sie mit auffallendem Erfolg gegen eine chronische Leberentzündung. Auch dergleichen allgemeine Bäder sind vorgeschlagen worden, welche ich aber für sehr gefährlich halte.)

Allgemeine Bäder.

Rec. Calcariae muriaticae, ℥℔.
Aquae destillatae simplicis, ℥iv.

Solv. Det. in triplo. S. Zu drey Bädern. (Ich habe diese Bäder mit grossem Nutzen gegen die hartnäckige Skrofelkrankheit und gegen chronische Exantheme und Hautkrankheiten angewendet. Sie werden noch wirksamer, wenn man zu jedem Bade zwey bis vier Pfunde Kochsalz hinzusetzt.)

Rec. Kali sulphurati, ℥℔ — ℥i℔.

Detur in triplo in lagenulis rite clausis. S. Eine Portion zu einem jeden Bade. (Soll das hydrothionsaure Gas entwickelt werden, so mischt man, nachdem sich die Schwefelleber aufgelöst hat, dem Badewasser noch ℥j — ij verdünnte Schwefel- oder Salzsäure bey.)

Rec. Globulorum tartari martiati pulveratorum, ℥℔ — ℥ij.

Detur in quadruplo. S. Eine Portion, mit einem Quart Wasser bis zur Auflösung gekocht, dem Bade beyzumischen.

Rec. Liquoris ferri muriatici, ℥℔ — ℥i℔.

Detur in quadruplo. S. Eine Portion dem Bade beyzumischen.

Rec. Herbae melissae,

— *menthae piperitae, sing.*
℥ij.

Florum lavandulae,

— *chamomillae, singul. ℥j.*

Concisa, mixta S. Zu einem Bade, mit 3 Quart Wasser angebrüht.

(Herrmann.)

Rec. Herbae menthae piperitae,
Florum lavandulae, singul. ℥ij.
Radicis calami aromatici,
Corticis salicis laureae, sing. ℥i℔.
Seminis carvi, ℥j.

C. C. M. S. Wie das Vorige.
 (Berends.)

Rec. Florum lavandulae,
Herbae rorismarini, singul. ℥ij.
Radicis calami aromatici,
Corticis hippocastami, sing. ℥i℔.
Conc. M. S. Wie das Vorige.

Vorschriften zu Arzneyformeln für Kinder unter 10 Jahren.

Pulverformeln.

Abführende Mittel.

Rec. Radicis rhei optimi, gr. v — xv.
Magnesia carbonicae, gr. v.
Elaeosacchari foeniculi, gr. x.

M. f. pulv. S. Des Morgens auf einmal zu nehmen. (Berends, für Kinder v. 1 bis 8 Jahren.)

Rec.

Rec. Radicis jalappae, gr. vj — x.
Hydrargyri muriatici mitis,
gr. j — iiij.

Elaeosacchari foeniculi, gr. x.

M. f. pulv. S. Des Morgens auf einmal zu nehmen. (Für Kinder von 4 bis 8 Jahren.)

Rec. Resinae jalappae, gr. iß — gr. iiij.
Amygdalarum dulcium excortica-
tarum,

Sacchari albi, singulor. gr. x.

Conterantur exactissime. S. In lau-
 warmer Milch auf einmal zu nehmen.
 (Vogler.)

Auflösende und absorbirende
 Mittel.

Rec. Radicis rhei optimi,
 — *iridis florentinae, singul.*
ῥj.

Magnesia carbonicae, ῥj.

Olei foeniculi, gtt. j.

Misce f. pulv. S. Messerspitzenweise.
 (Ribke, für Säuglinge.)

Rec. Natri carbonici depurati, ῥß.

Radicis rhei optimi, ῥj.

Elaeosacchari foeniculi, ῥij.

M. f. pulv. S. Drey- bis viermal täg-
 lich eine Messerspitze voll.

Rec. Radicis ipecacuanhae, gr. iiij.

Lapidum cancrorum, ῥiß.

Sacchari albi, ῥij.

M. f. pulv., div. in xij part. aegu. S.
Dreystündlich ein Pulver. (Wendt, bey
gastrischen Fiebern.)

Rec. Hydrargyri stibiato-sulphurati,
3ß — 3iß.

Lapidum cancrorum praeparato-
rum, 3j.

Elaeosacchari foeniculi, 3ij.

M. f. pulv. S. Dreymal täglich eine
Messerspitze voll. (Berends, gegen
Skrofeln und skrofulöse Exantheme.)

Rec. Hydrargyri oxydulati nigri, gr.ij.
Sacchari albi,

Magnesiae carbonicae, sing. gr.xv.

M. f. pulv., divid. in sex part. aequal.
S. Zwey- oder dreymal täglich ein Pul-
ver. (Gegen Syphilis der Neugeborenen.)

Rec. Hydrargyri muriatici mitis, gr.ijj.
Herbae digitalis purpureae, gr.iv.
Sacchari albi, 3j.

M. f. pulv., divid. in duodecim part.
aequal. S. Zweymal täglich ein Pul-
ver. (Berends, gegen chronischen
Wasserkopf.)

Krampfstillende Mittel.

Rec. Radicis valerianae minoris, 3j.

— *iridis florentinae, 3iß.*

— *glycyrrhizae, 3ij.*

Seminis anisi, 3ß.

Croci, gr.vij.

Magnesiae carbonicae, 3j.

M. f. pulv. S. Eine bis zwey Messerspitzen voll einigemal täglich. (Hufeland's Kinderpulver.)

*Rec. Radicis valerianae minoris,
Lapidum cancrorum,
Cornu cervi praeparati,
Visci querni, singul. ʒj.*

M. f. pulv. S. Messerspitzenweise.
(Hufeland.)

*Rec. Zinci oxydati albi, gr. iij — vj.
Radicis valerianae minoris,
Sacchari albi, singul. ʒß.*

M. f. pulv., divid. in sex part. aequal.
S. Dreystündlich ein Pulver. (Berends, gegen den Keuchhusten.)

*Rec. Moschi genuini, gr. ix.
Sulphuris stibiati aurantiaci,
Zinci oxydati albi, singul. gr. iij.
Sacchari albi, ʒß.*

M. f. pulv., divid. in sex part. aequal.
S. Zweystündlich ein Pulver. (Hinze, gegen den Keuchhusten.)

Rec. Radicis belladonnae, grana duo
(gr. ij).
— ipecacuanhae, gr. iß — ij.
Sulphuris depurati, gr. xxxij.
Sacchari lactis, gr. viij.

M. f. pulv., divid. in octo part. aequ.
S. Viermal täglich ein Pulver. (Kopp, gegen den Keuchhusten.)

Rec. Moschi genuini, grana tria
(gr. iij).

Opii crudi, granum dimidium
(gr.ß).

Gummi mimosae, ℥j.

Sacchari albi, ℥j.

M. f. pulv., divid. in sex part. aequal. *Signa.* Dreystündlich ein Pulver.
(Gölis, gegen den Keuchhusten.)

Anmerk. Die Gabe des Opiums, dessen Gebrauch doch bey Kindern die allergrößte Vorsicht erheischt, ist in obiger Formel nicht gering, und muß daher, wenn Kinder unter 3 bis 4 Jahren davon Gebrauch machen sollen, um die Hälfte, ja auf den vierten Theil verringert werden.

Rec. Extracti lactucae virosae, grana
tria ad sex (gr. iij — vj).

Sacchari lactis, ℥ij.

M. f. pulv., divid. in duodecim part. aequal. *S.* Zweystündlich ein Pulver zu geben. (Gumprecht, gegen den Keuchhusten.)

Stärkende Mittel.

Rec. Ferri pulverati, gr. iij — xij.

Concharum praeparatarum,

Elaeosacchari flavedinis citri, singul. ℥ß.

M. f. pulv., divid. in sex part. aequal.

S. Zweymal täglich ein Pulver. (Berends, gegen Rhachitis.)

Rec. Ferri pulverati,

Resinae guajaci nativae, sing. ℥ß.

Concharum praeparatarum, ʒß.

Sacchari albi, ʒij.

M. f. pulv. S. Zweymal täglich eine reichliche Messerspitze voll.

(Gölis.)

Rec. Extracti myrrhae aquosi, gr.xij.

Lapidum cancrorum praeparatorum, ʒß.

Sacchari albi, ʒiß.

M. f. pulv., divid. in xij part. aequal.

S. Dreystündlich ein Pulver. (Wend t, im asthenischen Schleimfluß nach dem Keuchhusten.)

Rec. Ferri oxydulati nigri, gr.xij.

Elaeosacchari macidis, ʒij.

M. f. pulv., divid. in xij part. aequal.

S. Dreymal täglich ein Pulver zu geben. (Wend t, gegen asthenische Skrofelkrankheit und Rhachitis.)

Rec. Hydrargyri muriatici mitis, gr.vj.

Pulveris herbae majoranae, ʒij.

M. f. pulv. S. Niesepulver, beym chronischen Wasserkopf anzuwenden.

(Wend t.)

Lecksäfte.

Brechenerreger.

Rec. Radicis ipecacuanhae, gr.xviiij.

Syrupi althaeae, ʒiß.

M. S. Gut umgeschüttelt, stündlich einen Theelöffel bis zur Wirkung.
(W e n d t.)

Abführende.

Rec. Olei amygdalarum recens expressi, ℥℥.

Mellis, q. s. ad subactionem.

Syrupi mannati, ℥℥.

M. f. linct. S. Zu einem bis zwey Theelöffeln voll, gut umgeschüttelt, zu geben.
(K ä m p f.)

Rec. Tincturae rhei aquosae,

Sacchari albi, singul. ℥vj.

Aquae foeniculi, ℥j.

M. S. Theelöffelweise. (R i b k e's Kindersäftchen, auch zur Ausleerung des Mekoniums.)

Rec. Saponis medicati, ℥j.

Syrupi rhei, ℥j.

Solv. Sign. Theelöffelweise zu geben.
(F u l l e r.)

Rec. Kali tartarici, gr. vj — viij.

Syrupi mannati, ℥℥.

Olei amygdalarum recens expressi, ℥j.

M. f. linct. S. Zwey- oder vierstündlich einen Theelöffel voll. (K ä m p f's Abführsaft für Neugeborne.)

Rec. Tartari natronati, ℥℥.

Sacchari lactis, ℥ij.

Syrupi simplicis,

Aquae foeniculi, singul. ℥j.

M. S. Gut umgeschüttelt, einen Theelöffel voll. (Berends Abführmittel für Neugeborne.)

Demulzirende Mittel.

Rec. Lycopodii, ℥j — ℥iij.

Syrupi althaeae, ℥i℔.

M. S. Drey- bis viermal einen Theelöffel voll. (Berends, gegen Harnverhaltung oder Harnstrenge.)

Erregende Mittel.

Rec. Aquae petroselini,

Syrupi rhei, singul. ℥j.

Spiritus muriatico-aetherei, ℥℔.

M. S. Stündlich einen Theelöffel voll. (Wendt's diuretisches Säftchen.)

Rec. Spiritus muriatico-aetherei, ℥j.

Syrupi rhoeados, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen bis zwey Theelöffel. (Werlhoff, gegen den Keuchhusten.)

Rec. Acidi benzoici, gr. viij.

Liquoris ammonii anisati, ℥℔.

Vini stibiati, ℥ij.

Syrupi senegae,

Oxymellis scillitici,

Syrupi althaeae, singul. ℥iij.

M. S. Stündlich oder zweystündlich einen Theelöffel. (Ich habe diese Mi-

schung gegen steckflußsähnliche Zufälle
kleiner Kinder mit Erfolg gebraucht.)

Aufgüsse.

Abführende Mittel.

Rec. Foliorum sennae, ʒß — ʒiß.
Infunde aqu. fervid. q. s. ad colat. ʒij.
Adde

Tartari natronati, ʒij.

Mannae, ʒß.

Elaeosacchari foeniculi, ʒiij.

Solv. S. Zweystündlich einen Eßlöffel
bis zur Wirkung. (Abführmittel für Kin-
der von 4 bis 6 Jahren.)

Rec. Radicis rhei optimi, ʒß — ʒiß.

Natri carbonici, ʒj.

Infunde aqu. fervid. q. s. ad colat. ʒiij.
Adde

Elaeosacchari anisi, ʒiij.

Solv. S. Eßlöffelweise bis zur Wirkung.
(Stärkendes Abführmittel.)

Auflösende Mittel.

Rec. Radicis ipecacuanhae, ʒß.

Infunde aqu. fervid. q. s. ad col. ʒiß.

Adde

Syrupi rubi idaei, ʒj.

M. S. Stündlich einen Theelöffel voll.
(Schlesinger, gegen das Scharlach-
fieber.)

Rec. Radicis senegae, ʒiβ.

Infunde aqu. fervid. q. s. ad colat. ʒiv.

Adde

Vini stibiati, ʒij.

Syrupi althaeae, ʒj.

M. S. Zweystündlich einen kleinen Eß-
löffel voll. (Wendt, im zweiten Sta-
dium des Kroup.)

Rec. Radicis senegae, ʒiβ.

Infunde aqu. fervid. q. s. ad colat. ʒiv.

Digere per horam. In colatura solve

Kali carbonici depurati, ʒj—ʒβ.

Gummi mimosae, ʒj.

Adde

Syrupi althaeae, ʒiβ.

M. S. Stündlich oder zweystündlich ei-
nen Eßlöffel voll. (Mit grossem Nutzen
habe ich diese Verbindung im zweyten
Stadium des Kroup, wo schon eine läh-
mungsartige Affektion der Lungen be-
ginnt, so wie auch in den späteren Zeit-
räumen des Keuchhustens angewendet.)

Rec. Herbae violae tricoloris, ʒij.

Infunde aqu. fervid. q. s. ad colat. ʒij.

Adde

Vini stibiati, ʒj.

Syrupi althaeae, ʒβ.

M. S. Zweystündlich einen halben Eß-
löffel. (Jahn, gegen Ansprung, Grind.)

*Rec. Herbae digitalis purpureae, grana octo (gr. viij).
Infunde aquae fervid. q. s. ad colatur. ℥iij.*

Adde

Liquoris kali acetici,

Syrupi althaeae, singul. ℥ß.

M. S. Dreymal täglich einen Thee- oder halben Eßlöffel. (Wend t, gegen die floride Skrofelkrankheit.)

Diuretische Mittel.

*Rec. Ipecacuanhae radice, ℥ß — ℥ß.
Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥vj.*

Adde

Spiritus nitrico-aetherei, ℥j — ℥j.

Succi juniperi inspissati, ℥j.

Solv. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll. (Wend t, gegen asthenische Wassersucht nach Scharlach.)

Rec. Radicis serpentariae,

Corticis peruviani regii, singul.

℥j — ℥ij.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥iv.

Solve

Tartari boraxati, ℥iß — ℥ij.

Spiritus nitrico-aetherei, ℥ij.

Syrupi corticum aurantiorum, ℥v.

Succi juniperi inspissati, ℥iij.

M. S. Zweystündlich einen halben bis ganzen Eßlöffel. (Kopp, gegen asthenische Wassersuchten.)

Rec. Radicis helenii, ʒj.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ʒiv.

Adde

Kali carbonici, aceto scillitico saturati, ʒß.

Syrupi florum aurantii, ʒß.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.
(Wend t, gegen asthenische Wassersucht nach Scharlach.)

Anthelminthisches Mittel.

Rec. Radicis valerianae minoris,

Seminis santonici, singul. ʒij.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ʒiv.

Adde

Extracti nucum juglandis,

Spiritus sulphurico-aetherei,

Tincturae corticum aurantium,
singul. ʒß.

Syrupi corticum aurantium, ʒß.

M. S. Zweystündlich einen Kinderlöffel voll.
(Henke.)

Krampfstillende und erregende Mittel.

Rec. Radicis valerianae minoris, ʒij.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ʒiv.

Adde

Liquoris ammonii succinici, ʒj.

Syrupi florum aurantii, ʒj.

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel.
(Wend t, in asthenischen Blattern.)

Rec. Radicis valerianae minoris, ℥ij.
Infunde aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥iv.

Adde

Moschi genuini, gr. viij.

Liquoris ammonii succinici, ℥ij.

Tincturae ambrae, ℥ij.

Syrupi florum aurantii, ℥℔.

M. S. Halbstündlich zwey Theelöffel voll. (Wend t, gngen Millar'sches Asthma.)

Rec. Radicis calami aromatici, ℥℔.

Infunde aqu. fervid. q. s. ad col. ℥iij.

Adde

Gummi mimosae, ℥j.

Sacchari albi, ℥ij.

Solv. S. Zweystündlich einen Theelöffel voll. (Wend t, gegen Verdauungsschw. und asthenischen Durchfall.)

Rec. Radicis galangae,

— rhei optimi, singul. ℥j.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥vj.

Adde

Ammonii muriatici martiati,

gr. xij.

Elaeosacchari menthae piperitae,
℥℔.

Solv. S. Dreystündlich einen mälsigen Eßlöffel voll. (Wend t, gegen Verdauungsschwäche u. chronischen Durchfall.)

Rec. Corticis peruviani regii, ℥℔.

Infund. aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥iij.

Adde

Extracti ligni campechiensis, ℥j.

Aquae cinnamomi simplicis,

Syrupi florum aurantii, sing. ℥ß.

M. S. Zweystündlich einen Kinderlöffel.

(Wend t, gegen asthenisch-chronische Diarrhöe.)

Abkochungen.

Rec. Pulpae tamarindorum, ℥j — ℥ij.

Coque ex aquae fontan. q. s. per dimid. horam ad colat. ℥vj.

Adde

Syrupi mannati, ℥j.

Misce. Signa. Stündlich einen Eßlöffel.

(Wend t's Abführmittel in entzündlichen Blattern.)

Rec. Corticis peruviani regii, ℥ß.

Coque ex aqu. ℥vij ad colat. ℥iv.

Adde

Elaeosacchari foeniculi, ℥ß.

Solv. S. Zweystündlich einen halben Eßlöffel voll.

Rec. Corticis peruviani regii, ℥ß.

Coque ex aqu. ℥x ad colat. ℥vj.

Sub finem coctionis adde

Florum cassiae, ℥iß.

Colaturae admisce:

Syrupi florum aurantii, ℥ß.

Misce. S. Zweystündlich einen Eßlöffel
(Kinderlöffel?) voll. (Wend t, in asthe-
nischen Fiebern.)

Rec. Corticis peruviani regii, ℥iij.

Coque ex aqu. ℥v ad colat. ℥iij.

Adde
Extracti corticis peruviani frigide
parati, ℥ij.

Syrupi corticum aurantiorum, ℥℔.

M. S. In der fieberfreyen Zeit stündlich
oder zweystündlich einen Kinderlöffel.
(Berends, gegen Wechselfieber zarter
Kinder.)

Mixturen, Schütteltränkchen.

Brechmittel.

Rec. Vini stibiati, ℥℔.

Oxymellis scillitici,

Syrupi althaeae, singul. ℥iij.

M. S. Viertelstündlich einen Theelöffel
bis zur Wirkung. (Berends, Brech-
mittel für kleine Kinder.)

Rec. Radicis ipecacuanhae pulveratae,
gr. x — xx.

Vini stibiati, ℥j.

Aquae, ℥ij.

Oxymellis squillitici,

Syrupi rubi idaei, sing. ℥℔.

M. S. Gut umgeschüttelt, viertelstündlich einen Theelöffel bis zur Wirkung.
(Armstrong.)

Abführende Mittel.

Rec. Olei ricini, ℥iij — ℥vj.

Gummi mimosae, q. s.

Aquae foeniculi, ℥ij.

Syrupi mannati, ℥j.

F. l. a. mixtur. S. Kinderlöffelweise bis zur Wirkung. (Berends.)

Rec. Electuarii e senna, ℥ij — ℥℔.

Tartari natronati, ℥i℔.

Aquae foeniculi, ℥i℔.

Syrupi rubi idaei, ℥j.

M. Solo. S. Umgeschüttelt, zweystündlich einen reichlichen Kinderlöffel bis zur Wirkung. (Wirkt sehr sicher.)

Auflösende Mittel.

Rec. Kali carbonici aciduli, ℥℔.

Tincturae rhei aquosae, ℥℔.

Aquae foeniculi, ℥iij.

Syrupi simplicis, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen Kinderlöffel.
(Bey gastrischen Affektionen.)

Rec. Aquae foeniculi, ℥j.

Tincturae rhei aquosae,

Syrupi mannati, singul. ℥℔.

Lapidum cancrorum praeparatorum, ℥j.

M. S. Gut umgeschüttelt, zweystündlich einen Theelöffel voll. (Gegen den Icterus.)

Rec. Magnesia carbonicae, ℥ ij.

Pulveris radices rhei, ℥ j.

Aquae foeniculi, ℥ iß.

Syrupi simplicis, ℥ ß.

M. S. Umgeschüttelt, theelöffelweise. (Berends, gegen Magensäure.)

Rec. Sulphuris depurati, gr. ix — ℥ j.

Mucilaginis gummi mimosae, ℥ vij.

Sacchari albi, ℥ ß.

Aquae rosarum, ℥ j.

M. S. Stündlich, gut umgeschüttelt, einen Theelöffel voll. (Kopp.)

Diuretische Mittel.

Rec. Liquoris kali acetici, ℥ ß.

Aquae petroselini, ℥ iß.

Sacchari albi, ℥ ij.

Solv. M. Drey- bis viermal täglich einen Theelöffel voll. (Wendt.)

Rec. Terebinthinae laricinae, ℥ j.

Mucilaginis gummi mimosae, ℥ ß.

Aquae petroselini, ℥ iv.

Syrupi simplicis, ℥ j.

F. l. a. mixtur. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll. (Wendt, gegen asthen. Wassersuchten.)

Diaphoretische Mittel.

Rec. Liquoris ammonii acetici, ℥ij—℥℞.

Aquae foeniculi, ℥ij.

Syrupi rubi idaei, ℥j.

Vini stibiati, ℥j.

(Oxymellis scillitici, ℥℞.)

M. S. Zweystündlich einen Kinderlöffel voll. (Berends.)

Erregende und reizende Mittel.

Rec. Asae foetidae, ℥℞.

Moschi genuini, gr. viij.

Mucilaginis gummi mimosae, ℥℞.

Conterantur exactissime, adde

Aquae destillatae simplicis, ℥iij℞.

Sacchari albi, ℥ij.

M. S. Stündlich einen bis zwey Theelöffel voll. (Wendt, gegen Millar'sches Asthma.)

Rec. Moschi genuini, gr. vj.

Ammonii carbonici sicci, gr. iv.

Sacchari albi, ℥iij.

Aquae chamomillae, ℥i℞.

M. exacte. S. Stündlich einen Theelöffel voll. (Wendt, gegen asthenische Krämpfe.)

Rec. Moschi, gr. iij.

Liquoris ammonii succinici, ℥j.

Aquae foeniculi, ℥℞.

Syrupi althaeae, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen Theelöffel voll. (Tortual, bey Krämpfen ganz junger Kinder.)

Rec. Liquoris ammonii succinici, ℥j.

Aquae florum tiliae, ℥ij.

Syrupi florum aurantii, ℥j.

M. S. Halbstündlich einen bis zwey Theelöffel voll. (Wendt, gegen Krämpfe zarter Kinder.)

Rec. Liquoris ammonii pyro-oleosi, 3℔.

Aquae chamomillae, ℥ij.

Syrupi florum aurantii, 3℔.

M. S. Stündlich einen Theelöffel voll. (Wendt, gegen Krämpfe der Säuglinge.)

Rec. Camphorae tritae, gr. iv.

Mucilaginis gummi mimosae,

Syrupi althaeae, singul. 3℔.

Syrupi florum aurantii, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen Theelöffel voll. (Wendt, in asthenischen Fiebern.)

Rec. Ammoniaci, gr. xxiv.

Mucilaginis gummi mimosae, 3℔.

Aquae foeniculi, ℥iv.

Syrupi althaeae, ℥j.

M. S. Dreymal täglich einen Eßlöffel voll. (Wendt, gegen die Lungenschwindsucht nach dem Keuchhusten.)

Rec. Cantharidum, granum unum (gr. j).

Sacchari albi,

Gummi mimosae, singul. ℥ij.

Conterantur exactissime; sensim adde:

Emulsionis amygdalarum, ℥v.

M. S. Zweystündlich einen halben bis ganzen Eßlöffel voll. (Wendt, im zweyten Stadium des Keuchhustens.)

Rec. Aquae melissae, ℥ij.

— *cinnamomi simplicis,*

Syrupi florum aurantii, sing. ℥j.

Tincturae opii crocatae, scrupulum dimidium (Θβ).

M. S. Zweystündlich einen Eßlöffel voll.

(Auf diese Weise soll man, nach Wendt's Versicherung, in den Blättern das Opium ganz sicher bey acht- bis zehnjährigen Kindern anwenden können.)

Rec. Aquae melissae, ℥ij.

Syrupi florum aurantii, ℥j.

Aetheris acetici, gtt. xv.

Tincturae opii crocatae, guttulas quinque (gtt. v).

M. S. Zweystündlich einen Theelöffel voll.

(Diese Mischung gab ich einst einem, von Zahnkrämpfen tödtlich erschöpften, dreyvierteljährigen zarten Mädchen mit Nutzen.)

Stärkende Mittel.

Rec. Decocti salep tenuioris, ℥ij.

Tincturae rhei aquosae, ℥ij.

Aquae cinnamomi, ʒß.

Sacchari albi, ʒij.

Solv. *M. S.* Stündlich zwey Theelöffel voll. (Wend t, gegen chronische Durchfälle.)

Rec. *Extracti nucum juglandis*, ʒij.

Tincturae ferri pomatae, ʒiij.

Aquae menthae crispae, ʒij.

Sacchari albi, ʒiij.

Solv. *Misce.* *S.* Drey mal täglich einen Kinderlöffel voll. (Berends, nach Wurmkrankheiten.)

Auflösungen und Tränkchen.

Schwächende und temperirende Mittel.

Rec. *Kali carbonici depurati*, ʒß — ʒj.

Satura c. succi citri recens expressi, q. s.

Adde

Aquae destillatae simplicis, ʒij.

Syrupi rubi idaei, ʒj.

(*Vini stibiati*, ʒj.)

M. S. Zweystündlich einen halben oder ganzen Kinderlöffel voll. (Berends, temperirendes Mittel.)

Rec. *Ammonii carbonici sicci*, ʒj — ʒj.

Acidi nitrici puri, q. s. *ad exactam saturationem*,

Aquae destillatae simplicis,

℥ij — ℥iij.

Syrupi althaeae, ℥j.

M. S. Zweystündlich einen Kinderlöffel voll.

(Berends empfahl das salpetersaure Ammonium als temperirendes Mittel in verschiedenen Reiz- und exanthematischen Fiebern, auch als ein Diuretikum in erethistischen Wassersuchten.)

Rec. Kali tartarici, ℥i℥ — ℥iij.

Decocti hordei, ℥iij.

Syrupi althaeae, ℥j.

Solv. M. S. Zweystündlich einen Kinderlöffel voll. (Wend t.)

Rec. Aquae oxymuriaticae, ℥iij.

— *rubi idaei,* ℥i℥.

Mucilaginis seminis cydoniorum,

Syrupi althaeae, singul. ℥vj.

M. S. Stündlich oder zweystündlich einen Thee- oder Kinderlöffel. (Kopp, in Reizfiebern, besonders im Scharlach-, Zahnfieber, für Kinder von 3 — 5 Jahren.)

Rec. Magnesiae sulphuricae, ℥ij.

Mannae, ℥j.

Emulsionis amygdalarum, ℥iv.

Solv. S. Zweystündlich einen Kinder- oder Eßlöffel voll. (Wend t, antiphl. Abführmittel, z. B. bey Hirnentzündung.)

Auflösende Mittel.

Rec. Ammonii muriatici depurati,
 ʒß — ʒj.

Gummi mimosae, ʒij.

Aquae foeniculi, ʒiv.

Sacchari albi, ʒß.

Solv. S. Zweystündlich einen Kinderlöffel voll. (Berends.)

Rec. Boracis, ʒj — ʒß — ʒij.

Aquae foeniculi, ʒij.

Syrupi althaeae, ʒj.

Solv. S. Zweystündlich einen Theelöffel voll. (Berends, bey Magensäure, Schwämmchen.)

Rec. Extracti conii maculati, gr.ij—vj.

Aquae melissae, ʒij.

Tincturae rhei aquosae, ʒj.

Solv. S. Drey mal täglich einen halben Eßlöffel voll. (Hecker, gegen skrofulöse Atrophie.)

Rec. Boracis, ʒß.

Extracti dulcamarae, ʒj — ʒij.

— *nucum juglandis,* ʒiß.

Aquae menthae crispae, ʒiij.

Syrupi florum aurantii, ʒj.

Solv. S. Drey mal täglich einen Thee- oder Kinder-, auch wol einen Eßlöffel. (Bey chronisch asthenischen Mesenterial-skrofeln und skrofulöser Atrophie habe ich diese Verbindung mit Erfolg angewendet.)

Rec. Kali acetici, ʒiʒ.

Aquae foeniculi, ʒij.

Tincturae rhei aquosae, ʒß.

Sacchari albi, ʒiiij.

Solv. S. Drey mal täglich einen Thee- oder Kinderlöffel voll. (Berends.)

Erregende Mittel.

Rec. Natri carbonici aciduli, ʒß.

Aquae destillatae simplicis, ʒiʒ.

Syrupi rubi idaei, ʒß.

Solv. S. Einen halben Eßlöffel voll mit einem halben Theelöffel Zitronensaft zu geben. (Brausemischung für Kinder.)

Rec. Aetheris acetici, gtt.xv.

Aquae florum aurantii, ʒj.

— *cinnamomi simplicis, ʒß.*

Syrupi simplicis, ʒiʒ.

M. Signa. Thee- und kinderlöffelweise. (Analeptisches Mittel.)

Rec. Elaeosacchari juniperi, ʒij.

Aquae petroselini, ʒiv.

Syrupi althaeae, ʒß.

Solv. S. Zweysündlich einen Kinder- oder Eßlöffel. (Wendt, in asthenisch. Wassersuchten.)

Reizende Mittel.

Rec. Ammonii carbonici sicci, gr. x.

Aquae destillatae simplicis,

Aquae menthae piperitae, singul.
 $\bar{z}$ iß.

Syrupi althaeae, $\bar{z}$ iß.

Solv. S. Stündlich oder zweystündlich einen Thee- oder Kinderlöffel. (In hoch asthenischen Fiebern.)

Rec. Kali hydriodici, grana quinque
(gr. v).

Extracti nucum juglandis,

— *rhei aquosi, singul. $\bar{z}$ j.*

Aquae foeniculi, $\bar{z}$ iß.

Syrupi corticum aurantium, $\bar{z}$ ß.

Solv. S. Zwey- bis höchstens dreymal täglich einen Theelöffel voll. (In der eingewurzelten, fieberlosen Skrofelkrankheit mit dem Charakter des Torpors habe ich dieses Mittel mit auffallendem Erfolg angewendet.)

Tonische und stärkende Mittel.

Rec. Acidi sulphurici diluti, $\bar{z}$ ß.

Aquae destillatae simplicis, $\bar{z}$ iv.

Syrupi rubi idaei, $\bar{z}$ j.

M. S. Zweystündlich einen Kinderlöffel voll. (Wendt.)

Rec. Chininii sulphurici, grana sex
(gr. vj).

Kali acetici, $\bar{z}$ j.

Aquae foeniculi, $\bar{z}$ j.

Syrupi florum aurantium, $\bar{z}$ j.

Solv. S. In der fieberfreyen Zeit stündlich oder zweystündlich einen Thee- oder Kin-

Kinderlöffel. (Auf diese Art habe ich stets das schwefelsaure Chinin bey Kindern angewendet. In Pulverform gereicht, verursacht es leicht Erbrechen.)

Rec. Extracti corticis peruviani frigide parati, ℥i℥.

Extracti ligni campechiensis, ℥j.

Boracis, ℥℥.

Decocti salep tenuioris, ℥iv.

Syrupi althaeae, ℥j.

Solv. S. Stündlich oder zweystündlich einen bis zwey Theelöffel voll. (Lentin, gegen asthenische oder brandige Schwämmchen.)

Rec. Extracti corticis peruviani frigide parati, ℥j.

Gummi mimosae, ℥ij.

Aquae florum tiliae, ℥iij.

Spiritus nitrico - s. muriatico - aetherei, ℥℥.

Syrupi corticum citri, ℥j.

Solv. S. Stündlich zwey Theelöffel voll zu nehmen. (Wendt, gegen asthenische Aphthen.)

Rec. Extracti columbo, ℥j.

Decocti salep tenuioris, ℥iij.

Elaeosacchari foeniculi, ℥ij.

Solv. S. Viermal täglich einen bis zwey Theelöffel. (Wendt, gegen chronische Diarrhöe.)

Tropfenmixturen.

Auflösende Mittel.

*Rec. Extracti hyoscyami, scrupulum
dimidium (℥℥).*

Vini stibiati, ℥ij.

Solv. S. Zwey- bis dreystündlich fünf bis zehn Tropfen. (Kinder unter einem Jahre dürfen nicht mehr als zwey Gran des Bilsenkrautextrakts täglich bekommen, (Hufeland, gegen den Keuchhusten).)

*Rec. Barytae muriaticae, drachmam
dimidiam (℥℥).*

Aquae destillatae simplicis, ℥j.

Solv. S. Einmal täglich 10 — 40 Tropfen. (Hufeland.)

Rec. Calcariae muriaticae, ℥℥.

Extracti dulcamarae,

— *nucis juglandis, singul.
℥j.*

Aquae cinnamomi, ℥j.

Solv. S. Zweymal täglich 10 — 60 Tropfen. (Hat mir in der torpiden Skrofelkrankheit treffliche Dienste geleistet.)

Krampfstillende Mittel.

*Rec. Liquoris ammonii pyro-oleosi, ℥j.
Aceti squillitici, ℥i℥.*

Syrupi mannati, ℥ij.

*Tincturae opii simplicis, guttu-
las duas (gutt. ij).*

M. S. Zwey- oder dreystündlich zehn bis funfzehn Tropfen. (Henke, bey Harnverhaltung. Erheischt aber, obgleich der Gehalt an Opium nur sehr gering ist, dennoch grofse Vorsicht.)

Stärkende Mittel.

Rec. Extracti nucum juglandis, ʒij.

Aquae cinnamomi, ʒvj.

Solv. S. Viermal täglich 40 — 60 Tropfen. (Rosenstein.)

Rec. Extracti ferri pomati, ʒij.

Aquae foeniculi, ʒj.

Solv. S. Dreymal täglich 10 — 50 Tropfen in Zuckerwasser. (Berends.)

Rec. Tincturae ferri pomatae,

— aromatica, sing. ʒß.

M. S. Dreymal täglich 30 Tropfen.

(Wendt.)

Getränke.

Schwächende und temperirende.

Rec. Kali carbonici depurati, ʒiß.

Satura succi citri recens expressi, q. s.

Adde

Decocti hordei, libr.iß.

Syrupi rubi idaei, ʒiß.

M. S. Zum Getränk.

Rec. Tartari depurati, ℥i℔.

*Coque per quart. horae partem cum
Aquae fontanae, libr. ij.*

Adde

Syrupi ribium, ℥i℔.

M. S. Zum Getränk.

*Rec. Succı recentis malorum aurantio-
rum Sinensium, ℥ij.*

Aquae decoctae, libr. i℔.

Sacchari, ℥j.

M. S. Zum Getränk.

Auflösende.

Rec. Herbae violae tricoloris, ℥℔.

Coque ex aqu. ℥xvj ad colat. ℥xij.

Adde

Lactis vaccini, ℥vj.

Sacchari, q. s. ad gratiam.

*M. S. Lauwarm tassenweise zu geben.
(Gegen Milchschorf und andre Aus-
schläge.)*

Rec. Radicis graminis, ℥j.

Tartari depurati, ℥j.

Coque ex aquae ℥xxiv ad reman. ℥xvj.

Adde

Sacchari albi, ℥j.

M. S. Zum Getränk.

Erregende und stärkende.

Rec. Panis domestici tosti, ℥j.

Infunde aquae fervidae, ℥xviij.

*Colaturae adde**Syrupi corticum aurantium, ℥i℔.**M. S.* Zum Getränk, nicht allzureichlich anzuwenden.*Rec. Aquae fontanae decoctae, ℥xviij.**Acidi sulphurici diluti, ℥℔.**Syrupi rubi idaei, ℥i℔.**M. S.* Zum Getränk.

Mundwasser und Injektionen.

Das eigentliche Gurgeln verstehen wol nur die wenigsten Kinder, und selbst diejenigen Mittel, welche zum Ausspülen des Mundes oder zu Injektionen in den hintern Theil des Mundes dienen sollen, dürfen keine heftig wirkende Mittel enthalten, da die Kleinen doch immer mehr oder weniger davon verschlucken. Hier werden eigentlich nur diejenigen Mundwasser und Injektionen angeführt, welche bey böartigen oder brandigen Halsentzündungen oder Aphthen dienlich sind.

*Rec. Herbae salviae, ℥℔.**Infunde aquae fervid. q. s. ad col. ℥vj.**Adde**Aquae oxymuriaticae, ℥℔.**Mellis rosati, ℥j.*

M. S. Zum Ausspülen des Mundes und zu Injektionen bey asthenischen Aphthen und ähnlichen Halsentzündungen.

(Berends.)

Rec. Herbae salviae,

— *scordii, singul. ℥℔.*

Infunde aqu. fervid. q. s. ad colat. ℥vj.

Adde

Acidi muriatici puri, ℥i℔.

Syrupi mororum, ℥ij.

M. S. Zu Einspritzungen. (Enthält wol etwas allzuviel der Salzsäure.) (Wendt, gegen asthenische, brandige Bräune.)

Rec. Corticis quercus, ℥j.

Coque ex aquae ℥xvj ad colat. ℥ix.

Adde

Spiritus camphorati,

Mellis rosati, singulor. ℥i℔.

M. S. Zu Einspritzungen. (Wendt, gegen brandige Bräune.)

Rec. Camphorae, gr. vj.

Gummi mimosae, q. s.

Extracti corticis peruviani, ℥iij.

Aquae salviae, ℥viij.

M. S. Zu Einspritzungen gegen brandige Halsentzündungen.

Rec. Corticis peruviani regii, ℥j.

Coque ex aquae ℥xv ad colat. ℥viij.

Adde

Spiritus cochleariae, ℥℔.

Tincturae myrrhae, ℥ij.

Mellis rosati, ℥j.

M. S. Bey brandigen Halsentzündungen einzuspritzen. (Wend t.)

Pinselsäfte.

Es sind deren hier nur noch einige anzuführen, da früher (S. 107) mehrere derselben bereits angegeben worden sind.

*Rec. Aquae calcariae ustae,
Syrupi simplicis, singul. ℥ß.*

M. S. Pinselsaft gegen Schwämmchen. (Sehr wirksam.) (Wend t.)

*Rec. Boracis, ℥ij.
Aquae salviae, ℥ij.
Tincturae myrrhae, ℥ij.
Mellis depurati, ℥j.*

M. S. Pinselsaft gegen asthenische Aphthen. (Wend t.)

*Rec. Zinci sulphurici crystallini, ℥ß.
Aquae rosarum, ℥iij.
Syrupi mororum, ℥iß.*

M. Solv. S. Pinselsaft gegen Aphthen. (Berends.)

*Rec. Extracti chinae frigide parati, ℥ij.
Aquae rutae, ℥ij.
Spiritus muriatico-aetherei, ℥ij.
Mellis rosati, ℥j.*

M. S. Pinselsaft gegen die brandige Bräune. (Wend t.)

Salben und Einreibungen.

Rec. Hydrargyri puri, ʒvj.

Sebi ovilli, ʒß.

*Conterantur in mortario lapideo ad
extinctionem hydrargyri;
adde*

Olei cacao, ʒj.

*Formentur inde tabulae. Sign. Graue
Quecksilbersalbe für Kinder.*

(Wend t.)

Rec. Unguenti rosati,

*Olei nucis moschati expressi, sin-
gul. ʒij.*

Mixturae oleoso-balsamicae, ʒj.

Tincturae opii simplicis, ʒß.

*M. f. unguent. S. In den Unterleib ein-
zureiben. (Wend t.)*

Rec. Olei olivarum, ʒj.

— menthae piperitae aetherei,

— carvi aetherei, singul. ʒj.

Tincturae opii crocatae, ʒß.

*M. S. Gewärmt in den Unterleib einzu-
reiben. (Henke.)*

Rec. Medullae ossium tauri, ʒiß.

*Liquatae et depuratae, refrigerataeque
adde:*

Mixturae oleoso-balsamicae, ʒvj.

Balsami indici nigri, ʒiß.

*M. S. Den Rücken, die Brust und die
Gelenke damit einzureiben. (Wend t,
gegen Rhachitis.)*

Rec. Zinci oxydati albi, ℥j.

Hydrargyri ammoniato-muriatici, ℥j.

Unguenti rosati, ℥j.

M. exacte. S. Sälbchen, gegen hartnäckige Ausschläge. (Wend t.)

Rec. Unguenti juniperi, ℥ij.

— *althaeae,*

Acidi muriatici, singul. ℥ß.

M. S. Den Erbgrind zweymal täglich damit einzureiben. (Henke.)

Rec. Unguenti althaeae, ℥ß.

Fellis tauri recentis,

Saponis medicati, singul. ℥iß.

Petrolei,

Ammonii carbonici pyro-oleosi,
singul. ℥iß.

Camphorae, ℥ß.

M. S. Dreystündlich einen Theelöffel voll in den Unterleib einzureiben. (Hufeland, gegen Mesenterialschrofeln.)

Rec. Kali sulphurati, ℥iij.

Saponis, ℥j.

Aquae calcariae ustae, ℥viij.

Spiritus vini rectificati, ℥ij.

Solv. S. Die Grindstellen Morgens und Abends damit zu waschen.

(Barlow.)

Rec. Spiritus lavandulae, ℥ij.

Liquoris ammonii anisati, ℥j.

M. S. Zum Einreiben des Unterleibes.
(v. Siebold.)

Rec. Spiritus lavandulae,
 — *rorismarini, singul. ℥ ij.*
Tincturae aromaticae, ℥ iij.
M. S. Stärkender Spiritus, bey Rhachi-
 tis in den Rücken und in die Gelenke ein-
 zureiben. (Berends.)

B ä d e r.

Rec. Saponis domestici, ℥ iß.
Boli albae pulveratae, ℥ ij.
Olei citri italici, gtt. ij.
M. f. pulv. S. Dem Badewasser beyzu-
 mischen. (Ein sehr angenehmes, erwei-
 chendes Bad.)

Rec. Natri carbonici sicci, ℥ ß.
 — *muriatici, ℥ vj.*
M. S. Zu einem Bade. (Gegen Skro-
 feln.)

Rec. Calcariae muriaticae, ℥ ij.
Liquoris ferri muriatici, ℥ iij.
Aquae destillatae simplicis, ℥ iv.
Solv. S. Zu zwey Bädern. (Ich habe
 diese Bäder in der Skrofelkrankheit mit
 grossem Nutzen angewendet.)

Rec. Herbae serpylli,
 — *absinthii,*
 — *menthae crispae, sing. ℥ j.*
Radici calami aromatici, ℥ ß.
Concisa misce. S. Mit zwey Quart Was-
 ser angebrüht, zu einem Bade.

Rec. Globulorum tartari martiati, ℥i℔.
Corticis salicis pentandrae, ℥iv.
Coque ex aquae libr. vj ad remanent.
libr. iv.

Colaturae refrigeratae adde
Spiritus lavandulae, ℥iij.

M. S. Zu drey stärkenden Bädern.

Klystiere.

Rec. Sacchari albi, ℥iij.
Vitelli ovi, numer. j.
Aquae chamomillae, ℥iij.

M. S. Gewärmt als Klystier anzuwenden. (Gelind ausleerend.)

Rec. Radicis valerianae,
Florum chamomillae, singul. ℥iij.
Infunde aquae fervidae q. s. ad colat.
℥iij.

Adde
Olei chamomillae infusi, ℥j.

M. S. Gewärmt zu einem Klystier. (Krampfstillend.)

Rec. Asae foetidae, gr. xv — ℥j.
Vitelli ovi, q. s.

Aquae chamomillae, ℥iij.

M. S. Zu einem Klystier. (Bey Darmkrämpfen.)

Rec. Radicis symphyti officinalis, ℥iij.
Seminis lini, ℥vj.

Coque ex aquae ℥vij ad colat. ℥iij.

M. S. Zu einem Klystier, lauwarm.
(Hat mir bey asthenischen, chronisch-
ruhrartigen Durchfällen gute Dienste ge-
leistet.)

Rec. Fellis tauri inspissati, ℥ j.

Solve in

Infusi absinthii, ex ℥ ij parati,
℥ iiß.

Adde

Mellis crudi, ℥ ii j.

Olei absinthii aetherei, gtt. j.

M. S. Zu einem Klystier. (Gegen Aska-
riden sehr wirksam.)

Rec. Globulorum tartari martiati, ℥ iß.

Summitatum millefolii, ℥ ß.

Infunde aquae fervidae, q. s. ad colat.
℥ v.

Adde

Mellis rosati, ℥ j.

M. S. Zu zwey kleinen Klystieren. (Ich
habe sie gegen Erschlaffung und Vorfall
des Mastdarms mit Erfolg gebraucht.)

Rec. Radicis valerianae minoris,

Seminis santonici, singul. ℥ ß.

Infunde aqu. fervid., q. s. ad col. ℥ vj.

Adde

Asae foetidae, vitello ovi subactae,
℥ ij.

M. S. Zu zwey Klystieren. (Gegen
Würmer.) (Henke.)

Inhalt.

Erstes Bändchen.

	Seite
E inleitung	1
Von dem Außern des Rezepts . .	2
Von dem materiellen Inhalte des Rezepts und dessen genauerer Bezeichnung	9
Von der genauern Bezeichnung der Arzneysubstanzen	13
Von der genauern Bezeichnung der Arzneyform auf dem Recepte . .	19
Von den Maassen und Gewichten, und deren Bezeichnung auf dem Recepte	27
Von der Bestimmung der Gaben oder Dosen (<i>doses</i>) auf dem Re- cepte	34
Von dem Verfahren, die Arzneyen angenehmer zu machen	41
 Eintheilung der Arzneyformen.	
I. Feste Arzneyformen	48
1) Trockne, feste Arzneyformen.	
Das Pulver (<i>pulvis</i>)	51
Pulver zum innerlichen Gebrauch .	61

Der Ölzucker (<i>elaeosaccharum</i>). . .	63
Pulver zum äußerlichen Gebrauch. . .	65
Grobe Pulver	68
Die Dragée (<i>dragea</i>).	68
Räucherspezies (<i>species ad suffien-</i> <i>dum</i>)	69
Spezies (<i>species</i>)	70
Morsellen (<i>morsuli</i>)	73
Zeltchen (<i>rotulae</i>).	76
Küchelchen (<i>trochisci</i>)	78

2) Festweiche Arzneiformen.

Pillen (<i>pilulae</i>)	79
Der Bissen (<i>bolus</i>)	98
Die Latwerge (<i>electuarium</i>)	102
Die Konserve (<i>conserva</i>)	107
Gallerte (<i>gelatina</i>)	108
Pflaster (<i>emplastrum</i>)	110
Stuhlzäpfchen (<i>suppositorium</i>)	116
Bougies, Wachskerzen (<i>cereoli</i>).	117
Wachssalbe, Ölwachs (<i>ceratum, oleo-</i> <i>ceratum</i>)	118
Salbe (<i>unguentum</i>)	119
Liniment (<i>linimentum</i>).	126
Breyumschlag (<i>cataplasma</i>)	127

II. Flüssige Arzneiformen.

Schleim (<i>mucilago</i>)	132
Lecksaft (<i>linctus</i>)	135
Pinselsaft (<i>litus oris</i>).	137
Ausgepresster Pflanzensaft (<i>succus</i> <i>plantarum expressus</i>)	138
Der Aufguß (<i>infusum</i>).	140
Die Abkochung, der Absud (<i>deco-</i> <i>ctum, αποζήμα</i>)	147
Der Absudaufguß (<i>decocto-infusum</i>)	153

Aufgussabkochung (<i>infuso - deco-</i> <i>ctum</i>)	155
Tisane (<i>ptisana</i>)	156
Molken (<i>serum lactis</i>)	158
Pflanzenmilch (<i>emulsio</i>).	162
Die Öl- und Harzmixtur (<i>mixtura</i> <i>oleosa</i>).	165
Die Mixtur (<i>mixtura</i>)	169
Elixir (<i>elixirium</i>).	178
Auflösung (<i>solutio</i>)	179
Künstliche Mineralwasser (<i>aquae</i> <i>minerales factitiae</i>)	187
Waschwasser (<i>lavacrum, lotio</i>).	188
Bähung (<i>fomentatio, fomentum</i>)	189
Augenwasser (<i>collyrium</i>)	192
Mundwasser, Gurgelwasser (<i>collu-</i> <i>torium, gargarisma</i>)	194
Einspritzung (<i>injectio</i>)	196
Klystier (<i>enema, clyisma, clyster</i>)	197
Bad (<i>balneum</i>).	200
III. Dunst- und gasförmige Arzneiformen.	
Dämpfe	202
Gasarten	205
Alphabetisches Verzeichniß der wichtigeren rohen oder einfa- cheren offizinellen Arzneysub- stanzen, ihrer Zubereitungen u. Gaben, u. Hauptwirkungen	209
Die wichtigeren d. Zeichen, de- ren man sich ehemals auf den Rezepten bediente	305



Zweytes Bändchen.

Feste Arzneiformen.

Pulverformeln. Seite

Zum innerlichen Gebrauch.

Schwächende u temperirende Mittel	1
Auflösende und Digestivmittel . . .	2
Alterirend auflösende Mittel . . .	6
Pulver gegen den Kropf	9
Erregend-reizend auflösende Mittel	10
Brechenenerregende Mittel	12
Abführende und purgirende Mittel .	13
Diuretische Mittel	15
Diaphoretische Mittel	16
Anthelmintische Mittel	16
Besänftigende und krampfstillende Mittel	17
Erregende Mittel	19
Stärkende Mittel	21
Adstringirende Mittel	23
Pulver zum äußerlichen Gebrauch .	24

Spezies, Kräuter.

Erweichende Mittel	27
Auflösende Mittel.	27
Abführende Mittel	29
Diuretische Mittel	30
Diaphoretisch - diuretische oder so- genannte blutreinigende Mittel .	30
Erregende Mittel	31
Stärkende Mittel	33

Morsellen, Zeltchen und Küchelchen.

Temperirende Mittel	34
Absorbirende Mittel	34
Auflösende Mittel	35
Abführende Mittel	36
Anthelmintische Mittel	36
Stärkende Mittel	37

Pillenformeln.

Auflösende Mittel	38
Alterirende Mittel	42
Reizend-auflösende Mittel	46
Abführende Mittel	48
Diuretische Mittel	49
Narkotische Mittel	51
Metallische, umstimmende Mittel	53
Erregende Mittel	55
Reizende und scharfe Mittel	58
Tonische und stärkende Mittel	60
Adstringirende Mittel	63

Bissen.

Auflösende Mittel	65
Brechenenerregende Mittel	65
Abführende Mittel	66
Anthelmintische Mittel	67
Diuretische Mittel	68
Erregende und reizende Mittel	69
Stärkende und adstringirende Mittel	70

Latwerge.

Auflösende Mittel	72
Abführende Mittel	73
Anthelmintische Mittel	74
Erregende und reizende Mittel	75
Stärkende und adstringirende Mittel	77

Gallerten	81
Pflaster	83
Salben und Cerate.	85
Breyumschlag	100

Flüssige Arzneiformen.

Lecksäfte und Schleime . . .	104
Pinselfäfte	107

Aufgufs.

Kalte Aufgüsse.	108
-------------------------	-----

Warme Aufgüsse.

Auflösende Mittel	110
Abführende Mittel.	111
Diuretische Mittel	112
Menstruationbefördernde Mittel .	113
Narkotische Mittel.	113
Erregende und reizende Mittel .	114

Abkochungen und Aufgussab- kochungen.

Auflösende Mittel.	116
Abführende Mittel	118
Diuretische Mittel.	118
Erregende und reizende Mittel . .	119
Stärkende Mittel	120

Tisane und Getränke.

Schwächende, kühlende, erschlaf- fende und nährende Getränke. .	123
Abführende Mittel.	126
Diuretische Mittel.	127
Diaphoretische Mittel	128
Diaphoretisch - diuretische oder so- genannte blutreinigende Mittel .	128

Auflösende Mittel	133
Erregende und stärkende Mittel. .	134

Emulsionen, Öl- und Harzmix- turen.

Schwächende, temperirende, er- schlaffende und einhüllende Mittel	138
Abführende Mittel	140
Erregende und reizende Mittel . .	141

Pulvermixturen.

Brechenenerregende Mittel	147
Abführende Mittel	148
Auflösende Mittel.	148
Erregende Mittel	149
Stärkende und tonische Mittel . .	150

Auflösungen, Tränke u. Tränk- chen.

Schwächende u. temperirende Mittel	151
Brechenenerregende Mittel	153
Abführende Mittel	153
Diuretische Mittel.	154
Diaphoretische Mittel	156
Auflösende Mittel.	157
Umstimmende, narkotische und me- tallische Mittel	159
Reizende Mittel	161
Erregende Mittel	162
Stärkende, tonische und adstringi- rende Mittel	163

Tropfenmixturen.

Auflösende Mittel	166
Diuretische Mittel	168
Abführende Mittel	169

Narkotische Mittel	170
Metallische Mittel.	171
Reizende Mittel	172
Erregende Mittel	173
Stärkende und tonische Mittel	174

Künstliche Mineralwasser.

Abführende	176
Auflösende	177
Erregende, kohlenstoffsaure	177
Stärkende, eisenhaltige.	178

Waschwasser und Bähungen . 179

Augenwasser. 183

Mund- und Gurgelwasser . . 193

Einspritzungen. 199

Klystiere.

Ableitende und schwächende	204
Ausleerende	205
Erschlaffende und erweichende	205
Anhaltende	208
Erregende	209
Krampfstillende	209
Narkotische	210
Auflösende	211
Adstringirende und stärkende.	212

Bäder.

Örtliche	218
Allgemeine	214

Formeln für Kinder.

Pulverformeln.

Abführende	216
Auflösende und absorbirende	217
Krampfstillende	218
Stärkende	220

Lecksäfte.

Brechenenerregende	221
Abführende	222
Demulzirende	223
Erregende	223

Aufgüsse.

Abführende	224
Auflösende	224
Diuretische	226
Anthelmintische	227
Krampfstillende und erregende	227

Abkochungen	229
-----------------------	-----

Mixturen.

Brechenenerregende	230
Abführende	231
Auflösende	231
Diuretische	232
Diaphoretische	233
Erregende und reizende	233
Stärkende	235

Auflösungen und Tränkchen.

Schwächende und temperirende	236
Auflösende	238
Erregende	239

Reizende 239

Tonische und stärkende 240

Tropfenmixturen.

Auflösende 242

Krampfstillende. 242

Stärkende 243

Getränke.

Schwächende und temperirende . . . 243

Auflösende 244

Erregende und stärkende 244

Mundwasser und Injektionen 245

Pinselfäfte. 247

Salben und Einreibungen . . . 248

Bäder 250

Klystiere 251

Alphabetisches Register.

	I.Bd.	II.Bd.
A bführende Abkochungen		118
— Aufgüsse		111
— — für Kinder		224
— Bissen		66
— Klystiere		205
— Latwergen		73
— Lecksäfte für Kinder		224
— Mixturen		{ 140
		{ 148
— — für Kinder		231
— Morsellen		36
— Pillen		48
— Pulver		13
— — für Kinder		216
— Spezies		29
— Tisanen		126
— Tränke		153
— Tropfen		169
Abkochungen (<i>decocta</i>)	147	116
— für Kinder		229

Abkochungen, abführende . . .		I 18
— auflösende		I 16
— diuretische		I 18
— erregende		I 19
— stärkende		I 20
Ableitende Klystiere		204
Absorbirende Küchelchen . . .		34
— Schüttelmixtur		I 47
Absud (Abkochung)	I 47	I 16
Absud-Aufgufs	I 57	
<i>Adjuvans</i>	I 1	
<i>Adspergo</i>	67	
Adstringirende Abkochungen . .		I 20
— Klystiere		212
— Latwergen		77
— Pillen		63
— Pulver		23
— Tränke und Tränkchen . . .		163
Alterirende Pillen		42
— Pulver		6
Anhaltende Klystiere		203
Anthelmintische Aufgüsse f. Kin-		
der		227
— Bissen		67
— Latwergen		74
— Morsellen		36
— Pulver		16
<i>Aquae mineral. factit.</i> (künst-		
liche Mineralwasser)	I 87	I 76
Arzneyformen, feste	48	
— flüssige	49	
— dunst- und gasförmige . . .	50	

Aufgussabkochung	155	116
Aufgüsse (<i>infusa</i>)	140	108
— kalte		108
— warme		110
— abführende		111
— für Kinder		224
— anthelmintische, für Kinder.		227
— auflösende		110
— — für Kinder		224
— diuretische		112
— — für Kinder		226
— erregende		114
— — für Kinder		227
— menstruationbefördernde .		113
— narkotische		113
Auflösende Abkochungen . . .		116
— Aufgüsse		110
— — für Kinder		224
— Bissen		65
— Klystiere		211
— Mixturen für Kinder		231
— Morsellen		35
— Pillen		38
— Pulver		2
— — für Kinder		217
— Pulvermixturen		148
— Spezies		27
— Tisanen		133
— Tränke und Tränkchen . . .		157
— — — für Kinder		238
— Tropfen		166
— — für Kinder		242

Auflösung.	179	
Auflösungen, Tränke und Tränk-		
chen	151	
— — — für Kinder.	236	
— — — adstringirende	163	
— — — abführende.	153	
— — — auflösende.	157	
— — — — für Kinder	238	
— — — brechenenerregende	153	
— — — diaphoretische	156	
— — — diuretische.	154	
— — — erregende	161	
— — — — für Kinder.	239	
— — — reizende	161	
— — — schwächende	151	
— — — — für Kinder.	236	
— — — stärkende	163	
— — — — für Kinder.	236	
— — — temperirende	151	
— — — — für Kinder	236	
— — — umstimmende.	159	
Augenpulver.	65	25
Augenumschläge		184
Augenwasser.	192	183
Bähungen	189	178
Bäder	200	213
— für Kinder		250
Besänftigende Pulver		17
Bissen	98	65
— abführende		66
— adstringirende		70
— anthelmintische		67

Bissen, auflösende	65	
— brechenerregende	65	
— diuretische	68	
— erregende	69	
— stärkende	70	
<i>Bolus</i>	98	65
Brechenerregende Bissen	65	
— Lecksäfte für Kinder	222	
— Mixturen für Kinder	230	
— Pulver	12	
— Pulvermixturen	147	
— Tränke und Tränkchen	153	
Breyumschläge	127	100
<i>Cataplasma</i>	127	100
<i>Ceratum</i>	118	85
<i>Cereoli</i> (Bougies)	117	
Chlorgas (oxygenirt salzsaures Gas)	208	
<i>Clyisma, clyster</i>	197	202
<i>Collutorium</i>	194	193
<i>Collyrium</i>	192	183
<i>Conserva</i>	107	
<i>Constituens</i>	12	
<i>Corrigens</i>	11	
Dampf- und Dunstbäder	202	
<i>Decoctum</i> (s. Abkochung)	147	116
<i>Decocto - infusum</i>	153	
Diaphoretische Mixturen	233	
— Pulver	16	
— Tisanen	128	
— Tränke und Tränkchen	156	
Diaphoretisch - diuret. Spezies	30	

Diaphoretisch - diuretische Tisanen	128	
Digestivpulver	2	
Diuretische Abkochungen	118	
— Aufgüsse	112	
— — für Kinder	226	
— Bissen	68	
— Mixturen für Kinder	232	
— Pillen	49	
— Pulver	15	
— Spezies	30	
— Tisanen	127	
— Tränke und Tränkchen	154	
— Tropfen	168	
<i>Dirigens</i>	11	
Dragée	68	
Einspritzungen	196	199
— für Kinder		245
Einstreupulver	67	
<i>Elaeosaccharum</i>	63	
<i>Electuarium</i> (Latwerge)	102	72
<i>Elixirium</i> (Elixir)	178	
<i>Emplastrum</i> (Pflaster)	110	83
<i>Emulsio</i> (Samenmilch)	162	138
<i>Enema</i> (s. Klystier)	197	204
Erregende Abkochungen		119
— Aufgüsse		114
— — für Kinder		227
— Bissen		69
— Klystiere		209
— Latwergen		75
— Lecksäfte für Kinder		223

Erregende Mixturen für Kinder.	233	
— Oel- und Harzmixturen . . .	141	
— Pillen	55	
— Pulver.	19	
— Pulvermixturen	149	
— Spezies	31	
— Tisanen	134	
— Tränke und Tränkchen . . .	161	
— — — für Kinder	239	
— Tropfen	173	
Erschlaffende Klystiere	205	
— Ölmixturen	138	
— Spezies	27	
<i>Excipiens</i>	12	
<i>Fasciculus</i>	33	
Feste Arzneiformen	48	
Flüssige Arzneiformen	49	
<i>Fomentum, fomentatio.</i> . . .	189	178
<i>Formula magistralis.</i>	10	
— <i>officinalis</i>	10	
Gallerte	108	81
<i>Gargarisma</i>	194	193
Gasbäder	205	
Gasförmige Arzneimitteln . . .	202	
<i>Gas oxygenium</i>	206	
— <i>carbonicum.</i>	207	
— <i>chloricum</i>	208	
— <i>hydrothionicum</i>	207	
— <i>muriaticum.</i>	208	
— <i>nitricum.</i>	208	
<i>Gelatina</i>	108	81
Getränke		123

Getränke für Kinder		243
Gewichtsbestimmungen	27	
Gewichtstabellen	{ 29 31	
Gurgelwasser	194	193
<i>Guttae</i>	{ 32 37 175	166
Harzmixtur	165	138
<i>Haustus</i> (Tränkchen)	174	151
<i>Infusum</i> (Aufguss)	140	108
<i>Infuso-decoctum</i>	155	116
<i>Julapium</i> (Julep)	174	
<i>Injectio</i> (Einspritzung)	196	199
Kinderformeln		216
Klystiere	197	202
— für Kinder		251
— adstringirende		212
— ableitende		204
— anhaltende		208
— auflösende		211
— ausleerende		205
— erregende		209
— erschlaffende u. erweichende		205
— krampfstillende		209
— narkotische		210
— stärkende		212
— schwächende		204
Kohlenstoffsaures Gas.	207	
Konserve	107	
Krampfstillende Klystiere.		209
— Pulver		17

Krampfstillende Pulver f. Kinder		218
— Tropfen für Kinder . . .		242
Küchelchen (s. Morsellen und Zeltchen).	78	34
Latwergen	102	72
— abführende		73
— adstringirende		77
— anthelmintische.		74
— auflösende		72
— erregende		75
— stärkende		77
<i>Lavacrum</i> (Waschmittel) . . .	188	178
Lecksäfte	135	104
— für Kinder		221
— — abführende		224
— — brechenerregende.		222
— — demulzirende		223
— — erregende		223
<i>Linctus</i>	135	104
Liniment	126	85
<i>Litus oris</i>	137	107
<i>Lotio</i>	188	178
Luftreinigung	205	
<i>Manipulus</i>	38	
Maafsbestimmung	27	
Metallische, umstimmende Pillen		53
— — Tropfen.		171
Mineralwasser, künstliche . . .	187	176
Mixtur.	{ 169 }	138
— abführende	{ 172 }	140
— einhüllende		138

Mixtur, erregende	I 44
— erschlaffende	I 38
— schwächende	I 38
— temperirende	I 38
— für Kinder	230
— — abführende	231
— — auflösende	231
— — brechenerregende	230
— — diaphoretische	233
— — diuretische	232
— — erregende	233
— — stärkende	236
— mit Pulver, Pulvermixtur	I 47
— — — absorbirende	I 47
— — — abführende	I 48
— — — auflösende	I 48
— — — brechenerregende	I 47
— — — erregende	I 49
— — — stärkende	I 50
<i>Mixtura contracta</i> (Tropfen-	
mixtur)	I 75 I 66
— <i>media</i>	I 69
Molken	I 58
Morsellen	73 34
— absorbirende	34
— abführende	36
— anthelmintische	36
— auflösende	35
— stärkende	37
— temperirende	34
<i>Morsuli</i>	73 34
<i>Mucilago</i>	I 32 I 04

Mundwasser	194	193
— für Kinder		245
Narkotische Aufgüsse		113
— Klystiere		210
— Pillen		51
— Tränke und Tränkchen		159
— Tropfen		170
Niesepulver	66	220
<i>Odoramentum</i>	66	
Ölmixtur	165	138
Ölwachs	118	85
Ölzucker	63	
<i>Oleoceratum</i>	118	85
Pflanzenmilch	162	138
Pflanzensäfte, frisch ausgepresste	38	
Pflaster	110	83
Pillen	79	38
— abführende		48
— adstringirende		63
— alterirende		42
— auflösende		38
— diuretische		49
— erregende		55
— metallische, umstimmende		53
— narkotische		51
— reizend auflösende		46
— scharf reizende		55
— stärkende		60
<i>Pilulae</i>	79	38
Pinselfäfte	137	107
— für Kinder		247
<i>Potus</i> (Getränk)		123

<i>Pugillus</i>	33	
Pulver	61	1
— grobe	68	
— zum äußerlichen Gebrauch .	61	24
— abführende		13
— — für Kinder		216
— adstringirende		23
— alterirende		6
— anthelmintische		16
— auflösende		2
— — für Kinder		217
— besänftigende		17
— brechenerregende		12
— Digestiv-		2
— diaphoretische		16
— diuretische		15
— erregende		19
— reizend - auflösende		10
— krampfstillende		17
— — für Kinder		218
— gegen den Kropf (<i>struma</i>)		6
— purgirende		13
— schwächende		1
— stärkende		21
— — für Kinder		220
— temperirende		1
<i>Pulvis</i>	61	} 216
— <i>dentifricius</i>	67	
— <i>errhinus</i>	66	
— <i>ophthalmicus</i>	65	
<i>Ptisana</i>	156	126

Räucherpulver	69	
Räucherspezies	69	
Reizende Pillen		{ 46
		{ 58
— Tränke und Tränkchen		161
— — — für Kinder		239
— Tropfen		172
Riechpulver		66
<i>Rotulae</i>	76	34
Salben	119	85
— für Kinder		248
Salpetersaures Gas	208	
Salzsaures Gas	208	
<i>Saturatio</i>	186	
Sauerstoffgas.	206	
Schleime	132	104
Schüttelmixtur	169	147
Schwächende Klystiere		204
— Ölmixturen		138
— Pulver.		I
— Tränke		151
— — für Kinder		236
Schwefelwasserstoffgas	207	
Senfteige	130	
<i>Serum lactis</i>	158	
Signatur	6	
Sinapismus	130	
<i>Solutio</i>	179	151
Spezies	70	27
— abführende		29
— auflösende		27
— diaphoretisch - diuretische		30

Spezies, diuretische	30	
— erregende	31	
— erweichende.	27	
— stärkende.	33	
<i>Species ad suffiendum</i>	69	
Stärkende Abkochungen	120	
— Bissen.	70	
— Klystiere	212	
— Latwergen	77	
— Mixturen für Kinder	235	
— Morsellen	37	
— Pillen	60	
— Pulver.	21	
— — für Kinder	220	
— Pulvermixturen	150	
— Spezies	33	
— Tisanen	134	
— Tränke	163	
— — für Kinder	236	
— Tropfen	174	
Streupulver	67	
Stuhlzäpfchen	116	
Subskription	5	
<i>Succi plantarum expressi</i>	138	
<i>Suppositorium</i>	116	
<i>Tabellae</i>	73	34
Temperirende Morsellen	34	
— Oelmixturen.	138	
— Pulver.	1	
— Tränke	151	
— — für Kinder	236	
Tisanen	156	126

Tisanen, abführende		126
— auflösende		133
— diaphoretische		128
— diaphoretisch - diuretische		128
— diuretische		127
— erregende		134
— stärkende		134
Tränke und Tränkchen	174	151
— — abführende		153
— — adstringirende		163
— — auflösende		157
— — — für Kinder		238
— — brechenerregende		153
— — diaphoretische		156
— — diuretische		154
— — reizende		161
— — — für Kinder		239
— — schwächende		151
— — — für Kinder		236
— — stärkende		163
— — — für Kinder		240
— — temperirende		151
— — — für Kinder		236
— — umstimmende		159
<i>Trochisci.</i>		78
Tropfen, Tinkturen, Tropfen-		
mixturen	173	166
— — — für Kinder		242
— — — abführende		169
— — — auflösende		166
— — — — für Kinder		242
— — — diuretische		168

Tropfen, Tinkturen, Tropfen-		
mixturen, erregende	173	
— — — krampfstillende, für		
Kinder	242	
Tropfen, metallische	171	
— narkotische	170	
— reizende	172	
— stärkende	174	
— — für Kinder	243	
<i>Vehiculum</i>	12	
Wachskerzen	117	
Wachssalbe	118	85
Waschwasser	188	178
Zahnpillen		59
Zahnpulver	67	
Zeichen	25	
Zeltchen	76	34

Anzeige für Ärzte und Wundärzte.

Im Verlage des Unterzeichneten erscheint auf Subscription ohne Vorausbezahlung folgendes Werk:

Theoretisch - praktisches Handbuch der Chirurgie,

mit Einschluss der
syphilitischen - und Augen-
Krankheiten;
in alphabetischer Ordnung.

Unter Mitwirkung eines Vereins von Ärzten
und Wundärzten herausgegeben

von

Dr. *J. N. Rust*,

Königl. Preufs. Geh. Ober-Med. Rathe, General-Stabsarzte d. Armee, Professor etc.

Ueber den Plan und die Tendenz desselben hat sich der Herr Herausgeber in einer besondern Anzeige, welche in allen Buchhandlungen umsonst zu haben ist, ausgesprochen. Der Druck beginnt im Sommer des Jahres 1829, und da bis zu dieser Zeit sämtliche Artikel der Redaction vor-

liegen müssen, so wird er so rasch betrieben werden, daß alle sechs Wochen eine Lieferung von 24 Bogen erscheint und das ganze Werk mit dem Schluß des Jahres 1830 vollständig abgeliefert seyn wird.

Die Stärke des Werkes läßt sich mit Zuverlässigkeit noch nicht angeben, doch wird sie zwölf Lieferungen schwerlich übersteigen. Eine Lieferung von 24 Bogen kostet für die Subscribenten $1\frac{1}{2}$ Rthlr. Der nachherige Ladenpreis wird dagegen auf 2 Rthlr. erhöht werden. Der Betrag wird erst beim Empfang einer jeden Lieferung bezahlt, die Verbindlichkeit der Abnahme erstreckt sich jedoch natürlich auf das ganze Werk, dem von Zeit zu Zeit Haupttitel nach einer bequemen Abtheilung in Bände beigegeben werden.

Die Subscribenten werden zugleich ersucht, sich mit ihrer Bestellung bald an eine beliebige solide Buchhandlung zu wenden, da mit dem Ablauf des Septembers 1829 der Subscriptionstermin gänzlich geschlossen wird und der Ladenpreis eintritt.

Berlin, den 15. Juli 1828.

Theod. Christ. Fr. Enslin.

Bei demselben Verleger sind auch folgende medicinische Werke erschienen:

Berends, C. A. W., Vorlesungen über praktische Arzneiwissenschaft, herausgeg. von C. Sundelin. gr. 8. 1827. 1828.

1r Band: Semiotik 2 Thlr. 15 Sgr.

2r Band: Fieberlehre

I - 22½ -

3r Band: Entzündungen
2 Thlr. 5 Sgr.

4r Band: Acute Exantheme, Katarrh, Gicht, Ruhr, Gallenruhr, Blutflüsse
2 Thlr. 17½ Sgr.

(Die übrigen Bände dieses Werkes, welche zusammen (in 9 Bdn.) ein vollständiges Handbuch der Pathologie und Therapie bilden werden, erscheinen ungesäumt.)

Beschreibung des Friedrich-Wilhelms-Seebades zu Putbus. gr. 8. 1824. br. 7½ Sgr.

Bibliotheca medico-chirurgica, et pharmaceutico-chemica, oder Verzeichniß derjenigen medicinischen, chirurgischen, pharmaceutischen und chemischen Bücher, welche vom Jahre 1750 an bis zur Mitte des Jahres 1825 in Deutschland erschienen sind, nebst einem Materienregister; herausgeg. von Enslin. 4te, sehr verm. und verb. Ausgabe. gr. 8. 1826. 25 Sgr.

B o n d i, E., Pathologie des Weichselzopfs;
ein Versuch nach Erfahrungen. gr. 8.
1828. 10 Sgr.

D i e f f e n b a c h, J. F., die Transfusion des
Blutes, und die Infusion der Arzneyen in
die Blutgefäße; 1r Th. (oder des Werks
von Paul S c h e e l 3r Th.). gr. 8. 1828.
1 Thlr. 7½ Sgr.

H e c k e r, J. F. C., Geschichte der Heil-
kunde, nach den Quellen bearb. 1r Bd.:
v. d. Urzeiten bis Galen. gr. 8. 1822.
2 Thlr. 10 Sgr.

(Der zweite Band ist unter der Presse.)

— — literarische Annalen der gesammten
Heilkunde. 1r bis 4r Jahrg. 1825 —
1828. gr. 8. der Jahrg. v. 12 Heften
8 Thlr.

H i p p o c r a t i s Aphorismi, ad optimorum
librorum fidem accurate editi; cum indice
Verhoofdiano locupletissimo. 12. 1822.
carton. 1 Thlr.

I d e l e r, K. W., Anthropologie für Aerzte.
gr. 8. 1827. 2 Thlr. 15 Sgr.

K l a a t s c h, A., tabellarische Uebersicht d.
Hautkrankheiten, nach Willan's System.
gr. Fol. 1824. 10 Sgr.

Richard, A., medizinische Botanik; a. d. Franz.; mit Zusätzen und Anmerkungen herausgeb. von G. Kunze und G. F. Kummer. 2 Bände. gr. 8. 1824. 1826. 5 Thlr. 20 Sgr.
Dasselbe auf ganz weißem Druckpap. 7 Thlr.

Richter, A. L., theoret. prakt. Handbuch der Lehre von den Brüchen und Verrenkungen der Knochen; mit 40 lithogr. Tafeln in Folio. gr. 8. 1828. 7 Thlr. 15 Sgr.

— — der Wasserkrebs der Kinder, eine Monographie; mit 2 ill. Kupfern. gr. 8. 1828. br. 27½ Sgr.

Roux, Ph. Jos., über die Staphyloraphie, oder über die Vereinigung der angeborenen Spaltung des Gaumensegels; a. dem Franz. mit Anmerk. v. J. F. Dieffenbach; nebst 2 lithogr. Tafeln. gr. 8. 1826. 15 Sgr.

v. Siebold, Ed. J. C., Anleitung zum geburtshülflichen technischen Verfahren am Phantom, als Vorbereitung zur künftigen Ausübung d. Geburtshülfe. gr. 8. 1828. 1 Thlr.

Sundelin, Carl, Pathologie und Therapie der Krankheiten mit materieller Grundlage. 2 Bde. gr. 8. 1827. 4 Thlr.

Vogel, S. G., Beweis der unschädlichen
und heilsamen Wirkungen des Badens im
Winter, nebst Belehrungen über die
zweckmässigste Art des Gebrauchs der
Bäder und Trinkcuren zur Winterszeit.
8. 1828. br. 7½ Sgr.

Zierrmann, J. C. L., geschichtliche Dar-
stellung des thierischen Magnetismus,
als Heilmittels, mit besonderer Berück-
sichtigung des Somnambulismus, in ei-
ner Reihe ähnlicher Erscheinungen der
Vorzeit bis auf Mesmer. gr. 8. 1824.
1 Thlr.

Sundelin, Karl

Taschenbuch der ärztlichen Rezeptirkunst und der Arzneyformeln

Bd.: 2

Berlin 1828

Bamberg, Staatsbibliothek -- Mat.med.d.4#2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11740225-4